

GAZELLE®



INSECTICIDE

Gazelle

Toelatingsnummer: 12809 N (W6)

Aard van het preparaat: Wateroplosbaar granulaat

Werkzame stof: acetamiprid

Gehalte: 20%

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: acetamiprid benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten

Gevarenaanduidingen:

H302 Schadelijk bij inslikken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P280 Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.

P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Waarschuwing



Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- gebied	Werk- zaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal g middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Aardappelen	bladluis ¹	250 g/ha	250 g/ha	3 per teeltcyclus	750 g/ha per teeltcyclus	21	14
Appel	bladluis ²	0,025% (25 g/100 l water)	375 g/ha	2 per 12 maanden	750 g/ha per 12 maanden	30	14
Peer	bladluis ³	0,025% (25 g/100 l water)	300 g/ha	2 per 12 maanden	600 g/ha per 12 maanden	30	14
Vruchtgroenten van <i>Curcubitaceae</i> eetbare schil (bedekte teelt)	bladluis ⁴	0,025% (25 g/100 l water)	375 g/ha	3 per 12 maanden	1125 g/ha per 12 maanden	14	3
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> m.u.v. tomatillo (bedekte teelt)	bladluis ⁴	0,025% (25 g/100 l water)	375 g/ha	2 per 12 maanden	750 g/ha per 12 maanden	20	3
Bloembol- en bloemknol- gewassen (bedekte teelt)	bladluis ⁴	0,025% (25 g/100 l water)	250 g/ha	6 per 12 maanden	1500 g/ha per 12 maanden	7	-
Bloembol- en bloemknol- gewassen (onbedekte teelt)	bladluis ⁴	230 g/ha	230 g/ha	3 per 12 maanden	690 g/ha per 12 maanden	30	-
Bloemisterij- gewassen (bedekte teelt)	bladluis ⁴	0,025% (25 g/100 l water)	230 g/ha	3 per 12 maanden	690 g/ha per 12 maanden	30	-
	wittevlieg ⁵	0,025% - 0,05% (25 - 50 g/100 l water)	462 g/ha	6 per 12 maanden	2772 g/ha per 12 maanden	7	
Bloemisterij- gewassen (onbedekte teelt)	bladluis ⁴	0,025% (25 g/100 l water)	230 g/ha	3 per 12 maanden	690 g/ha per 12 maanden	30	-

Toepassings-gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal g middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Boomkwekerij-gewassen (bedekte teelt)	bladluis ⁶	0,025% (25 g/100 l water)	230 g/ha	3 per 12 maanden	690 g/ha per 12 maanden	30	-
	wittevlieg ⁵	0,025% - 0,05% (25 - 50 g/100 l water)	462 g/ha	6 per 12 maanden	2772 g/ha per 12 maanden	7	
Boomkwekerij-gewassen (onbedekte teelt)	bladluis ^{6,7}	0,025% (25 g/100 l water)	230 g/ha	3 per 12 maanden	690 g/ha per 12 maanden	30	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	bladluis ⁶	0,025% (25 g/100 l water)	230 g/ha	3 per 12 maanden	690 g/ha per 12 maanden	30	-
	wittevlieg ⁵	0,025% - 0,05% (25 - 50 g/100 l water)	462 g/ha	6 per 12 maanden	2772 g/ha per 12 maanden	7	
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	bladluis ^{6,7}	0,025% (25 g/100 l water)	230 g/ha	3 per 12 maanden	690 g/ha per 12 maanden	30	-
Openbaar groen, met uitzondering van grasvegetaties	bladluis ^{6,7}	0,025% (25 g/100 l water)	230 g/ha	3 per 12 maanden	690 g/ha per 12 maanden	30	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Groene perzikluis (*Myzus persicae*), Wegedoornluis (*Aphis nasturtii*), Vuilboomluis (*Aphis frangulae*), Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*) en Boterbloemluis (*Aulacorthum solani*).

² Rose appelluis (*Dysaphis plantaginea*), Groene appeltakluis (*Aphis pomi*), Bloedvlekkenluis (*Dysaphis devector*), Fluitekruidluis (*Dysaphis anthrisci*), Appelgrasluis (*Rhopalosiphum insertum*).

³ Rose perenluis (*Dysaphis pyri*), Vouwgalluis (*Anuraphis farfarae*), Zwarte perenluis (*Melanaphis pyaria*) en Zwarte bonenluis (*Aphis fabae*).

⁴ Boterbloemluis (*Aulacorthum solani*), Groene perzikluis (*Myzus persicae*), Katoenluis (*Aphis gossypii*) en Zwarte bonenluis (*Aphis fabae*).

⁵ Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*) en Tabakswittevlieg (*Bemisia tabaci*).

⁶ Boterbloemluis (*Aulacorthum solani*), Groene perzikluis (*Myzus persicae*), Katoenluis (*Aphis gossypii*), Zwarte bonenluis (*Aphis fabae*), Gewone rozenluis (*Macrosiphum rosae*), Sjalotteluis (*Myzus ascalonicus*) en Groene kortstaartluis (*Brachycaudus helichrysi*).

⁷ Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*), Zwarte kersenluis (*Myzus cerasi*), Groene appeltakluis (*Aphis pomi*), Groene sparrenluis (*Elatobium abietinum*) en Vogelkersluis (*Rhopalosiphum padi*).

Het gebruik in de teelt van koolzaad, aardbei vermeerdering, asperge en koolrabi (onbedekte teelt), is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker

Het gebruik in de teelt van kers (zoete en zure) en de veredelingsteelt en zaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt) is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsprocedure". Deze "derdenuitbreiding" is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings- gebied	Werk- zaamheid aanne- melijk tegen	Dosering middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal g middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Koolzaad	kevers ⁴	200 g/ha	200 g/ha	1	200 g/ha	-	28
Kers (zoete en zure kers) (onbedekte teelt)	vliegen en muggen ¹	0,025% (25 g/100 l water)	375 g/ha	2	750 g/ha	30	14
Aardbei vermeerdering	Bladluis ⁸	250 g/ha	250 g/ha	1	250 g/ha	-	-
Spruitkool (onbedekte teelt)	bladluis ⁷	325 g/ha	325 g/ha	1	325 g/ha	-	14
Koolrabi (onbedekte teelt)	bladluis ⁷	325 g/ha	325 g/ha	1	325 g/ha	-	14
Asperge (onbedekte teelt)	bladluis en kevers ⁶	250 g/ha	250 g/ha	2	500 g/ha	30	-
Asperge (bedekte teelt)	bladluis en kevers ⁶	250 g/ha	250 g/ha	2	500 g/ha	7	-
Veredelingsteelt en zaad- productie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteelt- gewassen (bedekte teelt)	bladluis ²	0,025% (25 g/100 l water)	200 g/ha	3	600 g/ha	30	-
	wittevlieg ³	0,025% - 0,05% (25 - 50 g/100 l water)	400 g/ha	6	2400 g/ha	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Kersevlief (*Rhagoletis cerasi* en *Rhagoletis indifferens*).

² Boterbloemluis (*Aulacorthum solani*), Groene perzikluis (*Myzus persicae*), Katoenluis (*Aphis gossypii*) en Zwarte bonenluis (*Aphis fabae*).

³ Kaswittevlief (*Trialeurodes vaporariorum*) en Tabakswittevlief (*Bemisia tabaci*).

⁴ Koolzaadglanskever (*Meligethes aeneus*)

⁵ Groene perzikluis (*Myzus persicae*) en Katoenluis (*Aphis gossypii*)

⁶ Groene perzikluis (*Myzus persicae*) en Aspergehaantje (*Crioceris asparagi*)

⁷ Groene perzikluis (*Myzus persicae*)

⁸ Fluitekruidluis (*Dysaphis anthrisci*), sjalottenluis (*Myzus asalonicus*), Vouwgaluis (*Anuraphis fufarae*) en Gewone rozenluis (*Macrosiphum rosae*)

Toepassingsvoorwaarden

In appel en peer geldt dat er maximaal 2 toepassingen met acetamiprid op het zelfde perceel mogen plaatsvinden waarvan maximaal 1 toepassing voor 1 mei.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van appel, peer en kers uitsluitend toegestaan wanneer in de periode vóór 1 mei op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van

- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van 450 cm met maximaal 206 gram middel per hectare en maximaal één toepassing vóór 1 mei, of;
- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 met maximaal 206 gram middel per hectare en maximaal één toepassing vóór 1 mei.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van appel, peer en kers uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater in de periode vanaf 1 mei op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van

- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van 450 cm
- een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten is toepassing van het middel in de onbedekte teelt van asperges uitsluitend toegestaan wanneer op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5.

Toepassing in de teelt van asperge mag alleen na de oogst plaatsvinden.

In aardappel mag het middel pas toegepast worden vanaf het moment dat het gewas 50% grondbedekking heeft.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Als in het betreffende gewas nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Niet toepassen in een jong gewas van vruchtgroenten van *Curcubitaceae* met eetbare schil gedurende de periode van 1 november tot 1 april in verband met mogelijke nadelige gewasreacties

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof acetamiprid. Acetamiprid behoort tot de neonicotinoïden. De Irac code is 4A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Algemeen

Gazelle is een systemisch werkend middel. Het middel wordt na toepassing door de plant opgenomen en verspreid. Gazelle werkt in op het zenuwstelsel van het te bestrijden insect.

Toepassen met voldoende water voor een optimale gewasbedekking.

Gewassen:

Aardappelen

Toepassen zodra de eerste bladluisaantasting wordt waargenomen, vanaf het moment dat het gewas 50% grondbedekking heeft. Indien nodig de toepassing herhalen.

Appel en peer

Zodra een bladluisaantasting wordt waargenomen het middel toepassen.

Vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met eetbare schil (bedekte teelt)

Zodra een bladluisaantasting wordt waargenomen het middel toepassen.

Gedurende de periode van 1 november tot 1 april wordt toepassing ontraden in verband met mogelijke nadelige gewasreacties.

Vruchtgroenten van *Solanaceae* (bedekte teelt). Met uitzondering van tomatillo

Zodra een bladluisaantasting wordt waargenomen het middel toepassen.

Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte en onbedekte teelt)

Zodra een bladluisaantasting wordt waargenomen het middel toepassen.

In openbaar groen, met uitzondering van grasvegetaties

Zodra een bladluisaantasting wordt waargenomen het middel toepassen.

Koolzaad

Toepassen zodra kevers worden waargenomen.

Kers (zoete en zure kers)

Op het moment dat de kersenvlieg zijn eitjes gaat afzetten het middel toepassen.

Aardbei vermeerdering, spruitkool (onbedekte teelt) en koolrabi (onbedekte teelt)

Toepassen als bladluizen worden waargenomen.

Asperge (bedekte en onbedekte teelt)

Bladluis: toepassen zodra bladluizen worden waargenomen.

Aspergekever: toepassen zodra de eerste larven worden waargenomen.

Veredelings en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en siergewassen (bedekte teelt);

Bloemisterijgewassen (bedekte en onbedekte teelt);

Boomwekerijgewassen en vaste planten (bedekte en onbedekte teelt);

Zodra bladluizen of wittevlieg wordt waargenomen het middel toepassen. Zo nodig de bespuiting met een interval van 7-10 dagen herhalen ingeval van wittevlieg. Gebruik bij een grote populatie wittevlieg de hoogste dosering.

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen:

Algemene aanwijzingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inademen: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na huidcontact: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Na oogcontact: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Gazelle is een geregistreerd handelsmerk van Nippon Soda Co. Ltd. Tokyo.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

N.B. Certis Belchim B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen.

GAZELLE®

INSECTICIDE

Gazelle

Toelatingsnummer: 12809 N (W6)

Aard van het preparaat: Wateroplosbaar granulaat

Werkzame stof: acetamiprid

Gehalte: 20%

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: acetamiprid benzeensulfonzuur, mono-C10-13-alkylderivaten, natriumzouten

Gevarenaanduidingen:

H302 Schadelijk bij inslikken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P280 Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.

P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Waarschuwing

