

WAARSCHUWING



PROPLANT®

Toelatingsnummer: 12918 N (W4)
Aard van het preparaat: met water mengbaar concentraat (SL)
Werkzame stoffen en gehalte: 722 g/l (66.7 gew.%) Propamocarb Hydrochloride
 EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
GEVARENAANDUIDINGEN:
 H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H412 – Schadelijk voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen.
VOORZORGSMATREGELEN:
 SP 1 – Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
 P234 – Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 P270 – Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 P273 – Voorkom lozing in het milieu.
 P280C – Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
 P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Registratiehouder/Distributeur:

Arysta LifeScience Benelux Sprl
 Rue De Renory 26/1
 B-4102 Ougree
 België
 Tel. No.: 0850657366
 www.arysta.nl

Chargenummer: zie verpakking



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Proplant is een handelsmerk van Arysta LifeScience Benelux Sprl.

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel :

- in de teelt van sla (met uitzondering van veldsla);
- in de bedekte teelt op kunstmatig substraat van: aubergines, courgettes, komkommers, patisson, meloenen, paprika's en tomaten;
- in de bedekte teelt van bolbloemen;
- in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen.

Veiligheidstermijnen

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

14 dagen voor sla (bedekte teelt);

7 dagen voor sla (onbedekte teelt);

3 dagen voor teelten op kunstmatig substraat van aubergines, courgettes, komkommers, patisson, meloenen, paprika's en tomaten;

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Proplant is een systemisch fungicide met een specifieke werking tegen schimmels, die voetrot en wortelrot veroorzaken, zoals *Pythium*-, *Phytophthora*-, *Perenospora*- en *Aphanomyces*-soorten en valse meeldauw, zoals *Bremia*.

Toepassingen

Sla (met uitzondering van veldsla), ter bestrijding van valse meeldauw (*Bremia lactucae*).

Binnen een week na het uitplanten een gewasbespuiting uitvoeren en deze behandeling maximaal 1 keer herhalen met een interval van tenminste 10 dagen.

Dosering: 1,5 liter middel per ha, toepassen in 400-1500 liter water per ha.

Bedekte teelt van aubergines, courgettes, komkommers, meloenen, patisson, paprika's en tomaten op kunstmatig substraat, ter voorkoming van uitval door *Pythium*.

Een grondbehandeling via het druppelirrigatiesysteem uitvoeren bij het uitplanten of bij een beginnende aantasting en deze behandeling maximaal 3 maal herhalen met een interval van 7-15 dagen.

Dosering: 1-2 liter middel per ha

Bedekte teelt van bolbloemen (tulpen, lelies en irissen), tegen door *Pythium* veroorzaakt wortelrot en/of zachtrot.

Men dompelt het plantgoed vlak vóór het planten gedurende 20-30 minuten in een oplossing van 0,3% (300 ml Proplant per 100 liter water). Het bad kan, indien het niet te vervuild raakt, herhaalde malen gebruikt worden, maar telkens goed omroeren en verloren gegane hoeveelheid vloeistof vervangen door verse oplossing van dezelfde sterkte. Het bad echter niet langer dan één dag gebruiken. Vóór het dompelen is pellen van de tulpen zeer gewenst.

Bedekte teelt van bloemisterijgewassen, ter bestrijding van wortelrot en voetziekte, veroorzaakt door *Pythium* en *Phytophthora*.

Op gronden met een hoog gehalte organische stof de hoogste dosering gebruiken.

a. Potgrondbehandeling

Proplant op de te behandelen grond verspuiten en zo gelijkmatig mogelijk door de grond mengen. De potgrond kort na toepassing gebruiken.

Dosering: 300 ml middel in 10 liter water per m³ potgrond.

b. Behandeling direct na zaai, na stekken, verspenen en oppotten

De toepassing kan preventief of curatief geschieden. Giet op een vochtige grond. Na behandeling direct inregenen, zodat het middel in de wortelzone kan dringen. Zowel bij preventieve als bij curatieve behandeling zijn de grondsoort, het ontwikkelingsstadium van de plant en de mate van aantasting bepalend voor de dosering. De behandeling zonodig na ± 2 weken herhalen.
Dosering: 5-10 ml middel in 3-6 liter water per m².

c. Aangietbehandeling per pot

Giet op een vochtige grond. Na toepassing inregenen.

Dosering: 0,15% (150 ml Proplant per 100 liter water). Hiervan 100 ml per pot van 10-11 cm geven.

d. Behandeling via het druppelirrigatiesysteem (op grond of kunstmatig substraat)

Een grondbehandeling via het druppelirrigatiesysteem uitvoeren bij het uitplanten of bij een beginnende aantasting en deze behandeling maximaal 1 maal herhalen met een interval van 7-15 dagen.

Dosering: 1-2 liter middel per ha (20.000 planten)

Aanwijzingen eerste hulp

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na contact met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Na contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Om emissie van ontsmettingsvloeistof te voorkomen:

- Dienen ontsmettingshandelingen uiterlijk vanaf 2018 plaats te vinden op een locatie waarbij geen afspoeling of afwatering op oppervlaktewater of riool mogelijk is en waarbij wordt voorkomen dat via transportmiddelen (b.v. heftruck) verspreiding van ontsmetvloeistof plaatsvindt
- Na dompelen of douchen het fust droogblazen en/of minimaal 6 uur laten uitdruipen
- Transport van ontsmette bollen naar het veld of een andere locatie mag uitsluitend worden uitgevoerd met een emissievrije transportwagen. Dit kan bijvoorbeeld een transportwagen zijn met opvanggoten en een opvangcontainer
- Eventuele lek/ restvloeistoffen dienen te worden hergebruikt, als chemisch afval te worden afgevoerd of via een zuiveringssysteem (bijvoorbeeld PhytoBac of Heliosec) verwerkt te worden conform wetgeving.