

Actellic 50, WG en aanbevelingen, 6469 N W.9.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na oogst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

| Toepassingsgebied | werkzaamheid getoetst op | Dosering* middel per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|---|---|---------------------------------|---|---|---|
| Granen (in opslag of bestemd voor opslag) | Kevers, rupsen en vlinders ¹ | 8 ml per 0,75 - 1,0 l water | 8 ml per 1000 kg | 1 | - |
| Teff (in opslag of bestemd voor opslag) | Kevers, rupsen en vlinders ¹ | 8 ml per 0,75 - 1,0 l water | 8 ml per 1000 kg | 1 | - |

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

¹ Graanklander (*Sitophilus granarius*), rijstklander (*Sitophilus oryzae*), meelkevers (*Tribolium spp.*), getande graankever (*Oryzaephilus surinamensis*), getande notekever (*Oryzaephilus mercator*), roestbruine graankever (*Cryptolestes ferrugineus*), korrelmot (*Nemapogon granellus*), graanmot (*Sitotroga cerealella*), meelmot (*Ephestia cautella*).

Overige toepassingsvoorwaarden

Uitsluitend toepassen op ruwe (ongemalen) granen in opslag of bestemd voor opslag. Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten en het middel gelijkmatig en fijn op de partij graan wordt verdeeld.

Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic 50 is behandeld.

Omdat meetbare pirimifos-methyl residuen kunnen worden aangetroffen in producten opgeslagen of verwerkt in opslagfaciliteiten waar pirimifos-methyl is toegepast, is het gebruik van Actellic 50 beperkt tot opslagfaciliteiten die uitsluitend bestemd zijn voor granen, maïs, rijst, specerijen en niet-voedselproducten.

Minimaal 10 uur ventileren voor het betreden van een opslagruimte met behandelde gewassen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof pirimifos-methyl. Pirimifos-methyl behoort tot de organische fosfor verbindingen. De IRAC code is 1B. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Actellic 50 is een insecticide dat tegen vele insecten- en mijtensorten werkt. Het middel kenmerkt zich door een goede contactwerking en een uitgesproken dampwerking. Actellic 50 dringt diep in het plantenweefsel door. Het effect van Actellic 50 wordt sterk beïnvloed door de temperatuur. Bij temperaturen beneden 15°C kan een verminderde werking optreden.