



Aliette®

12 kg

Fungicide met bio-systemische werking

Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

Algemeen advies: Buiten de gevaarlijke zone brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. Als symptomen opkomen en aanhouden, medische hulp inroepen.

Inademing: In de frisse lucht brengen.

Aanraking met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende ten minste 15 minuten. Behandeling door een oogarts.

Inhalatie: GEEN braden opwekken. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingsinformatie Centrum (NVIC)). Slachtoffer warm en rustig houden.

Belangrijkste acute en uitgesletste symptomen en effecten

Verschuifsel: Irritatie van huid, ogen en slijmvliezen.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: Een maagspoeling is normaal niet nodig. Als een grotere hoeveelheid ingeslikt is, medicinale houdskool en natriumsulfaat geven. Een specifiek tegengif is niet bekend. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitief toelatingsgebieden versie 2.1 Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Aardbeien (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Stengelbasisrot ¹	0,25% (250 gram middel per 100 liter water) **	10 kg/ha	1	-	-
Aardbeien (productieteelt)	Rijenbehandeling	Stengelbasisrot ¹	7,5 kg/ha	7,5 kg/ha	1	-	14
		Roodwortelrot ²	7,5 kg/ha	7,5 kg/ha	3	28	14
Aardbeien, opweek- & vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)	Gewas-behandeling	Stengelbasisrot ¹	7,5 kg/ha	7,5 kg/ha	1	-	-
		Roodwortelrot ²					
Witlof (trektheit)	Toevoegen aan proces water	Verslijming ³	0,03% (30 gram per 100 liter water)	10,5 g/m ² teelt-oppervlak	1	-	-

*Verfaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

**Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

- De resterende dompelvoestof mag uitsluitend worden verwerkt via een aangietbehandeling na het planten, max. 100 ml per plant.

¹ Stengelbasisrot (Phytophthora cactum)

² Roodwortelrot (Phytophthora fragariae)

³ Verslijming (Phytophthora erythroseptica)

Overige toepassingsvoorwaarden

Handmatig dompelen van aardbeienplanten is niet toegestaan.

Dit middel behoort te de werkmaterie stof fosforyl-aluminium. Fosforyl-aluminium behoort tot de groep fosfonaten. De Frac code is 33. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentie management dient u dit vinden via onze website (<http://agro.bayer.nl/Products/DTG>).

Verlijming (Phytophthora erythroseptica)

AANBEVELEN

Attentie

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden in zowel de bedekte- als onbedekte teelt van groenten-, fruit-, sierteelt-, boomkwekerijgewassen en vaste planten is het onmogelijk om de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel of een bepaald gewas of ras, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden terwille van de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.

Let op: van Aliette WG zijn identieke producten op de markt met verschillende merken met een overeenkomstig toepassingsgebied. De toepassing van deze producten mag de voorgescreven maximale frequentie, dosering en/of het interval van één enkel product niet overschrijden.

TOEGELATEN IN

Definitief toelatingsgebieden (DTG)

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgj, juni 2015). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en het domein waar het middel kan worden gebruikt, zie de website (<http://agro.bayer.nl/Products/DTG>).

Belangrijke informatie voor specifieke gewassen

Aardbeien

Dompelbehandeling

De planten kort voor het uitzetten gedurende 15 minuten dompelen. Het dompelbad kan slechts één dag worden gebruikt, waarbij voorkomen dient te worden dat het dompelbad te veel vervuult. Na iedere dompelgang de verloren gegane voestof aanvullen met een oplossing van de normale sterkte (0,25%). Voor elke dompelgang het bad goed roeren. De resterende dompelvoestof mag uitsluitend worden verwerkt via een aangietbehandeling na het planten (max. 100 ml per plant). Handmatig dompelen is niet toegestaan.

Rijenbehandeling (productieteelt)

Direct na het uitzetten en vastleggen een rijenbehandeling uitvoeren. Ter bestrijding van roodwortelrot: in de eerste week van oktober een rijenbehandeling uitvoeren. Het verdient aanbeveling om op zwaar besmette percelen een herbehandling uit te voeren in het voorjaar (maart).

Gewasbehandeling (opweek- & vermeerderingsteelt)

Op vermeerderingsvelden kan op het moment van uitleggen van de uitlopers een volveldsbespuiting worden uitgevoerd.

Witlof (trektheit)

Het middel direct na het opzetten van de penen toevoegen aan het proceewater. Het water daarna in circulatie brengen.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbesteding

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbesteden nadat de spijvoestof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Overige informatie

Voorkomen emissie

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwijderen van restanten en de reiniging van machines.

Om emissie van ontsmettingsvoestof te voorkomen:

- Dienen ontsmettingshandelingen plaats te vinden op een locatie waarbij geen afspoeling

- van afwatering op oppervlaktewater of riool mogelijk is en waarbij wordt voorkomen dat via

transportmiddelen (b.v. hefurck) verspreiding van ontsmettingsvoestof plaatsvindt. Na dompelen

of douchen het fust droogblazen en/of minimaal 1 uur, maar bij voorkeur 12 uur

uittroepen. Transport van ontsmette bollen naar het veld of een andere locatie mag

uitsluitend worden uitgevoerd met een emissievrije transportwagen. Dit kan bijvoorbeeld

een transportwagen zijn met opvanggoot en een opvangcontainer. Eventuele lek/

restvoestoffen dienen te worden hergebruikt, als chemisch afval te worden afgevoerd

of via een zuiveringsstelsel (bijvoorbeeld Phytolact® of heliosol) verwerkt te worden

conform wetgeving.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals ondermeer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

ART.NR.: 8086268

Productnaam: Aliette

Werkzame stof:

Fosforyl-aluminium

Gehalte: 800 g/KG

Toelatingsnummer:

11561 N - W3

Aard van het preparaat:

water dispergeerbaar granulaat

Gevarenaanduidingen:

H319 Verorzaakt ernstige oogirritatie.

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw

Waar schuw



Waar schuw

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de

menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Plantgoedbehandeling:

Bayer Crop Science adviseert in het kader van Product Stewardship,

om toepassing van plantgoedbehandelingsproducten bij voorkeur uit te

voeren in een goed geventileerde ruimte of in de open lucht. Daarnaast

dient contact van de huid met behandeld materiaal te worden vermeden.

Verkoop alleen toegestaan in onze opengende verpakking.

Droog, koel en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

UFI: H3R0-A0EU-1004-SQTR

Werkwijze

GROUP	P07 (33)	FUNGICIDE
STORL		
VERPAKKING		
Bedrijfsafval		

IN GEVAL VAN NOOD:

Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor
professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigingsinformatie Centrum
(NVIC) +31 (0)88 755 8000
In overleg met Bayer CropScience
+31 (0)6-553 724 90

© is een geregistreerd

handelsmerk van de Bayer Group

Partijnummer/Productiedatum:

zie elders op de verpakking

Bayer CropScience SA-NV

Postbus 88

2130 AB Hoofddorp

Tel. 023-7991085

Bayer

NL808972626K



4 000680 074526