

Niet-selectief herbicide in diverse gewassen en doodspuitmiddel in aardappelen.

MISSION® 200 SL

TOELATINGSNUMMER	: 13848 N
AARD VAN HET PREPARAAT	: MET WATER MENGBAAR CONCENTRAAT
WERKZAME STOF	: DIQUAT DIBROMIDE
GEHALTE	: 200 G/L (ALS DIQUAT)

W1

GEVARENAANDUIDINGEN

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische reactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330 Dodelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**GEVAAR****VOORZORGSMAATREGELEN**

P260 Spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P284 Adembescherming dragen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

Verdeeld door:

UPL Benelux BV
Postbus 295
4900 AG Oosterhout
0162 – 431 931

Erkenninghouder:

UPL Europe Ltd.
The Centre, Birchwood Park
Warrington, Cheshire,
WA3 6YN, United Kingdom



® gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd..

UN 1760

CHARGENUMMER:
Zie elders op de verpakking

040316

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha	-	-
	doodspuiten	Aardappelloof	4 l/ha	1 per teeltcyclus	4 l/ha	-	-
Bieten	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha	-	-
Cichorei	voor opkomst of voor uitplanten	Vogelmuur ¹	1,5 l/ha	1 per 12 maanden	1,5 l/ha	-	-
Aardbei	tussen de rijen	Vogelmuur ¹	1,5 l/ha	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha	-	-
Bladgroenten (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per 12 maanden	2 l/ha	-	-
Peulgroenten (onbedekt)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha	-	-
Koolgewassen (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per 12 maanden	2 l/ha	-	-
Wortel- en knolgewassen (onbedekt)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per 12 maanden	2 l/ha	-	-
Uien	voor opkomst of voor uitplanten	Vogelmuur ¹	1,5 l/ha	1 per 12 maanden	1,5 l/ha	-	-
Stengelgroenten (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per 12 maanden	2 l/ha	-	-
Sierteeltgewassen (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Vogelmuur ¹	1,5 l/ha	1 per 12 maanden	1,5 l/ha	-	-

¹ Vogelmuur (*Stellaria media*)

Toepassingsvoorwaarden

Mission in een watervolume van 200-500 l/ha toepassen.

Dit product mag uitsluitend machinaal toegepast worden omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij handmatige toepassing.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met een kantdop en een teeltvrije zone van 1,5 m (*gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelgrens*).

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.

In de teelt van cichorei, aardbei, uien en sierteeltgewassen kan de werking onvoldoende zijn.

AANBEVELINGEN

Toepassingen

a. Toepassing als onkruidbestrijdingsmiddel

MISSION 200 SL bestrijdt vooral éénjarige breedbladige onkruiden. Om de afbrand werking van Mission 200 SL te versterken op grotere of afgeharde onkruiden kan minerale olie of plantaardige olie 1 L/ha toegevoegd worden. Het middel kan worden gebruikt in de (onbedekte) teelt van aardappelen, bieten, cichorei, uien, bladgroenten (o.a. sla, andijvie, spinazie), peulgroenten (o.a. erwten en bonen met of zonder peul), vruchtgroenten, koolgewassen (o.a. sluitkool, spruitkool, bloemkool, broccoli en Chinese kool), wortel- en knolgewassen (o.a. radijsachtigen, wortels, knol- en koolraap, knolselderij en schorseneer), stengelgroenten (o.a. bleekselderij, prei en knolvenkel), sierteeltgewassen (o.a. bloembollen), mits toegepast vóór opkomst of vóór het uitplanten. In aardbei mag het middel tussen de rijen worden toegepast. Alleen aanwezige onkruiden worden bestreden. Na contact van het middel met de grond is er geen nawerking meer. MISSION 200 SL kan eventueel gespoten worden tussen regenbuien door en zelfs tijdens lichte motregen. Evenwel niet spuiten bij wind, als er kans op overwaaien is.

Dosering:

- Aardappelen, Bieten, Bladgroenten, Peulgroenten, Vruchtgroenten, Koolgewassen, Wortel- en knolgewassen, Stengelgroenten en Sierteeltgewassen: 1.5 – 2 liter per ha.
- Cichorei, Aardbei en Uien: 1.5 liter per ha.

Watervolume: 200-500 L/ha. Gebruik de grootste hoeveelheid water bij veel of goed ontwikkelde onkruiden.

b. Toepassing als doodspuitmiddel van aardappelloop

De toepassing dient te worden uitgevoerd indien de knollen de gewenste grootte hebben.

Dosering: 4 liter per ha.

MISSION 200 SL kan in aardappelen worden toegepast aan een dosering van 2 L/ha voor onkruidbestrijding en aan een dosering van maximum 4 L/ha voor loofdoding.

Watervolume: 200-500 L/ha. De grootste hoeveelheid dient te worden gebruikt op een dicht gewas.

Risico's:

Doodspuitmiddelen kunnen beschadiging aan de knollen geven als gespoten wordt op een gewas met droogtestress (te kort aan vocht). Als in zo'n geval de eerste dagen na de bespuiting regen valt of het gewas nat wordt door zware dauw, is de kans op knolbeschadiging het grootst. Na een droogteperiode wachten met spuiten tot er voldoende regen is gevallen (+ 20 mm) om de grond in de rug voldoende te bevochtigen. Wacht in zo'n geval twee dagen alvorens te spuiten, om het gewas de gelegenheid te geven voldoende water op te nemen. Men dient voorzichtig te zijn met

toepassing op lichte zandgronden. Vermijd, in een periode van droogte, het spuiten bij een hoge luchtvochtigheid zoals mist, lichte regen of zware dauw.
Gewassen in stadium van doorwas zijn moeilijk te doden.

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP

Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Contact met de ogen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen

Contact met de huid Onmiddellijk afspoelen met veel water. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden

INSLIKKEN GEEN braken opwekken. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of antigifcentrum.

INADEMING Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zuurstof of kunstmatige beademing toepassen indien nodig.

NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.