

GLYPHOGAN® ALLROUND

Herbicide

Scan voor gebruik



Werkzame stof:

Glyfosaat 360 g/L (30,8 % w/w)

Aard van het preparaat:

Met water mengbaar concentraat

Resistentiegroep: HRAC G9

Toelatingsnummer: 15161N (W.1)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN



20 L

Glyphogan® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Registrations B.V.

ANEGLYANL20LT/06/A

printzone 2D code

121.0 mm

123.0 mm

496.0 mm

125.0 mm

127.0 mm

146.0 mm

- * Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
- ^a Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*)
- ¹ Dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid.
- ² Toepassing met behulp van “onkruidbestrijkers”, mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipst en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt.
- ³ Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden
- ⁴ Zie DOB (Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen, <http://www.dob-verhardingen.nl>)
- ⁵ Toepassen met handgedragen spuit met afschermkap.

Overige toepassingsvoorwaarden

Voor zilte teelten (lamsoor, seekraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt in bassins.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is pleksgewijze toepassing met een handgedragen/handgetrokken spuitboom op gewassen uit fytosanitaire overweging, in de bosbouw en op gesloten en halfopen verhardingen uitsluitend toegestaan indien op het hele perceel gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen of een afschermkap.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing met standaard techniek op gesloten en half open verhardingen uitsluitend toegestaan indien op het hele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit ten minste de klasse DRT75.

Toepassing van dit middel op gesloten en half open verhardingen is uitsluitend toegestaan volgens de ‘criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen’ volgens de DOB- methode (Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen, zie <http://www.dob-verhardingen.nl>).

127.0 mm

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inname: Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts of toon het etiket of de verpakking.

ADVIES VOOR DE ARTS

Dit product is geen cholinesteraseremmer.

125.0 mm

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel en middel voor de behandeling van stobben voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-gebied	Type toe-passing	Werk-zaamheid getoetst op	Dosering* middel per toe-passing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepas-singen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Mini-mum interval tussen toepas-singen in dagen	Veilig-heids ter-mijn in dagen
Akkerbouw-gewassen Bloembol- en bloemknol-gewassen (onbedekte teelt)	Doodspui-ten voor het planten of zaaien van het gewas	Dekvruch-ten	2,0 - 3,0 L/ha¹	3,0 L/ha	1 per 12 maanden	3,0 L/ha per 12 maanden	-	-
Akkerbouw-gewassen Fruitgewas-sen Groenteteelt Kruidenteelt Sierteeltge-wassen Cultuur-graslanden (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten¹	Onkruiden	2% (200 ml in 10 liter water)	0,4 L/ha²	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-
Akkerbouw-gewassen Fruitgewas-sen Groenteteelt Kruidenteelt Sierteeltge-wassen Cultuur-graslanden (onbedekte teelt)	Pleksgewijs aanstrijken²	Onkruiden	33% (1000 ml in 2 liter water)	0,4 L/ha³	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-

496.0 mm

Toepassings-gebied	Type toe-passing	Werk-zaamheid getoetst op	Dosering* middel per toe-passing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepas-singen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Mini-mum interval tussen toepas-singen in dagen	Veilig-heids ter-mijn in dagen
Akkerbouw-gewassen Cultuur-grasland Fruitge-wassen Groenteteelt Kruidenteelt Sierteelt-gewassen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten	Gewassen uit fyto-sanitaire overweging op aanwij-zing van de directeur van NPPO van NVWA, of rechts-opvolger	2% (200 ml in 10 liter water)	0,4 L/ha²	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-
Aardappelen	Behande-ling na het poten, voor opkomst	Onkruiden	2,0 - 6,0 L/ha¹	6,0 L/ha	1 per teeltcyclus	6,0 L/ha per teeltcyclus	-	-
Bieten	Behande-ling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden	2,0 - 6,0 L/ha¹	6,0 L/ha	1 per teeltcyclus	6,0 L/ha per teeltcyclus	-	-
Droog te oogsten erwten	Pleksgewijs spuiten, kort voor oogst¹	Onkruiden	2,0-5,0 l/ha¹	0,5 L/ha²	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	7
Groen-bemesters	Behande-ling over het gewas	Groen bemesters	2,0 - 3,0 L/ha¹	3,0 L/ha	1 per 12 maanden	3,0 L/ha per 12 maanden	-	-
Witlof (pennenteelt)	Behande-ling voor opkomst	Onkruiden	2,0 - 6,0 L/ha¹	6,0 L/ha	1 per teeltcyclus	6,0 L/ha per teeltcyclus	-	-
Fruitge-wassen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben bomen en van struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	2,0 L/ha per 12 maanden	-	-
Ui-achtigen (onbedekte teelt)	Behande-ling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden	2,0 - 6,0 L/ha¹	6,0 L/ha	1 per teeltcyclus	6,0 L/ha per teeltcyclus	-	-
Asperge (onbedekte teelt)	Behande-ling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden	2,0 - 6,0 L/ha¹	6,0 L/ha	1 per 12 maanden	6,0 L/ha per 12 maanden	-	-
Sierteelt-gewassen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	2,0 L/ha per 12 maanden	-	-

123.0 mm

Toepassings-gebied	Type toe-passing	Werk-zaamheid getoetst op	Dosering* middel per toe-passing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepas-singen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Mini-mum interval tussen toepas-singen in dagen	Veilig-heids ter-mijn in dagen
Bloembol- en bloemknol-gewassen (onbedekte teelt)	Behan-deling na poten, voor opkomst	Onkruiden	2,0 - 6,0 L/ha¹	6,0 L/ha	1 per teeltcyclus	6,0 L/ha per teeltcyclus	-	-
Openbaar groen en particuliere tuinen	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	2,0 L/ha per 12 maanden	-	-
	Pleks-gewijze injectie in de stengel	Holle stengel onkruiden zoals Japanse duizend-knoop	20% (20 ml in 100 ml water), injectie van 5-10 ml oplos-sing per stengel	4,5 L/ha	1	4,5 L/ha	-	-
Bosbouw	Pleksgewijs spuiten	Ameri-kaanse vogelkers ²	1% (100 ml in 10 liter water)	0,4 L/ha²	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-
Onbeteeld terrein	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	2,0 L/ha per 12 maanden	-	-
Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v. akker-randen	Spuiten over het onkruid	Onkruiden	2,0 - 3,0 L/ha¹	3,0 L/ha	1 per 12 maanden	3,0 L/ha per 12 maanden	-	-
Gesloten verharding	Pleksgewijs spuiten volgens DOB⁴	Onkruiden	2% (200 ml in 10 liter water)	0,5 L/ha²	2 per 12 maanden	1,0 L/ha per 12 maanden	30	-
Half open verharding	Pleksgewijs spuiten volgens DOB⁴	Onkruiden	2% (200 ml in 10 liter water)	0,5 L/ha²	2 per 12 maanden	1,0 L/ha per 12 maanden	30	-
Open verhar-ding	Spuiten over het onkruid⁵	Onkruiden	2,0 - 3,0 L/ha¹	3,0 L/ha	1 per 12 maanden	3,0 L/ha per 12 maanden	-	-

121.0 mm

Toepassings-gebied	Type toe-passing	Werk-zaamheid getoetst op	Dosering* middel per toe-passing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepas-singen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Mini-mum interval tussen toepas-singen in dagen	Veilig-heids ter-mijn in dagen
Bloembol- en bloemknol-gewassen (onbedekte teelt)	Behan-deling na poten, voor opkomst	Onkruiden	2,0 - 6,0 L/ha¹	6,0 L/ha	1 per teeltcyclus	6,0 L/ha per teeltcyclus	-	-
Openbaar groen en particuliere tuinen	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	2,0 L/ha per 12 maanden	-	-
	Pleks-gewijze injectie in de stengel	Holle stengel onkruiden zoals Japanse duizend-knoop	20% (20 ml in 100 ml water), injectie van 5-10 ml oplos-sing per stengel	4,5 L/ha	1	4,5 L/ha	-	-
Bosbouw	Pleksgewijs spuiten	Ameri-kaanse vogelkers ²	1% (100 ml in 10 liter water)	0,4 L/ha²	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-
Onbeteeld terrein	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	2,0 L/ha per 12 maanden	-	-
Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v. akker-randen	Spuiten over het onkruid	Onkruiden	2,0 - 3,0 L/ha¹	3,0 L/ha	1 per 12 maanden	3,0 L/ha per 12 maanden	-	-
Gesloten verharding	Pleksgewijs spuiten volgens DOB⁴	Onkruiden	2% (200 ml in 10 liter water)	0,5 L/ha²	2 per 12 maanden	1,0 L/ha per 12 maanden	30	-
Half open verharding	Pleksgewijs spuiten volgens DOB⁴	Onkruiden	2% (200 ml in 10 liter water)	0,5 L/ha²	2 per 12 maanden	1,0 L/ha per 12 maanden	30	-
Open verhar-ding	Spuiten over het onkruid⁵	Onkruiden	2,0 - 3,0 L/ha¹	3,0 L/ha	1 per 12 maanden	3,0 L/ha per 12 maanden	-	-

146.0 mm

GEBRUIK & DOSIS

2

3

4

5

10.0

152.0 mm

15.0



GLYPHOGAN® ALLROUND

Herbicide

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van Glyfosaat 360 g/L (30,8% w/w)

Toelatingsnummer: 15161N (W.1)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

GEVARENAANDUIDINGEN

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P234: Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Was handen na het hanteren of contact. Was verontreinigde kleding voor hergebruik. Reinig apparatuur na gebruik. Minimum- en maximum temperaturen voor opslag: -15 °C en 50 °C. Gedeeltelijke kristallisatie kan voorkomen door langdurige opslag onder de minimum opslagtemperatuur. Indien bevroren, plaats in warme ruimte en schud regelmatig om weer op te lossen. Dit product kan zonder negatief effect tot drie weken bij -20 °C worden gehouden. De verpakking mag niet worden hergebruikt.



8 718077 010533 >



www.agrirecover.eu

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



NEDERLAND

ANEGLYANL20LT/05/B

EERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

146.0 mm

Productname	Glyphogan® Allround	de kostendrukkers	
Country	The Netherlands		
Package size	20 L		
Label code	ANEGLYANL20LT/05/A		
Label dimensions	146 x 152 (h x w)	Name	Taco Plinck