

WG en aanbevelingen, Maxim 480 FS 14184N W.3

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een zaadbehandeling (zaadcoating) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing
Sla	Rhizoctonia ¹	100 ml per 100 kg zaad
Andijvie	Rhizoctonia ¹	100 ml per 100 kg zaad
Spinazie	Rhizoctonia ¹ Bladvlekkenziekte ²	100 ml per 100 kg zaad
Witlof	Rhizoctonia ¹	100 ml per 100 kg zaad
Veldsla	Rhizoctonia ¹	100 ml per 100 kg zaad
Courgette	Stengelrot ³ Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Komkommer	Stengelrot ³ Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae- niet-eetbare schil	Stengelrot ³ Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Aubergine	Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Tomaat	Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Paprika	Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Koolgewassen	Kankerstronken ⁵	100 ml per 100 kg zaad
Rammenas	Kankerstronken ⁵	100 ml per 100 kg zaad
Wortelen	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad
Wortelpeterselie	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad
Knolselderij	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad
Uien mu.v. tweedejaars plantui	Nekrot ⁷	100 ml per 100 kg zaad

Zaaisjalot	Nekrot ⁷	100 ml per 100 kg zaad
Bosuien	Nekrot ⁷	100 ml per 100 kg zaad
Peterselie	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad
Venkel	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad
Bladselderij	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)

² Bladvlekkenziekte (*Colletotrichum dematium*)

³ Stengelrot (*Didymella bryoniae*)

⁴ Fusarium (*Fusarium oxysporum*)

⁵ Kankerstronken (*Leptosphaeria maculans* (*Phoma lingam*))

⁶ Bladvlekkenziekte (*Alternaria spp*)

⁷ Nekrot (*Botrytis allii* (*Botrytis aclada*))

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbehandeling uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing
Blauwmaanzaad (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Teunisbloem (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Huttentut (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Chicorei (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Snijbiet (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Postelein (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Waterkers (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Rucola (onbedekte en bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad

Baby leaves (onbedekte en bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Augurk (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Okra (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Radijs (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Pastinaak (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Knolraap (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Koolraap (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Rode biet (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Schorseneer (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Knoflook (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Stengelgroenten m.u.v. rabarber, zeekool en zeekraal (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Stengelgroenten m.u.v. zeekool en zeekraal (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Basilicum	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Bieslook	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Bonenkruid (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Citroenmelisse (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Dille (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Dragon (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Hysop (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Kervel (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Koriander (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Maggiplant (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Majoraan (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Oregano (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Munt (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Pimpernel	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Rozemarijn (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Salie (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Tijm (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad

Aromatische wortelgewassen m.u.v. maggi (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
	Bodem- en kiemziektes ⁸	
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Valeriaan (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Zonnehoed (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Kruidentzaadgewassen m.u.v. karwij (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Potplanten (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Veredeling en zaadteelt van oliehoudende gewassen, vezelgewassen, cichorei, bladgroenten, vruchtgroenten, koolgewassen, wortel- en knolgewassen, ui-achtigen, stengelgroenten, kruiden en potplanten	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

⁸ Bodem- en kiemziektes (*Alternaria* spp., *Fusarium* spp. *Rhizoctonia solani*, *Sclerotinia* spp.)

Overige Toepassingsvoorwaarden

In veldslu kan het product enige gewasschade geven.

Dit middel bevat de werkzame stof fludioxonil. Fludioxonil behoort tot de phenylpyrroles. De FRAC code is 12. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Maatregelen ter voorkoming van oppervlaktewaterverontreiniging

“Gewasbeschermingsmiddelen horen niet thuis in water”

Om waterleven te beschermen en omdat oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding gebruikt kan worden is het van groot belang emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen. Syngenta raadt daarom aan de volgende maatregelen te nemen:

- Respecteer de verplichte maatregelen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) zoals de voorgeschreven driftreducerende maatregelen en teeltvrije zones.
- Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl of www.activiteitenbesluitagrarisch.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
- In bedekte teelten is het ten eerste af te raden om (filter) spoelwater, drainwater (substraatteelt) en drainagewater (grondgebonden teelt) ongezuiverd op het oppervlaktewater te lozen. Deze waterstromen dienen vóór lozing door een zuiveringsvoorziening geleid te worden, waarbij ten minste 95% van de aanwezige werkzame stof verwijderd wordt. De zuiveringsvoorziening dient regelmatig onderhouden en tenminste éénmaal per jaar op goede werking gecontroleerd te worden door een deskundige.

Dit middel werd niet op alle bestaande rassen getest. Het is daarom aan te bevelen om kiemtesten uit te voeren alvorens de volledige partij zaden te behandelen en te commercialiseren.