



Onkruidbestrijdingsmiddel in diverse teelten

Capsule suspensie (CS) op basis van
360 g/l clomazone

Toelatingsnummer: 12148 N WS

Chargenummer / Formuleringsdatum:
Zie verpakking

Netto inhoud: **1L**e

Gedistribueerd door:
Belchim Crop Protection N.V.
Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel

Tel.: 0167 521 246
Fax: 0167 521 323
Infolijn: 0032 (0)52 315 812
www.belchim.com



GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

Toelatingshouder:
FMC
FMC Chemical Sprl
Pleinlaan 9/3
B-1050 Brussel
België

© FMC en Centium zijn gedeponeerde
handelsmerken van FMC Corporation,
USA.

BELCHIM
—Crop Protection—

10059807-40051038

CENTIUM® 360CS

Toelatingsnummer: 12148 N WS
Werkzame stof: clomazone
Gehalte: 360 g/l
Aard van het preparaat: capsule suspensie (CS)

GEVAAR

- H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280A: Beschermende handschoenen dragen.
P285: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P304+341: NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P342+311: Bij ademhalingsmoeilijkheden: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL

Deze verpakking
is bedrijfsafval,
mits deze is
schoongespoeld
zoals wettelijk is
voorgeschreven

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan van de hand.

24u Noodnummer: 0032 14 58 45 45

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Consumptie-aardappel	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus	0,25 l/ha per teeltcyclus	-
Bieten	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 l/ha	1 per teeltcyclus	0,2 l/ha per teeltcyclus	-
	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 l/ha ¹	4 per teeltcyclus		7
			0,2 l/ha	1 per teeltcyclus		-
Droog te oogsten erwten	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus	0,25 l/ha per teeltcyclus	-
Droog te oogsten bonen	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus	0,25 l/ha per teeltcyclus	-
Veldboon (voor ensilage)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus	0,25 l/ha per teeltcyclus	-
Boon met peul (onbedekte teelt)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per 12 maanden	0,25 l/ha per teeltcyclus	-
Doperwt	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus	0,25 l/ha per teeltcyclus	-
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus	0,25 l/ha per teeltcyclus	-
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus	0,25 l/ha per teeltcyclus	-
Boerenkool (geplant, onbedekte teelt)	na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus	0,25 l/ha per teeltcyclus	-
Wortelen	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus	0,25 l/ha per teeltcyclus	-
Asperge (zaaibed, onbedekte teelt)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per 12 maanden	0,25 l/ha per 12 maanden	-

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Asperges (productieveld, onbedekte teelt)	na het steekseizoen of kort voor of na uitlopen gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per 12 maanden	0,25 l/ha per 12 maanden	-

¹ in LDS-systeem met toegelaten middelen.

Het gebruik in de teelt van winterkoolzaad, zomerkoolzaad, witte lupinen, raketblad, spinazie, tuinbonen, gezaaide boerenkool, gezaaide koolraap, knolselderij, bleekselderij, rabarber, knolvenkel en blauwmaanzaad is op basis van een “derdenuitbreidingen”. Deze “derdenuitbreidingen” zijn aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreidingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings-Gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Blauwmaanzaad	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus
Winterkoolzaad	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus
Zomerkoolzaad	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 l/ha	1 per teeltcyclus
Witte lupine	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus
Raketblad als groenbemester	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus
Spinazie (onbedekte teelt)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 l/ha	1 per 12 maanden
Tuinboon (onbedekte teelt)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus
Boerenkool (gezaaid, onbedekte teelt)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 l/ha	1 per teeltcyclus
Koolraap (gezaaid)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 l/ha	1 per teeltcyclus

Toepassings- Gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Knolselderij	kort na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus
Bleekselderij (onbedekte teelt)	kort na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus
Rabarber (onbedekte teelt)	voor of kort na uitlopen	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per 12 maanden
Knolvenkel (onbedekte teelt)	voor opkomst of na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 l/ha	1 per teeltcyclus

Toepassingsvoorwaarden

Centium kan in vrijwel alle teelten gewasreacties in de vorm van bladverkleuring (chlorose) en enige groeiremming veroorzaken, zeker als er veel neerslag valt in de periode kort na toepassing. Deze gewasreacties zijn doorgaans van tijdelijke aard zonder negatieve effecten op de uiteindelijke opbrengsten.

In koolgewassen kan er tot enkele weken na toepassing sprake zijn van extreme chlorose en enige groeiremming. Omdat het 4 tot 6 weken kan duren voordat deze symptomen uit het gewas verdwijnen wordt toepassing van het middel in kortdurende koolteelten afgeraden.

In bieten kan er onder bepaalde omstandigheden (veel neerslag in de periode rond toepassing, overlapping van spuitbanen) sprake zijn van extreme chlorose en uitdunning van het gewas waarbij opbrengstderving niet is uitgesloten.

In spinazie is enige bladverkleuring tot aan het einde van de teelt niet uitgesloten hetgeen met name problemen kan geven bij de teelt van verse spinazie.

Voor het zaaien of planten van allerlei volgteelten wordt een kerende grondbewerking d.m.v. ploegen aangeraden.

Mocht de behandelde teelt in het voorjaar mislukken dan wordt afgeraden om zomertarwe, zomergerst, haver, witlof, cichorei, sla, ui, prei of sierteelten als vervanggewas te gebruiken.

In een nateelt van bloembollen (o.a. tulpen) is de kans op verkleuringsverschijnselen na toepassing van Centium in een voorafgaande teelt niet uitgesloten. De nateelt van bloembollen na toepassing van Centium in een voorafgaande teelt wordt dan ook sterk afgeraden!

Door drift kan het middel schadelijke effecten veroorzaken aan naburige gewassen waaronder sierteeltgewassen, fruitbomen en andere houtige beplantingen.

Aanbevelingen

Centium 360 CS werkt als een herbicide tegen éénjarige, breedbladige onkruiden. Het middel wordt opgenomen door de wortels en de scheuten en opwaarts getransporteerd. Zeer gevoelig zijn kleeftuig, varkensgras, zwaluwtong, herderstasje en vogelmuur. Voor verbreding van het werkingsspectrum het middel mengen met daartoe geschikte producten.

In geplante teelten (sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, boerenkool, knolvenkel, bleekselderij en knolselderij) moet Centium 360 CS bij voorkeur toegepast worden binnen de 7 tot 10 dagen na het planten op een onkruidvrije, vochtige grond over een droog gewas.

In spinazie dient Centium 360 CS te worden toegepast op een vochtig zaaibed tot uiterlijk 3 dagen na zaai op niet voorgekiemd zaad. Het middel niet toepassen in de

zaadteelt van spinazie vanwege kans op plantuitval.

In bieten kan Centium 360 CS op verschillende manieren worden toegepast tegen éénjarige tweezaadlobbige onkruiden zoals bingelkruid, hondspeterselie, varkensgras, zwaluwtong, melganzenvoet en kleeftkruid waarbij een totale hoeveelheid van 0,20 L middel per ha per teeltseizoen niet mag worden overschreden:

- Direct na het zaaien:

- Dosering: 0,20 L middel per ha
- Als er ook echte kamille voorkomt dan het middel mengen met een daartoe geschikt product. Voor de toepassing direct na zaaien, Centium 360 CS niet mengen met een middel op basis van chloridazon.

- Na opkomst van het gewas:

- Toepassing vanaf het 2 tot 4 bladstadium van het gewas, al dan niet in combinatie met andere herbiciden. De voorkeur gaat uit naar gedeelde behandelingen (met lage doseringen) op kleine onkruiden. In totaliteit niet meer dan 0,20 L middel per ha toepassen.
- Dosering: 0,05 L middel per ha bij de eerste toepassing, eventueel oplopend tot 0,10 L middel per ha bij latere toepassingen op groter bieten.
- Het middel niet mengen met tri-allaat (Avadex) of met grassenmiddelen (FOP's of DIM's) die gebruikt worden voor de bestrijding van grassen in bieten.



Onkruidbestrijdingsmiddel in diverse teelten

Capsule suspensie (CS) op basis van
360 g/l clomazone

Toelatingsnummer: 12148 N 

Chargenummer / Formuleringsdatum:
Zie verpakking

Netto inhoud: **1L**e

Gedistribueerd door:
Belchim Crop Protection N.V.
Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel

Tel.: 0167 521 246
Fax: 0167 521 323
Infolijn: 0032 (0)52 315 812
www.belchim.com



GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

Toelatingshouder:
FMC
FMC Chemical Sprl
Pleinlaan 9/3
B-1050 Brussel
België

© FMC en Centium zijn gedeponeerde
handelsmerken van FMC Corporation,
USA.

 **BELCHIM**
—Crop Protection—

10059807-40051038

CENTIUM® 360CS

Toelatingsnummer: 12148 N 
Werkzame stof: clomazone
Gehalte: 360 g/l
Aard van het preparaat: capsule suspensie (CS)

GEVAAR

- H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280A: Beschermende handschoenen dragen.
P285: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P304+341: NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P342+311: Bij ademhalingsmoeilijkheden: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar



Deze verpakking
is bedrijfsafval,
mits deze is
schoongespoeld
zoals wettelijk is
voorgeschreven

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan van de hand.

24u Noodnummer: 0032 14 58 45 45