



Inhoud: **20Le**

Niet-selectief systemisch herbicide voor de bestrijding van overblijvende grassen, overblijvende tweezaadlobbige onkruiden en de meeste eenjarige onkruiden.

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 360 g/l glyfosaat

Toelatingsnummer: 13450 N (W.2)

CATAMARAN®

Toelatingsnummer: 13450 N (W.2)

Werkzame stof: glyfosaat

Gehalte: 360 g/l

Formulering: met water mengbaar concentraat (SL)

Voorzorgsmaatregelen:

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Chargennummer /
Formuleringsdatum: zie
verpakking

Aandachtig het etiket lezen
alvorens te gebruiken.



Toelatingshouder:



Protex nv/sa

Technologielaan 7, 1840 Londerzeel

T.: +32 (0)33/54.13.04

F.: +32 (0)33/54.01.07

® Gedeponoord handelsmerk van
Belchim Crop Protection NV



Verdeler: **Belchim Crop Protection N.V./S.A.**

Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel (België) | T.: +32 (0)52/30.09.06 | F.: +32 (0)52/30.11.35 | Voor technische vragen: +32 (0)52 315 815 | www.belchim.nl



Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegeestaan is uitsluitend het professionele gebruik als

- onkruidbestrijdingsmiddel
- doodspuitmiddel
- middel voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken

in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011)

onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings- gebied	Type toepas- sing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toes- passingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toes- passingen in dagen	Veiligheidsster- mijn in dagen
Akkerbouwgewas- sen	doodspuiten	Dekvruchten	2-4 l/ha ¹	4 l/ha	1x per 12 maanden	4 l/ha per 12 maanden	-	-
Pootaardappel	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teelt- cyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	-
Zetmeel- en consumptie-aar- dappel	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teelt- cyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	-
	kort voor oogst		2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teelt- cyclus		-	-
Bieten	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teelt- cyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	-
Granen	kort voor oogst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teelt- cyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Droog te oogsten erwten	kort voor oogst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teelt- cyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Droog te oogsten bonen	kort voor oogst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teelt- cyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Groenbemes- tergewassen	doodspuiten	Groen- bemes- tergewassen	2-4 l/ha ¹	4 l/ha	1x per 12 maanden	4 l/ha per 12 maanden	-	
Voedergrasland	over het gewas	Onkruiden en gras	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	5 dagen tussen toepassing en beweiden en/ of maaien
Appel	strokenbe- handeling	Onkruiden	2-6 l/ha op zwartstrook ²	3 l/ha in boomgaard	1x per 12 maanden	3 l/ha per 12 maanden	-	-
Peer	strokenbe- handeling	Onkruiden	2-6 l/ha op zwartstrook ²	3 l/ha in boomgaard	1x per 12 maanden	3 l/ha per 12 maanden	-	-
Uien	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teelt- cyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	-
Asperge	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-
Bloembol- en bloemknolgewas- sen	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teelt- cyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	-
	doodspuiten	Dekvruchten	2-4 l/ha	4 l/ha	1x per 12 maanden	4 l/ha per 12 maanden	-	-
Narcis (meerjarige teelt, onbedekt)	na afsterven loof, voordat nieuwe uit- loop begint	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-
Kerstbomen	over het gewas	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-
Bosbouw	pleksgewijs	Prunus serotina	1% (100 ml in 10 liter water)	0,4 l/ha ¹	1x per 12 maanden	0,4 l/ha per 12 maanden	-	-





Toepassings- gebied	Type toepas- sing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toe- passingen in dagen	Veiligheidsster- mijn in dagen
Akker- bouwgewassen, fruitgewassen, groententeelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden, openbaar groen	pleksgewijs	Onkruiden	2% (200 ml in 10 liter water)	1,3 l/ha ¹	1x per 12 maanden	1,3 l/ha per 12 maanden	-	-
Akker- bouwgewassen, fruitgewassen, groententeelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgrasland, openbaar groen	aanstryken ²	Onkruiden	33% (1 liter in 2 liter water)	1,3 l/ha ¹	1x per 12 maanden	1, l/ha per 12 maanden	-	-
Akker- bouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groententeelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen; openbaar groen	Doodspuiten	Gewassen uit fytosanitaire overweging	6-8 l/ha ¹	8 l/ha	1x per 12 maanden	8 l/ha per 12 maanden	-	-
	pleksgewijs		2% (200 ml in 10 liter water)	0,8 l/ha ¹	1x per 12 maanden		-	-
Fruitgewassen, sierteeltgewassen, openbaar groen, onbeteeld terrein	behandeling van stobben	(Nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	0,2 ml/m ² ⁽³⁾	1x per 12 maanden	0,2 ml/m ² per 12 maanden	-	-
Tijdelijk onbeteeld terrein (m.u.v akkerranden)	-	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-
Akkerranden ⁴	-	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	2x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	10 dagen	-
Open verhar- dingen	-	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-
Onverhard	-	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² met behulp van «onkruidbestrijkers», mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipet en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt

³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² toegepast mag worden

⁴ De toepassing op akkerranden is slechts toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van methoden en toestellen die geen drift veroorzaken, zoals onkruidstrijkers en toestellen met een afgeschermd spuitdop.

Toepassingsvoorwaarden

Dit middel mag niet worden toegepast op halfopen en gesloten verhardingen.

Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen slootaluds niet gespoten worden.

In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt





gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.

In kerstbomen geldt dat het gewas tenminste 2 jaar oud moet zijn.

Het doodspuiten van gewassen uit fytosanitaire overweging mag alleen plaatsvinden op aanwijzing van de hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Bereiding spuitvloeistof

- De tank half vullen met water, de roerinrichting starten, de juiste hoeveelheid middel toevoegen, en al roerend de tank verder vullen.
- Om schuimvorming te voorkomen de vulslang beneden het vloeistofniveau houden.

Eerste hulp

- Na inademing: In open lucht brengen.
- Na inslikken: Onmiddellijk water aanbieden om te drinken. Een bewusteloos persoon nooit iets toedienen via de mond. NIET doen braken, tenzij voorgeschreven door medisch personeel. Als er symptomen optreden, een arts raadplegen.
- Na huidcontact: Verontreinigde kleding, polshorloge en juwelen uitdoen. Verontreinigde huid wassen met veel water. Kleding wassen en schoenen reinigen vooraleer opnieuw te gebruiken.
- Na oogcontact: Onmiddellijk met veel water afspoelen. Tenminste 15 minuten verderzetten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Als de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.



Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan.





Niet-selectief systemisch herbicide voor de bestrijding van overblijvende grassen, overblijvende tweezaadlobbige onkruiden en de meeste eenjarige onkruiden.

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 360 g/l glyfosaat

Toelatingsnummer: 13450 N (W.2.)

CATAMARAN®

Toelatingsnummer: 13450 N (W.2.)

Werkzame stof: glyfosaat

Gehalte: 360 g/l

Formulering: met water mengbaar concentraat (SL)

Voorzorgsmaatregelen:

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



Inhoud:

20Le

Chargenummer /
Formuleringsdatum: zie
verpakking

Aandachtig het etiket
lezen alvorens te
gebruiken.



Toelatingshouder:



Protex nv/sa

Technologielaan 7

1840 Londerzeel

T.: +32 (0)33/54.13.04

F.: +32 (0)33/54.01.07

* Gedeponiseerd handelsmerk van
Belchim Crop Protection NV



BELCHIM
CROP PROTECTION

Verdeler: **Belchim Crop Protection N.V./S.A.** | Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel (België)

T.: +32 (0)52/30.09.06 | F.: +32 (0)52/30.11.35 | Voor technische vragen: +32 (0)52 315 815 | www.belchim.nl