

Serifel

Toelatingsnummer	15888 N
Wnr	W.0
Productgroep	Fungicide
Aard van het preparaat	Spuitpoeder
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600 (55 x 10 ⁹ CFU/g)
Houdbaarheidstermijn	6 maanden

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:	
-	
Pictogram	-
Signaalwoord	-
Gevarenaanduidingen	-
Voorzorgsmaatregelen	P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P280 Beschermende handschoenen dragen. P284 Adembescherming dragen. P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval. Of gelegeerd/gespoeld afvoeren conform STORL.
Aanvullende etiketelementen	SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STORL logo

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Mond spoelen en daarna 200-300 ml water drinken.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering # middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbeien (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	5
Bessen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	5

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering # middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Braam- en framboos-achtigen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	5
Sla; <i>Lactuca</i> spp. (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1 Sclerotinia *2	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	5
Veldsla (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1 Sclerotinia *2	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	5
Rucola (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1 Sclerotinia *2	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	5
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Champignon (binnen)	Teeltbed-behandeling	Trichoderma *3	100 g in 11 liter water per 100 m ² teeltbed	1 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	-

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

*1 Grauwe schimmel (*Botrytis* spp.)

*2 Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia minor*)

*3 Trichoderma (*Trichoderma aggressivum*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van sla, veldsla, rucola en vruchtgroenten van *Solanaceae* het middel toepassen in 200-2000 liter water per ha.

Continu roeren tijdens gebruik.

Bevat *Bacillus amyloliquefaciens* stam MBI600. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Algemeen

Serifel niet in een tankmix combineren met mancozeb- of folpet bevattende middelen, omdat deze middelen de werking van Serifel negatief beïnvloeden, wanneer dit in een tankmix wordt gespoten. Wekelijks afwisselen met deze middelen is geen probleem.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.