



Fidox[®] 800 EC

Inhoud: **20L^e**

Fidox[®] 800 EC
 UFI: 0820-90GE-V00J-1EYR



WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

- P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
 P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
 P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
 P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: prosulfocarb.

**Selectief
 onkruidbestrijdingsmiddel
 in aardappelen,
 wintertarwe, wintergerst,
 winterrogge en triticale**

Aard van het preparaat:
 Emulgeerbaar concentraat
 Werkzame stof: prosulfocarb
 Gehalte: 800 g/L (78,4% w/w)

Toelatingsnummer: 15029 N **(W.1)**

Chargenummer /
 Formuleringsdatum: zie verpakking



**Aanvullende
 informatie op
 binnenpagina**

Enkel voor
 magazijngebruik:



© Gedeponeerd handelsmerk van Globachem N.V.



Gedistribueerd door: **Belchim Crop Protection NV / SA**
 Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel | België | Tel.: +32 (0)52 30 09 06 | www.belchim.nl



5 414572 010117 >

TOELATINGSHOUDER: **GLOBACHEM NV**
 Lichtenberglaan 2019 | BE-3800 Sint-Truiden
www.globachem.com

Globachem
 Your Crop Counts

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering* (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Aardappelen	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	4.0 L/ha	1
Wintertarwe	Voor opkomst of na opkomst	Eenjarige onkruiden	1.5 – 4.0 L/ha	1
Wintergerst	Voor opkomst of na opkomst	Eenjarige onkruiden	1.5 – 4.0 L/ha	1
Winterrogge	Voor opkomst of na opkomst	Eenjarige onkruiden	1.5 – 4.0 L/ha	1
Triticale	Voor opkomst of na opkomst	Eenjarige onkruiden	1.5 – 4.0 L/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale het middel alleen in de herfst toepassen.

Het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

Als op een aangrenzend perceel bloeiende tulpen staan, kunnen bij contact met de werkzame stof de bloemstengels knikken (kiepers). Dit heeft geen invloed op opbrengst en nateelt.

AANBEVELINGEN

Wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale

Fidox® 800 EC bestrijdt een groot aantal eenjarige grassen (o.a. duist en windhalm) en breedbladige onkruiden (o.a. kleeftkruid, paarse dovenetel, hoenderbeet, ereprijs, ...).

De gebruiksdosis is 1,5 tot 4 liter per ha, 1 toepassing per 12 maanden.

De dosis van 4 L/ha is vereist bij sterke aanwezigheid van kleeftkruid en/of duist. Om een betere nawerking en een betere doeltreffendheid tegen onder andere kamille en akkerviooltje te krijgen, kan men aan Fidox® 800 EC een voor dit gebruik erkend herbicide toevoegen. Zware combinaties kunnen resulteren in mindere selectiviteit.

Fidox® 800 EC is veilig voor het gewas op voorwaarde dat het niet in contact komt met de kiemende zaden. Daarom moet het toegepast worden op een fijn klaargelegd zaaibed en bij een regelmatige zaaidiepte van minstens 3 cm. Op een grof zaai-bed, op een lichte, op een zeer zware of op een humusrijke grond is het beter een voor-opkomst behandeling met Fidox® 800 EC te vermijden. Indien er veel regen verwacht wordt, is het beter de behandeling uit te stellen.

Indien Fidox® 800 EC alleen wordt toegepast, zijn alle vervanggewassen in het voorjaar mogelijk.

Aardappelen

Fidox® 800 EC is een selectief herbicide voor aardappelen.

Fidox® 800 EC wordt toegepast op bezakte ruggen tot kort vóór de opkomst van de aardappelen aan 4 liter per ha, 1 toepassing per 12 maanden.

Fidox® 800 EC versterkt de werking van andere bodemherbiciden tegen o.m. kleeftkruid, ereprijs, paarse dovenetel, zwarte nachtschade, melganzenvoet, bingelkruid, duivenkervel, ..., en tegen eenjarige grassen (duist, windhalm en straatgras).



Maatregelen ter voorkoming van drift naar aangrenzende percelen:

Globachem NV raadt de volgende maatregelen aan om drift naar aangrenzende percelen te verminderen:

- Gebruik doppen die 90% driftreductie geven.
- Gebruik 200-400 L water/ha.
- Niet toepassen bij veel wind, noch bij windstil weer (aanbevolen windsnelheid tussen 1-5 m/s).
- Niet toepassen bij te hoge temperaturen om verspreiding door thermiek te vermijden. Bij voorkeur 's avonds spuiten.
- Boomhoogte maximaal 50 cm.
- Pas de rijsnelheid en druk aan de doppenkeuze aan. Ideale rijsnelheid is 7-8 km per uur.
- Bij toepassing in de herfst: indien **fruit, kruiden en groenten** worden geteeld, waarin de actieve stof prosulfocarb niet is toegelaten, **in nabijheid** van het te bespuiten perceel, dan **geen prosulfocarb toepassen tot na de oogst** van deze gewassen.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademen: frisse lucht, rust. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inslikken: niet doen braken, spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Huid: spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Ogen: spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt. Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan.