

CLIOPHAR 100 SL

HERBICIDE

Toelatingsnummer: 16473 N

Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat

Werkzame stof: Clopyralid

Gehalte: 100 G/L

Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2h)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Waarschuwing



Toelatingshouder:

UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a
4818 CP Breda

Distributeur:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
www.upl-ltd.com/nl

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld, zoals
wettelijk is voorgeschreven



8717185520484

1 L



Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Na opkomst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha per teeltcyclus	-
			0,5 l/ha	3 per teeltcyclus		7
Mais	Na opkomst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per teeltcyclus	1,2 l/ha per teeltcyclus	-
Koolzaad	Na opkomst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per teeltcyclus	1,2 l/ha per teeltcyclus	-
Vezelgewassen	Na opkomst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1 l/ha	1 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	-
Aardbei (onbedekte teelt)	Na oogst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1 l/ha	1 per 12 maanden	1 l/ha per 12 maanden	-
	Na uitplanten		0,5 l/ha	2 per teeltcyclus		7
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Na uitplanten of na opkomst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1 l/ha	1 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	-
			0,5 l/ha	2 per teeltcyclus		10
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Na uitplanten of na opkomst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1 l/ha	1 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	-
			0,5 l/ha	2 per teeltcyclus		10

Het gebruik in de teelt van graszaadteelt, miscanthus, quinoa, sorghum, graszodenteelt, snijbloemen, trekheesters, snijgroen, boomkwekerijgewassen en vaste planten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras	Na opkomst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	-
			0,6 l/ha	2 per 12 maanden		7
Miscanthus	Na opkomst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	-
Quinoa	Na opkomst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per teeltcyclus	1,2 l/ha per teeltcyclus	-
			0,5 l/ha	2 per teeltcyclus		7
Sorghum	Na opkomst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per teeltcyclus	1,2 l/ha per teeltcyclus	-
Graszodenteelt	Na opkomst	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	-
			0,6 l/ha	2 per 12 maanden		7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Snijbloemen (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	-
			0,5 l/ha	2 per 12 maanden		7
Trekheesters (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	-
			0,5 l/ha	2 per 12 maanden		7
Snijgroen (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	-
			0,5 l/ha	2 per 12 maanden		7
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	-
			0,5 l/ha	2 per 12 maanden		7
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Samengesteldbloemige onkruiden en distels	1,2 l/ha	1 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	-
			0,5 l/ha	2 per 12 maanden		7

Overige Toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

Restproducten uit de teelt van vezelgewassen mogen niet worden vervoederd.

Na gebruik in de graszaadteelt het gras/hooi niet vervoederen.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de periode van 1 september tot 1 maart.

Om het grondwater te beschermen mag dit product in de teelt van snijbloemen, trekheesters, snijgroen, boomkwekerijgewassen en vaste planten niet worden gebruikt in de periode van 1 september tot 1 maart.

Bij het mislukken van de teelt kunnen problemen verwacht worden bij de teelt van de vervanggewassen boon, erwt, aardappel, klaver, sla, schorseneer, witlof, cichorei, wortel, ui, spinazie (deze lijst is niet volledig).

AANBEVELINGEN

Algemeen

CLIOPHAR 100 SL is een systemisch bladherbicide. Het middel bij voorkeur spuiten bij groeizaam weer, bij temperaturen van $\pm 15^{\circ}\text{C}$ en hoge luchtvochtigheid. Niet spuiten bij temperaturen hoger dan 25°C of als binnen 6 uur regen wordt verwacht. CLIOPHAR 100 SL heeft een goede werkzaamheid tegen samengesteldbloemige onkruiden en distels.

Toepassingen

Bieten

Tijdstip van toepassing: 1 tot 10 bladstadium van de bieten (BBCH 10-19)

De volle dosis van 1,2 l/ha wordt toegepast op bieten in 8 of 9 bladstadium ter bestrijding van distels en samengesteldbloemige onkruiden. 3 fracties van 0,5 l/ha CLIOPHAR 100 SL toevoegen aan de standaardmiddelen van het lage doseringssysteem vanaf het 2-bladstadium van de biet. Een interval van 7 dagen tussen de behandelingen dient gerespecteerd te worden. Deze toevoeging van 3 x 0,5 l/ha CLIOPHAR 100 SL bestrijdt zeer kleine hondspeterselie en drielig tandzaad en heeft eveneens een werking tegen o.a. veelknopigen, zwarte nachtschade, kamille-soorten, akkerkool en klein kruiskruid.

Maïs

Tijdstip van toepassing: 6 tot 10 bladstadium van de maïs (BBCH 16-19)

Koolzaad

Tijdstip van toepassing: vanaf het 2 bladstadium in de herfst, of na het hernemen van de groei en voor het begin van de bloei in de lente.

Vlas

Tijdstip van toepassing: 12 tot 18 cm hoogte van het vlas, niet spuiten na het verschijnen van de bloemknop

Onbedekte teelt van aardbei

Tijdstip van toepassing: BBCH 15 tot 97 (zomer/herfst)

De volle dosis van 1,0 l/ha wordt toegepast in het najaar na de oogst (BBCH 90-97) ter bestrijding van distels en samengesteldbloemige onkruiden.

Gefractioneerde toepassing van Cliophar 100 SL in 2 fracties van 0,5 l/ha ter bestrijding van kleine éénjarige onkruiden. De behandeling dient plaats te grijpen vanaf 10 dagen na het planten in de zomer (BBCH15-19) en zal herhaald worden in functie van het stadium van de aardbeien of de onkruiden. Een interval van 7 dagen tussen de behandelingen dient gerespecteerd te worden.

Onbedekte teelt van sluitkoolachtigen en bloemkoolachtigen

Tijdstip van toepassing: BBCH 12-18 (3 tot 4 weken na het planten)

De volle dosis van 1,0 l/ha wordt toegepast vanaf het 2 bladstadium of 3 tot 4 weken na planten ter bestrijding van distels of samengesteldbloemige onkruiden.

Gefractioneerde toepassing van Cliophar 100 SL in 2 fracties van 0,5 l/ha ter bestrijding van kleine éénjarige onkruiden. De eerste behandeling vindt plaats op BBCH 15-16 en de tweede op BBCH 17-18. Een interval van 10 dagen tussen de behandelingen dient gerespecteerd te worden.

CLIOPHAR 100 SL

HERBICIDE

Toelatingsnummer: 16473 N

Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat

Werkzame stof: Clopyralid

Gehalte: 100 G/L

Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2h)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Waarschuwing



Toelatingshouder:

UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a
4818 CP Breda

Distributeur:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
www.upl-ltd.com/nl

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld, zoals
wettelijk is voorgeschreven



8717185520484

1L



