




Curzate® M WG

FUNGICIDE

GROEP

M3; 27

FUNGICIDE



Fungicide voor de phytophthorabestrijding in aardappelen.

Water dispergeerbaar granulaat
Werkzame stof(fen): cymoxanil en mancozeb

Gehalte(n): 4,5% resp. 68%
Toxicologische groep (en): o.a. dithiocarbamaten.

Toelatingsnummer 8708 N (W.5.)

!

WAARSCHUWING

GEVARENAANDUIDINGEN

- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

- Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
- Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
- NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- Gelekte / gemorste stof opruimen.
- Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
- Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

OVERIGE VERMELDINGEN

- In noodgevallen kunt u contact opnemen met CHEMTREC, telefoonnummer 085-8880596.
- Voor algemene en/of productvragen kunt u onze website bezoeken: www.nld.ag.dupont.com. Ook kunt u bellen: 078-621 9500.

OPSLAG
Vorstvrij, in originele goed gesloten verpakking bewaren. Opslagruimte goed ventileren. Niet nat laten worden.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



K-37442/31503 - THE NETHERLANDS

Inhoud: 10 kg e

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing
Aardappelen	aardappelziekte¹	2,5 kg/ha

¹ aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMEEN

Werking
CURZATE® M bevat naast de preventief werkende component mancozeb het curatief werkende bestanddeel cymoxanil. Beide stoffen vullen elkaar zeer goed aan. Mancozeb is een contact fungicide met een preventieve werking. Cymoxanil is een lokaal-systemisch fungicide met zowel een preventieve als een curatieve werking. CURZATE® M is effectief tegen gevoelige en phenylamide resistente isolaten van *Phytophthora infestans*.

Omstandigheden tijdens en na de toepassing
CURZATE® M kan veilig gebruikt worden in aardappelen. Het middel kan gespoten worden op een dauwnat gewas.

Opname- en aandroogtijd
In het algemeen is een bespuiting geslaagd als er binnen 2 uur na de toepassing geen neerslag valt, want cymoxanil wordt binnen 2 uur na toepassing door de plant grotendeels opgenomen en mancozeb is binnen 2 uur voldoende aangedroogd. Bij toepassing tijdens lage relatieve luchtvochtigheid kan de opname van cymoxanil langer duren. Bij toepassing op een vochtig gewas kan de aandroogtijd van mancozeb langer zijn dan 2 uur.

Regenvastheid
In geval van extreem veel neerslag (20 mm) in korte tijd kan de duurwerking van het preventieve (contact) fungicide negatief worden beïnvloed. Daarom is het sterk aan te bevelen om de volgende bespuiting in een dergelijke situatie te vervroegen.

ZIEKTEN

Werkingspectrum
CURZATE® M kan ingezet worden voor de bestrijding van de aardappelziekte (*Phytophthora infestans*).

Stadium
CURZATE® M kan met name preventief ingezet worden. Reeds aanwezige, zichtbare infecties worden niet afdoende bestreden.

TOEPASSINGEN

Algemeen
CURZATE® M moet homogeen worden verdeeld. Het vereist een goed afgestelde spuitmachine om niet behandelde gedeelten en overdosering te vermijden.

Aantal toepassingen
Het is toegestaan in totaal maximaal 6 toepassingen met CURZATE® M uit te voeren. Het gewas dient beschermd te zijn totdat blad en stengel volledig zijn afgestorven.

Waterhoeveelheid
CURZATE® M kan gebruikt worden in een volume van 150-400 l water per ha.

CONSUMPTIE-, ZETMEEL- en POOTAARDAPPELEN

Toepassing ter voorkoming van aantasting
Het tijdstip van de eerste bespuiting hangt af van de ziektedruk (aanwezigheid van een bron), de weersomstandigheden, het ras en de ontwikkeling van het gewas.

Daarna de bespuitingen om de 7-12 dagen herhalen; wederom afhankelijk van de ziektedruk, weersomstandigheden, ras en gewasontwikkeling. Het kortste interval hanteren in geval van hoge ziektedruk en/of snelle loofontwikkeling.

Voorspellings- en waarschuvingssystemen zijn zinvolle hulpmiddelen in het bepalen van het moment van de eerste bespuiting en de vervolgbespuitingen.

Dosering: 2,5 kg per ha.

GEREEDMAKEN VAN DE SPUITVLOEISTOF

- Begin met een schone spuitmachine;
- Vul de tank voor een kwart met water en stel het roersysteem in werking.
- Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe.
- Vul de tank verder met water.
- Hou tijdens het spuiten het roersysteem in werking.
- Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden geleegd, schoongemaakt met water, en het speelwater te worden toegevoegd aan de tank.

LET OP:
De verpakking hermetisch sluiten om het product in goede conditie te houden. Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk.

MENGINGEN

CURZATE® M kan veilig gemengd worden met alle in de aardappelteelt gangbare herbiciden, fungiciden, insecticiden en minerale oliën of uitvloeiërs.

Voor overige tankmengingen raadpleeg uw leverancier of Du Pont. Raadpleeg ten allen tijde ook het etiket van de mengpartner.

Toepassingsvoorwaarden

Om de vogels te beschermen is toepassing de in teelt van aardappelen uitsluitend toegestaan na sluiting van het gewas (BBCH 39).

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
6	7	14

DRIFTMANAGEMENT

Het overwaaien van spuitnevel (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten), naburige en/of nog te zaaien of te beplanten percelen moet worden voorkomen. Spuit daarom bij rustig weer met weinig wind. Neem tevens de algemeen vereiste driftreducerende maatregelen en/of bufferzones in acht.

SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Het is van groot belang en tevens goed agrarisch gebruik om de apparatuur direct na de behandeling zorgvuldig schoon te maken.

- Verspuit de restvloeistof over het bespoten perceel;
- Vul de tank halfvol met water;
- Het roersysteem in werking stellen en een aantal minuten laten inwerken;
- Vervolgens dit mengsel verspreiden over het zojuist bespoten perceel;
- Tenslotte de gehele machine (spuittank, spuitboom, leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen;

LET OP:
Vermijd verontreiniging van oppervlaktewater.

Regelmatig onderhoud/schoonmaken van de spuit apparatuur is nodig als men zich van een probleemloos gebruik wil verzekeren.

RESISTENTIE

Wanneer fungiciden met hetzelfde werkingsmechanisme verschillende jaren achter elkaar worden gebruikt in hetzelfde perceel, kunnen van nature voorkomende minder gevoelige stammen overleven, zich uitbreiden, en dominant worden in dit veld. Om dit verschijnsel tegen te gaan is het goed om indien mogelijk afwisselend fungiciden te gebruiken met een verschillend werkingsmechanisme. Bij het gebruik van fungiciden dienen altijd de gebruiksvoorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Na INADEMING: Het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen en in de frisse lucht brengen. Geef zuurstof of kunstmatige ademhaling, indien nodig. Raadpleeg een arts na aanzienlijke blootstelling.
Na morsen op KLEREN en HUID: De verontreinigde kleding verwijderen; haar en huid onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding wassen voordat het opnieuw wordt gebruikt.
Na spatten in de OGEN: de oogleden goed opensperren en gedurende 15 minuten overvloedig spoelen met zacht stromend water. Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen.
Na INSLUKKEN: het slachtoffer zal meestal bij bewustzijn blijven. Geef onmiddellijk 1-2 glazen water te drinken en wek braken op. Bewusteloze mensen niets via de mond toedienen en niet laten braken. Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

BELANGRIJK

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiks-aanwijzing. De garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.
Baanhoekweg 22 - 3313 LA Dordrecht - Tel.: 078-621 9500.

Geproduceerd in Frankrijk

Chargenummer: zie de verpakking
Productiedatum: zie de verpakking

© Gedeponeerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)