

Olie-H

Toelatingsnummer: 6598 N W.7

Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat

Werkzame stof: paraffine olie

Gehalte: 96%

Inhoud: 20 l, 200 l, 1000 l



Gevaar

Gevaaraanduidingen:

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen:

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC))

GEEN braken opwekken.

Aanvullende etiketinformatie:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:

- a. insecticide ter voorkoming van de overdracht van non-persistente virussen door bladluizen in de teelt van pootaardappelen en bloembolgewassen;
- b. insecticide en acaricide in de teelt in de vollegrond van pit- en steenvruchten met dien verstande,
 - dat de toepassing vòòr 1 mei op percelen grenzend aan watergangen uitsluitend is toegestaan indien het middel in de eerste 20 meter grenzend aan de watergang verspoten wordt met een Venturidop met uitgeschakelde ventilatorstand waarbij de laatste bomenrij éézijdig bespoten dient te worden.
 - dat de toepassing nà 1 mei op percelen grenzend aan watergangen uitsluitend is toegestaan:
 - . indien het middel in de eerste 20 meter grenzend aan de watergang verspoten wordt met een Venturidop waarbij de laatste bomenrij éézijdig bespoten dient te worden, òf
 - . indien er naast de watergang op de rand van het rijpad een windhaag is geplaatst in combinatie met een eenzijdige bespuiting van de laatste bomenrij, òf
 - . indien het middel wordt verspoten met een tunnelspuit.
- c. insecticide en acaricide in de teelt in de vollegrond van bessen en houtig kleinfruit.

Het middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

- a. Voorkoming overdracht van non-persistente virussen

Pootaardappelen - ter vermindering van de overdracht van non-persistente virussen in pootaardappelen. Om virusinfectie van het gewas te verminderen kan het loof vanaf de opkomst tot een week voor het doodspuiten of looftrekken regelmatig worden bespoten.

Toepassingen

1e bespuiting: zodra ongeveer 90% van de planten is opgekomen.

2e bespuiting: 3 à 4 dagen na de eerste bespuiting .

3e en volgende bespuitingen: wekelijks herhalen tot één week voor het doodspuiten of looftrekken.

Dosering: 12,5 liter per ha Olie-H in 400-600 liter per ha.

Opmerkingen:

- De behandeling uitvoeren op een droog gewas, bij voorkeur tegen de avond bij bewolkte hemel.
- Er dient rekening te worden gehouden met opbrengstderving tengevolge van de bespuitingen. De mate waarin deze bij verschillende rassen kan optreden is onvoldoende bekend.
- Middelen ter bestrijding van Phytophthora moeten afzonderlijk worden toegepast.
- Gebruik ook geen combinatie van insecticiden en Olie-H.

Lelies en tulpen - beperking van verspreiding van virussen.

Door gewas-bespuitingen met Olie-H wordt de verspreiding van non-persistente virussen, met name tulpenmozaïekvirus en symptoomloos lelievirus (praktijknaam: leliel latentvirus) tegengegaan.

Doseringen: 12,5 liter Olie-H in 400 liter water per ha.

Opmerkingen:

Lelies: de bespuiting wekelijks uitvoeren in mei, juni en juli en om de 10 dagen in augustus/september.

Tulpen: bespuiting vanaf de eerste week in mei tot half juni wekelijks uitvoeren.

- N.B.
- menging met middelen ter bestrijding van “vuur” is mogelijk;
 - menging met andere merken olie wordt ontraden;
 - toepassing in de namiddag of avond heeft de voorkeur.

Hyacinten - tegen hyacintenmozaïekvirus.

Dosering: 12,5 liter in 400 liter water per ha..

Vanaf de eerste week in mei tot 10 dagen voor het rooien wekelijks een bespuiting uitvoeren. Deze toepassing kan in het bijzonder worden aanbevolen bij de teelt van werkbollen en van pluis, alsmede op cultivars, die mogelijk “groen” te telen zijn. Toepassing moet worden ontraden op cultivars, die gevoelig zijn voor geelziek en op partijen, waarin tijdens de bewaring geelzieke bollen zijn gevonden, of waarin in het voorjaar geelziek is aangetroffen.

Opmerkingen: Opbrengstderving (5 à 10 %) is mogelijk. Menging met middelen ter bestrijding van “vuur” is mogelijk.

Pit- en steenvruchten (o.a. appels, peren, pruimen en kersen), bessen en houtig kleinfruit (o.a. frambozen en bramen), voor het doden van eieren van insecten en mijten (o.a. wantsen en spint).

In het gevorderde muizenoorstadium een behandeling uitvoeren bij windstil weer op droge bomen en als droog weer wordt verwacht. Er bestaat kans op bladbeschadiging, vooral als na de bespuiting nachtvorst optreedt.

Dosering: 3% (3 liter middel per 100 liter water)