

Roundup[®] Ultimate



Een herbicide
van Monsanto

www.roundup.nl



Hoge concentratie

480 g/l glyfosaat werkzame stof



Zeer goede werking

Ook in hard water



Regenvastheid

Regenvast na 1 uur



Weersonafhankelijk

Beste werking onder moeilijke omstandigheden

Niet selectief systemisch onkruidbestrijdingsmiddel. Voor gebruik in: Tuinbouw, Landbouw, Grasland, Bosbouw, Algemeen onderhoud.

Bestemd voor professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 13865 N

W3

Werkzame stof:

480 g/l glyfosaat / 35,7 % (w/w)

Met water mengbaar concentraat (vloeistof)

Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Monsanto Europe N.V.
Scheldelaan 460, Haven 627
B-2040 Antwerpen, België
Tel.: 0032 3 568 54 92
Fax: 0032 3 568 54 94

© Roundup, MONSANTO en het wijrprank symbool zijn gedeponeerde merken van Monsanto Technology LLC.

© Monsanto Europe N.V., 2018

NL, 1803, F - 1288 **6895**

Inhoud: **e 5 L**

Lotnr/Productiedatum:



MONSANTO



Roundup[®] Ultimate



Een herbicide
van Monsanto

www.roundup.nl



Hoge concentratie

480 g/l glyfosaat werkzame stof



Zeer goede werking

Ook in hard water



Regenvastheid

Regenvast na 1 uur



Weersonafhankelijk

Beste werking onder moeilijke omstandigheden

Niet selectief systemisch onkruidbestrijdingsmiddel. Voor gebruik in: Tuinbouw, Landbouw, Grasland, Bosbouw, Algemeen onderhoud.

Bestemd voor professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 13865 N

W3

Werkzame stof:

480 g/l glyfosaat / 35,7 % (w/w)

Met water mengbaar concentraat (vloeistof)

Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Monsanto Europe N.V.
Scheldelaan 460, Haven 627
B-2040 Antwerpen, België
Tel.: 0032 3 568 54 92
Fax: 0032 3 568 54 94

© Roundup, MONSANTO en het wijnrank symbool zijn gedeponeerde merken van Monsanto Technology LLC.

© Monsanto Europe N.V., 2018

NL, 1803, F - 1288 6925

Inhoud: **15 L**

Lotnr/Productiedatum:



5 411773 112251 >

MONSANTO





Een herbicide
van Monsanto


www.roundup.nl



Hoge concentratie
480 g/l glyfosaat werkzame stof



Regenvastheid
Regenvast na 1 uur



Zeer goede werking
Ook in hard water



Weersonafhankelijk
Beste werking onder moeilijke
omstandigheden

Niet selectief systemisch onkruidbestrijdingsmiddel.

Voor gebruik in: Tuinbouw

Landbouw, Grasland, Bosbouw, Algemeen onderhoud.

Bestemd voor professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 13865N

Werkzame stof: 480g/l glyfosaat / 35,7% (w/w)

Met water mengbaar concentraat (vloeistof)

Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen

Veiligheidsaanbevelingen:

P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking
geen water verontreinigt.

Monsanto Europe N.V.
Scheldelaan 460, Haven 627 B-2040 Antwerpen, België
Tel.: 0032 3 568 54 92 Fax: 0032 3 568 54 94

® Roundup, MONSANTO en het wijnransymbool zijn gedeponeerde merken
van Monsanto Technology LLC.

© Monsanto Europe N.V. 2018

NL, 1803, C - 1288 6921

In geval van nood:
Bij vergiften uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiften Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30 274 88 88
In overige gevallen: (24 u / 24 u) 00 32 3 568 51 23

4x5L



115.0 mm

B. AANBEVELING
B1. Algemeen
Roundup® Ultimate is een niet-selectief bladherbicide met systemische werking.
Het werkt tegen éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleeftkruid, muur, varkensgras, e.a. Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver, wikkesoorten en moerasandoom.
Mossen worden niet bestreden.
De onkruiden worden zowel in een jong als in een ouder stadium bestreden.
Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd.
De werking is derhalve het beste als de onkruiden voldoende blad hebben ontwikkeld en niet beschadigd zijn door ziekten en plagen.
De toepassing heeft het beste resultaat tijdens niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid.
Het middel dient niet te worden toegepast als er kans is op aanhoudende vorst of als er binnen een uur na de toepassing kans op regen bestaat.
Tijdens de toepassing van het middel dienen gewas- en onkruid bij voorkeur droog te zijn.
Voor elke toepassing van Roundup Ultimate dient men er op bedacht te zijn dat het middel niet selectief is en dus in zeer geringe hoeveelheden al schade kan veroorzaken aan te sparen gewassen; de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te gebeuren.
Gebruik ter voorkoming van overwaaien een middelmat- ige tot grove druppelgrootte.
Belangrijk:
- Vorstrij opslaan.
- De spuit voor en na gebruik onmiddellijk grondig schoon maken.
- Voorkom drift, spuit met lage druk, houd rekening met de windrichting.

115.0 mm

B2. Lege verpakkingen en spuitoverschotten
De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie maal met schudden), ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproei-toestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. De spuitoverschotten verspreiden op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.
B3. Grondbewerking na toepassing van Roundup Ultimate:
Let op dat de gedode massa onder niet te droge en niet te natte omstandigheden door de bouwvoor wordt verdeeld (liefst fijn gehakseld), of dat deze massa middels een goed kerende grondbewerking volledig wordt ondergebracht. Vervolgens is het noodzakelijk dat deze massa de kans krijgt volledig te verteren voor het volgende gewas wordt gezaaid, gepoot of geplant.
B4. Watervolume
200 - 400 l/ha is aan te bevelen.
Lagere watervolumes kunnen worden gebruikt als de spuitapparatuur hiervoor geschikt is.
De tank half vullen met water, de roerinrichting starten, de juiste hoeveelheid middel toevoegen, en al roerend de tank verder vullen.
B5. Teeltspecifieke details
a.) Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras
Rogge, gerst of gras in het najaar gezaaid op stuif- gevoelige grond in de bloembollenteelt of akkerbouw sterft na behandeling langzaam af, waardoor de bodem- beschermende functie lang behouden blijft.
Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden. In de bloembollenteelt dient het dekgewas te worden doodgespoten ruim voor de opkomst van de bloembolgewassen.
In de akkerbouw kan vanaf een week na de bespuiting in de onbewerkte grond worden gezaaid.

b.) Doodspuiten van dekvruchten op erosiegevoelige grond
Dekvruchten gezaaid op erosiegevoelige grond sterven na behandeling langzaam af, waardoor enerzijds de bodembeschermende functie langer behouden blijft en anderzijds inzaai van een nieuw gewas mogelijk wordt. Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden. Vanaf een week na de bespuiting kan in de onbewerkte grond worden gezaaid.
c.) Voor opkomst van uien, bieten, aardappelen, witlof, asperges en bloembollen
Tegen reeds bovenstaande onkruiden.
Opmerking:
Niet later toepassen dan enkele dagen voor de opkomst van genoemde gewassen. De grond mag nog niet breken.
d.) In zetmeel- en consumptieaardappelen, na volledig afsterven van het loof
Als het loof van de aardappelen is doodgespoten of van nature volledig afgestorven is.
Opmerking:
Om het middel voldoende gelegenheid te geven in te werken op de onkruiden, dient niet later dan 1 week voor de oogst te worden gespoten.
e.) Kort voor de oogst in alle afgerijpte graangewassen en droog te oogsten erwten en bonen
Toepassing:
Granen:
De behandeling uitvoeren wanneer het graangewas geheel is afgerijpt:
- vlagblad geheel om de stengel geplooid;
- graankorrel deegrijp en minder dan 30 % vocht bevat;
- het stro geheel geel is doch de knopen nog groen-geel zijn.
Erwten en bonen (veldbonen en stambonen):
De behandeling uitvoeren op een afgerijpt gewas wanneer de zaden minder dan 30 % vocht bevatten.
Opmerkingen:
- Veiligheidstermijn tussen bespuiting en oogst tenminste 7 dagen aanhouden.
- Het behandelde erwten- en bonenstro kan vervoerd worden.
- Grondbewerking, na verwijderen/hakselen van stro, kan onmiddellijk uitgevoerd worden.
- Alle gewassen kunnen direct ingezaaid worden.

f.) Als groenbemester geteelde gewassen
Deze toepassing wordt uitgevoerd om bij ondiep onderwerken hergroei in het voorjaar te voorkomen.
Toepassing:
circa 1 week voor de grondbewerking.
g.) Grasland
Ter bestrijding van kweekgras en andere ongewenste vegetaties bij graslandvernieuwing. Na maaien of beweiden, wachten met spuiten tot het kweekgras weer 10 - 15 cm lang is, of 4 - 6 bladeren heeft.
Doorzaaien (zonder grondbewerking)
Bij voorkeur half juli - half september.
1 week na de bespuiting kan zonder grondbewerking met een speciale doorzaaimachine worden gezaaid. Om een goede aanslag van het jonge gras te verkrijgen is het nodig om het bespoten gras af te maaien en te verwijderen. Dit gras mag na 5 dagen afgegrast of afgemaaid en als kuilvoeder, of als hooi vervoerd worden. Het uitrijden van runderdrijfmest kort voor het doorzaaien verbetert de opkomst van het nieuw ingezaaide gras: opletten voor de wetgeving dienaangaande.
Herinzaaien, inzaaien of planten van een ander gewas
Herinzaai van grasland bij voorkeur uitvoeren half juli/september. Na de toepassing 1 week wachten voor een grondbewerking wordt uitgevoerd.

h.) In de fruitteelt onder groot fruit bomen
Toepassen op de zwartstrook vanaf 1 februari tot uiterlijk 1 juli onder bomen welke minimaal drie jaar vaststaan. Afwisseling met een bodemherbicide verdient bij de eerste toepassing in het voorjaar aanbeveling.
Opmerkingen:
Bladeren, takken, onverhoude bast, alsook stoot- en snoeiwonden van de bomen niet met de spuitvloeistof raken. Na het snoeien acht dagen wachten met de toepassing om eerst de snoeiwonden te laten verdrogen. Wortelopslag mag worden geraakt.
i.) 2-jarige teelt van narcissen
Alleen toepassen als het loof volledig is afgestorven en voordat nieuwe uitloop begint. Het beste tijdstip ligt tussen half augustus en half september.
j.) In kerstbomen
Op tenminste 2 jaar oude aanplantingen van Picea abies (P. excelsa) en Abies Nordmanniana.

Toepassing:
In het najaar vanaf het moment dat het jonge schot van de kerstsparen geheel is verhout (na 1 november).
k.) In de bosbouw ter bestrijding van Amerikaanse Vogelkers
Toepassing:
uitsluitend op één- à tweejarige loten die geen bessen dragen en niet hoger zijn dan 1,50 m; goede bevochtiging van de bladeren is nodig, zonder afdruppen; spuiten vanaf half augustus tot eind september.
Opmerking:
Bramen, bosbessen en houtopstand mogen niet worden geraakt, ook moet bevochtiging van de niet verhoude delen van andere gewenste soorten worden voorkomen.

l.) Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in land- en tuinbouwgewassen, grasland alsmede in openbaar groen met behulp van handspruitapparatuur
Ter bestrijding van wortelonkruiden zoals aardappelopslag, distels, klein hoefblad, bentpollen, knolcyperus, kweekgras e.d. door middel van een pleksgewijze bespuiting van de onkruiden.
Om beschadiging van het gewas te voorkomen is het aanbevelen een afschermkap of andere nauwkeurige doseringsapparatuur te gebruiken.
Gewasplanten en/of plantsoenbeplantingen die geraakt worden, sterven af.
Ter markering kan een kleurstof aan de spuitoplossing toegevoegd worden.
m.) In land- en tuinbouwgewassen, grasland alsmede in weg- en plantsoenbeplanting met behulp van onkruidbestrijkers
Pleksgewijze en/of selectieve bestrijding van eenjarige en overblijvende onkruiden inclusief aardappelopslag met behulp van speciaal voor dit doel ontwikkelde onkruidbestrijkers.
Ter bestrijding van boven het gewas uitstekend onkruid dient er minimaal een hoogteverschil van 10 cm tussen onkruid en gewas te zijn. Ter bestrijding van individuele onkruidplanten en onkruidhaarden tussen het gewas of beplanting kan handapparatuur worden gebruikt.
Ter voorkoming van schade mag het cultuurgewas of de gewenste vegetatie beslist niet in aanraking komen met de Roundup Ultimate -oplossing.

Bestrijding van riet in cultuurgewassen wordt afgeraden in verband met kans op schade door guttatievocht.
Met bepaalde apparatuur (b.v. strokenstrijkers tussen gewasrijen) worden lagere concentraties dan 25 % oplossingen van Roundup Ultimate toegepast.
Opmerking:
Alleen toepassen als het gewas en de onkruiden droog zijn.
Resterende oplossing van Roundup Ultimate dient men in apparatuur te laten zitten of na verdere verduunning te gebruiken voor toegelaten bespuitingsdoeleinden.
Tijdens opslag en transport moet om de afgeveerde delen (touw, doek, borstel, spons) van de apparatuur een beschermkap of plastic kap zijn aangebracht zodat contact met de huid uitgesloten is.
n.) Stobbenbehandeling
Verse zaagvlakken van afgezette bomen insmeren met de bokkepoot of bespuiten om uitlopen te voorkomen.
Opmerking:
Bij het bespuiten van de stobben (werken met een dop) dient te worden voorkomen dat de omringende vegetatie wordt geraakt.
Stobben niet behandelen als ze voorkomen tussen niet afgezette bomen van dezelfde soort, omdat door systemische werking via met elkaar vergroeide wortels schade kan optreden.
o.) Tijdelijk onbeteeld land
Stoppel, braakliggend bloembollenland en terreinen die bestemd zijn voor beplantingen, alsmede op de ploegvoor.
Grondbewerking:
bij bestrijding van vnl. éénjarigen: 1 - 2 dagen na toepassing; bij vnl. overblijvende onkruiden: 1 week na toepassing.
Na grondbewerking kan onmiddellijk worden gezaaid of geplant.

B6. Hoe kan resistentie het best vermeden worden
Elke onkruidpopulatie kan planten bevatten die van nature uit meer tolerant of resistent zijn tegen bepaalde herbiciden. Dit kan leiden tot een onvoldoende controle wanneer die herbiciden gebruikt worden. Volgens de classificatie van het Herbicide Actie Comité (HRAC) is glyfosaat een Groep G herbicide.
Een strategie voor het vertragen van resistentieontwikkeling en het beheer van resistente onkruiden moet vastgesteld worden op basis van de lokale noden en geïntegreerd onkruidbeheer. Dit bevat het goed gebruik van herbiciden, het integreren van middelen met verschillende werkingsmechanismen en/of het gebruik van andere teelt of mechanische technieken:
- Volg de etiketvoorschriften, meer bepaald om te verzekeren dat de toepassing gebeurt in een correct onkruidstadium, onder geschikte klimaat omstandigheden en met de juiste dosis
- Optimaliseer het gebruik van verschillende technieken in uw onkruidbeheer die deel zijn van een normale teelt of landschapsbeheerprogramma
- Minimaliseer het risico op onkruidverspreiding. Zorg ervoor dat het landbouwmateriaal proper is wanneer van veld wordt gewisseld
- Volg de goede spuitpraktijken voor een effectieve onkruidcontrole
* laat het spuittoestel periodisch nakijken (vb. door bepaalde instanties hiervoor verantwoordelijk)
* doseer en spuit accuraat, calibreer het spuittoestel en stem uw hoeveelheid spuitvloeistof af op de te behandelen oppervlakte
* gebruik de juiste spuitdoppen voor een maximale dekking van de onkruiden en minimale drift
* pas enkel toe onder geschikte weersomstandigheden
* monitor de onkruidcontrole na behandeling en kijk uit naar potentiële onkruidcontroleproblemen
Verdere informatie is terug te vinden op HRAC (http://www.hracglobal.com/), uw distributeur of uw lokale Monsanto verantwoordelijke.

117.0 mm

Roundup® Ultimate
Toelatingsnummer: 13865 N
Met water mengbaar concentraat (vloeistof).
Werkzame stof: 480 g/l glyfosaat / 35,7 % (w/w)
Verdeeld door:
Monsanto Europe N.V.
Haven 627, Scheldelaan 460
B-2040 Antwerpen, België
Tel.: +32 3 568 54 92 - Fax: +32 3 568 54 94
In geval van nood:
Bij vergiftigen uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30 274 88 88
In overige gevallen: (24 u / 24 u) 00 32 3 568 51 23

119.0 mm

121.0 mm

Roundup® Ultimate
Een herbicide van Monsanto
Veiligheidsaanbevelingen:
P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongemaakt zoals wettelijk voorgeschreven.
Onbeperkt houdbaar in gesloten verpakking. Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden.
In geval van nood:
Bij vergiftigen uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30 274 88 88
In overige gevallen: (24 u / 24 u) 00 32 3 568 51 23
NL, 1803, B - 1288 6920

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL
HDPE

Monsanto

- 8 -

- 9 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 1 -

A. Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het *professionele* gebruik als

- onkruidbestrijdingsmiddel
- doodspuitmiddel

- middel voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken in de volgende

toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de

vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Akkerbouwgewassen	doodspuiten	Dekvruchten	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-
Pootaardappel	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Zetmeel- en consumptieaardappel	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Bieten	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Granen	kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Droog te oogsten erwten	kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Droog te oogsten bonen	kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Groenbemesters-gewassen	doodspuiten	Groenbemestersgewassen	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per teeltcyclus	28	-
Witlof (pennenteelt)	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Voedergrasland	over het gewas	Onkruiden en gras	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1 x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	5 dagen tussen toepassing en beweiden en/of maaien
Groot fruit	strokenbehandeling	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha op zwartstrook ²	2,25 l/ha in boomgaard	2x per 12 maanden	2,25 l/ha per 12 maanden	28	-
Uien-achtigen	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Asperge	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per teeltcyclus	28	-
Bloembol- en bloemknolgewassen	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Bloembol- en bloemknolgewassen	doodspuiten	Dekvruchten	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-
Narcis (meerjarige teelt, onbedekt)	na afsterven loof, voordat nieuwe uitloop begint	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-
Kerstbomen	over het gewas	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1 x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-
Bosbouw	pleksgewijs	Prunus serotina	0,75% (75 ml in 10 liter water)	0,3 l/ha ³	2x per 12 maanden	0,3 l/ha per 12 maanden	28	-

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² met behulp van "onkruidbestrijders", mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel,

de apparatuur niet druipet en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt

³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² per toepassing toegepast mag worden

⁴ Zie DOB (Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen): <http://www.dob-verhardingen.nl>

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteel, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden, openbaar groen	pleksgewijs	Onkruiden	1,5% (200 ml in 10 liter water)	0,6 l/ha ³	2x per 12 maanden	0,6 l/ha ³ per 12 maanden	28	-
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteel, sierteeltgewassen; cultuurgraslanden openbaar groen	aanstrijken ⁴	Onkruiden	25% (0,5 liter in 2 liter water)	3 l/ha ³	1x per 12 maanden	3 l/ha ³ per 12 maanden	-	-
Akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen	doodspuiten	Gewassen uit fytosanitaire overweging	3-6 l/ha ¹	6 l/ha	2x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	28	-
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, sierteeltgewassen; openbaar groen	pleksgewijs		1,5% (150 ml in 10 liter water)	0,6 l/ha ³	2x per 12 maanden		28	-
Fruitgewassen, sierteeltgewassen, openbaar groen, onbeteeld terrein	behandeling van stobben	(Nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken	3,75% (375 ml in 10 liter water)	0,15 ml/m ² (*)	1x per 12 maanden	0,15 ml/m ² per 12 maanden	-	-
Tijdelijk onbeteeld terrein (m.u.v akkerranden)	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	28	-
Akkerranden	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	0,45 l/ha ³	3x per 12 maanden	0,45 l/ha per 12 maanden	28	-
Gesloten verhardingen	pleksgewijs en volgens DOB ⁴	Onkruiden	1,5% (200 ml in 10 liter water)	0,45 l/ha ³	2x per 12 maanden	4,5 l/ha	28	-
Half-open verhardingen	pleksgewijs en volgens DOB ⁴	Onkruiden	1,5% (200 ml in 10 liter water)	0,45 l/ha ³	2x per 12 maanden			
Open verhardingen	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden			
Onverhard	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden			

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² met behulp van "onkruidbestrijders", mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel,

de apparatuur niet druipet en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt

³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² per toepassing toegepast mag worden

⁴ Zie DOB (Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen): <http://www.dob-verhardingen.nl>

Het gebruik in de teelt van boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt), vezelgewassen,

blauwmaanzaad, vlas, mosterd, koolzaad (oliehoudende zaden), raapzaad, boekweit, sorghum,

quinoa, lupine, prei en tegen holle stengel onkruiden is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009.

Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er

wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik

van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Boomkwekerij-gewassen (onbedekte teelt)	voor opkomst tussen de rijen	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	28	-
			1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha				
Vezelgewassen	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Blauwmaanzaad	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
Vlas (oliehoudende zaden)	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
Mosterd	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
Koolzaad (oliehoudende zaden)	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
Raapzaad	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
Lupine (voedergewassen)	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
Boekweit	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Quinoa	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Sorghum	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Prei	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Openbaar groen en particuliere tuinen tegen holle stengel onkruiden	Pleksgewijze injectie in de stengel	Holle stengel onkruiden zoals Japanse duizend-knoop	20ml middel in 100 ml water (injectie van 5-10 ml oplossing)	20ml middel in 100 ml water (injectie van 5-10 ml oplossing)	1 per 12 maanden			

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² met behulp van "onkruidbestrijders", mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel,

de apparatuur niet druipet en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt

³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² per toepassing toegepast mag worden

⁴ Zie DOB (Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen): <http://www.dob-verhardingen.nl>

Toepassingsvoorwaarden

Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen slootaluds niet gespoten worden.

In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.

In kerstbomen geldt dat het gewas tenminste 2 jaar oud moet zijn.

Het doodspuiten van gewassen uit fytosanitaire overweging mag alleen plaatsvinden op aanwijzing van de hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Toepassingsvoorwaarden

Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen slootaluds niet gespoten worden.

In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.

In kerstbomen geldt dat het gewas tenminste 2 jaar oud moet zijn.

Het doodspuiten van gewassen uit fytosanitaire overweging mag alleen plaatsvinden op aanwijzing van de hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Het spreekt vanzelf dat door een nauwkeurige naleving van bovenstaande voorschriften de risico's tot een minimum kunnen worden beperkt.

Noch voor herformulering, noch voor herverpakking.

Geen vergunning, expliciet of impliciet, toegekend onder enig Amerikaans patent.

Eerste hulp maatregelen

Inademen: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inslikken: Spoel de mond. Bel het antigifcentrum en vraag of het drinken van en oplossing actieve houtskool in water aangewezen is. Indien er zich symptomen voordoen raadpleeg een arts.

Huid : Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten.

Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Als symptomen aanhouden arts raadplegen

Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten.

Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.

Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.

Als er symptomen optreden, arts raadplegen.



Roundup[®] Ultimate

Een herbicide
van Monsanto

Veiligheidsaanbevelingen:

P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Informatie over het gebruik en dosering zie binnenin wettelijk gebruiksvorschrift en aanbevelingen.

Gebruiksaanwijzing hier openen.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongemaakt zoals wettelijk voorgeschreven.



Onbeperkt houdbaar in gesloten verpakking. Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden.

In geval van nood:

Bij vergiftingen uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30 274 88 88
In overige gevallen: (24 u / 24 u) 00 32 3 568 51 23

NL, 1803, B - 1288 6920

MONSANTO



165,0 mm

15,0

121,0

10,0



Een herbicide
van Monsanto

www.roundup.nl



Hoge concentratie

480 g/l glyfosaat werkzame stof



Regenvastheid

Regenvast na 1 uur



Zeer goede werking

Ook in hard water



Weersonafhankelijk

Beste werking onder moeilijke omstandigheden

Niet selectief systemisch onkruidbestrijdingsmiddel. Voor gebruik in: Tuinbouw, Landbouw, Grasland, Bosbouw, Algemeen onderhoud.

Bestemd voor professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 13865 N



Werkzame stof:

480 g/l glyfosaat / 35,7 % (w/w)

Met water mengbaar concentraat (vloeistof)

Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Monsanto Europe S.A./N.V.
Scheldelaan 460, Haven 627
B-2040 Antwerpen, België
Tel.: 0032 3 568 54 92
Fax: 0032 3 568 54 94

® Roundup, MONSANTO en het wijnrank symbool zijn gedeponeerde merken van Monsanto Technology LLC.

© Monsanto Europe N.V., 2018

NL, 1803, D - 1288 6627

In geval van nood:

Bij vergiftigen uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)30 274 88 88

In overige gevallen: (24 u / 24 u) 00 32 3 568 51 23


MONSANTO



Roundup[®] Ultimate



*Hoge concentratie
480 g/l werkzame
stof*



*Zeer goede werking
ook in hard water*



Regenvast na 1 uur



*Beste werking
onder moeilijke
omstandigheden*

NL - 1803, R - 1288 6926

Inhoud: **15 L**

MONSANTO

