




Een herbicide
van Monsanto

00 00 00 00 00 000

www.roundup.nl



Hoge concentratie

480 g/l glyfosaat werkzame stof



Regenvastheid

Regenvast na 1 uur



Zeer goede werking

Ook in hard water



Weersonafhankelijk

Beste werking onder moeilijke omstandigheden

Niet selectief systemisch onkruidbestrijdingsmiddel. Voor gebruik in: Tuinbouw, Landbouw, Grasland, Bosbouw, Algemeen onderhoud.

Bestemd voor professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 13865 N



Werkzame stof:

480 g/l glyfosaat / 35,7 % (w/w)

Met water mengbaar concentraat (vloeistof)

Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Monsanto Europe N.V.
Scheldelaan 460, Haven 627
B-2040 Antwerpen, België
Tel.: 0032 3 568 54 92
Fax: 0032 3 568 54 94

® Roundup, MONSANTO en het wijnrank symbool zijn gedeponeerde merken van Monsanto Technology LLC.

© Monsanto Europe N.V., 2016 (T.R.)

NL, 1607, D - 1259 5034

MONSANTO



B. AANBEVELING
B1. Algemeen

Roundup® Ultimate is een niet-selectief bladherbicide met systemische werking.

Het werkt tegen éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleeftkruis, muur, varkensgras, e.a. Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver, wikkesoorten en moerasandoom.

Mossen worden niet bestreden.

De onkruiden worden zowel in een jong als in een ouder stadium bestreden.

Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd.

De werking is derhalve het beste als de onkruiden voldoende blad hebben ontwikkeld en niet beschadigd zijn door ziekten en plagen.

De toepassing heeft het beste resultaat tijdens niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid.

Het middel dient niet te worden toegepast als er kans is op aanhoudende vorst of als er binnen een uur na de toepassing kans op regen bestaat.

Tijdens de toepassing van het middel dienen gewassen onkruid bij voorkeur droog te zijn.

Voor elke toepassing van **Roundup Ultimate** dient men er op bedacht te zijn dat het middel niet selectief is en dus in zeer geringe hoeveelheden al schade kan veroorzaken aan te sparen gewassen; de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te gebeuren.

Gebruik ter voorkoming van overwaaien een middelmat-ige tot grove druppelgrootte.

Belangrijk:

- Vorstrij opslaan.
- De spuit voor en na gebruik onmiddellijk grondig schoon maken.
- Voorkom drift, spuit met lage druk, houd rekening met de windrichting.

B2. Lege verpakkingen en spuitoverschotten

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie maal met schudden), ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproei-toestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. De spuitoverschotten verspreiden op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

B3. Grondbewerking na toepassing van Roundup Ultimate:

Let op dat de gedode massa onder niet te droge en niet te natte omstandigheden door de bouwvoor wordt verdeeld (liefst fijn gehakseld), of dat deze massa middels een goed kerende grondbewerking volledig wordt ondergebracht. Vervolgens is het noodzakelijk dat deze massa de kans krijgt volledig te verteren voor het volgende gewas wordt gezaaid, gepoot of geplant.

B4. Watervolume

200 - 400 l/ha is aan te bevelen. Lagere watervolumes kunnen worden gebruikt als de spuitapparatuur hiervoor geschikt is. De tank half vullen met water, de roerinrichting starten, de juiste hoeveelheid middel toevoegen, en al roerend de tank verder vullen.

B5. Teeltspecifieke details

a.) Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Rogge, gerst of gras in het najaar gezaaid op stuif-gevoelige grond in de bloembollenteelt of akkerbouw sterft na behandeling langzaam af, waardoor de bodem-beschermer functie lang behouden blijft.

Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden. In de bloembollenteelt dient het dekgras te worden doodgespoten ruim voor de opkomst van de bloembolgewassen.

In de akkerbouw kan vanaf een week na de bespuiting in de onbewerkte grond worden gezaaid.

b.) Doodspuiten van dekvruchten op erosiegevoelige grond

Dekvruchten gezaaid op erosiegevoelige grond sterven na behandeling langzaam af, waardoor enerzijds de bodembeschermer functie langer behouden blijft en anderzijds inzaai van een nieuw gewas mogelijk wordt. Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden. Vanaf een week na de bespuiting kan in de onbewerkte grond worden gezaaid.

c.) Voor opkomst van uien, bieten, aardappelen, witlof, asperges en bloembollen

Tegen reeds bovenstaande onkruiden.

Opmerking:

Niet later toepassen dan enkele dagen voor de opkomst van genoemde gewassen. De grond mag nog niet breken.

d.) In zetmeel- en consumptieaardappelen, na volledig afsterven van het loof

Als het loof van de aardappelen is doodgespoten of van nature volledig afgestorven is.

Opmerking:

Om het middel voldoende gelegenheid te geven in te werken op de onkruiden, dient niet later dan 1 week voor de oogst te worden gespoten.

e.) Kort voor de oogst in alle afgerijpte graangewassen en droog te oogsten erwten en bonen

Toepassing:

Granen:

De behandeling uitvoeren wanneer het graangewas geheel is afgerijpt:

- vlagblad geheel om de stengel geplooid;
- graankorrel deegrijp en minder dan 30 % vocht bevat;
- het stro geheel geel is doch de knopen nog groen-geel zijn.

Erwten en bonen (veldbonen en stambonen):

De behandeling uitvoeren op een afgerijpt gewas wanneer de zaden minder dan 30 % vocht bevatten.

Opmerkingen:

- Veiligheidstermijn tussen bespuiting en oogst tenminste 7 dagen aanhouden.
- Het behandelde erwten- en bonenstro kan vervoerd worden.
- Grondbewerking, na verwijderen/hakselen van stro, kan onmiddellijk uitgevoerd worden.
- Alle gewassen kunnen direct ingezaaid worden.

f.) Als groenbemester geteelde gewassen

Deze toepassing wordt uitgevoerd om bij ondiep onderwerken hergroei in het voorjaar te voorkomen.

Toepassing:

circa 1 week voor de grondbewerking.

g.) Grasland

Ter bestrijding van kweekgras en andere ongewenste vegetaties bij graslandvernieuwing. Na maaien of beweiden, wachten met spuiten tot het kweekgras weer 10 - 15 cm lang is, of 4 - 6 bladeren heeft.

Doorzaaien (zonder grondbewerking)

Bij voorkeur half juli - half september.

1 week na de bespuiting kan zonder grondbewerking met een speciale doorzaaimachine worden gezaaid. Om een goede aanslag van het jonge gras te verkrijgen is het nodig om het bestreden gras af te maaien en te verwijderen. Dit gras mag na 5 dagen afgegrast of afgemaaid en als kuilvoer, of als hooi vervoerd worden. Het uitrijden van runderdrijfmest kort voor het doorzaaien verbetert de opkomst van het nieuw ingezaaide gras: opletten voor de wetgeving dienaangaande.

Herinzaaien, inzaaien of planten van een ander gewas Herinzaai van grasland bij voorkeur uitvoeren half juli/september. Na de toepassing 1 week wachten voor een grondbewerking wordt uitgevoerd.

h.) In de fruitteelt onder groot fruit bomen

Toepassen op de zwartstrook vanaf 1 februari tot uiterlijk 1 juli onder bomen welke minimaal drie jaar vaststaan. Afwisseling met een bodemherbicide verdient bij de eerste toepassing in het voorjaar aanbeveling.

Opmerkingen:

- Bladeren, takken, onverhoude bast, alsook stoot- en snoeiwonden van de bomen niet met de spuitvloeistof raken. Na het snoeien acht dagen wachten met de toepassing om eerst de snoeiwonden te laten verdrogen. Wortelopslag mag worden geraakt.

i.) 2-jarige teelt van narcissen

Alleen toepassen als het loof volledig is afgestorven en voordat nieuwe uitloop begint. Het beste tijdstip ligt tussen half augustus en half september.

j.) In kerstbomen

Op tenminste 2 jaar oude aanplantingen van Picea abies (*P. excelsa*) en Abies Nordmanniana.

Toepassing:

In het najaar vanaf het moment dat het jonge schot van de kerstsparen geheel is verhout (na 1 november).

k.) In de bosbouw ter bestrijding van Amerikaanse Vogelkers

Toepassing:

uitsluitend op één- à tweejarige loten die geen bessen dragen en niet hoger zijn dan 1,50 m; goede bevochtiging van de bladeren is nodig, zonder afdruppen; spuiten vanaf half augustus tot eind september.

Opmerking:

Bramen, bosbessen en houtopstand mogen niet worden geraakt, ook moet bevochtiging van de niet verhoude delen van andere gewenste soorten worden voorkomen.

l.) Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in land- en tuinbouwgewassen, grasland alsmede in openbaar groen met behulp van handspruitapparatuur

Ter bestrijding van wortelonkruiden zoals aardappelopslag, distels, klein hoefblad, bentpollen, knolcyperus, kweekgras e.d. door middel van een pleksgewijze bespuiting van de onkruiden.

Om beschadiging van het gewas te voorkomen is het aanbevelen een afschermkap of andere nauwkeurige doseringsapparatuur te gebruiken.

Gewasplanten en/of plantsoenbeplantingen die geraakt worden, sterven af.

Ter markering kan een kleurstof aan de spuitoplossing toegevoegd worden.

m.) In land- en tuinbouwgewassen, grasland alsmede in weg- en plantsoenbeplanting met behulp van onkruidbestrijkers

Pleksgewijze en/of selectieve bestrijding van eenjarige en overblijvende onkruiden inclusief aardappelopslag met behulp van speciaal voor dit doel ontwikkelde onkruidbestrijkers.

Ter bestrijding van boven het gewas uitstekend onkruid dient er minimaal een hoogteverschil van 10 cm tussen onkruid en gewas te zijn. Ter bestrijding van individuele onkruidplanten en onkruidhaarden tussen het gewas of beplanting kan handapparatuur worden gebruikt.

Ter voorkoming van schade mag het cultuurgewas of de gewenste vegetatie beslist niet in aanraking komen met de **Roundup Ultimate** -oplossing.

Bestrijding van riet in cultuurgewassen wordt afgeraden in verband met kans op schade door guttatievocht.

Met bepaalde apparatuur (b.v. strokenstrijkers tussen gewasrijen) worden lagere concentraties dan 25 % oplossingen van **Roundup Ultimate** toegepast.

Opmerking:

Alleen toepassen als het gewas en de onkruiden droog zijn.

Resterende oplossing van **Roundup Ultimate** dient men in apparatuur te laten zitten of na verdere verdunning te gebruiken voor toegelaten bespuitingsdoeleinden.

Tijdens opslag en transport moet om de afgeveerde delen (touw, doek, borstel, spons) van de apparatuur een beschermkap of plastic kap zijn aangebracht zodat contact met de huid uitgesloten is.

n.) Stobbenbehandeling

Verse zaagvlakken van afgezette bomen insmeren met de bokkepoot of bespuiten om uitlopen te voorkomen.

Opmerking:

Bij het bespuiten van de stobben (werken met een dop) dient te worden voorkomen dat de omringende vegetatie wordt geraakt.

Stobben niet behandelen als ze voorkomen tussen niet afgezette bomen van dezelfde soort, omdat door systemische werking via met elkaar vergroeide wortels schade kan optreden.

o.) Tijdelijk onbeteeld land

Stoppel, braakliggend bloembollenland en terreinen die bestemd zijn voor beplantingen, alsmede op de ploegvoor.

Grondbewerking:

bij bestrijding van vnl. éénjarigen: 1 - 2 dagen na toepassing; bij vnl. overblijvende onkruiden: 1 week na toepassing.

Na grondbewerking kan onmiddellijk worden gezaaid of geplant.

B6. Hoe kan resistentie het best vermeden worden

Elke onkruidpopulatie kan planten bevatten die van nature uit meer tolerant of resistent zijn tegen bepaalde herbiciden. Dit kan leiden tot een onvoldoende controle wanneer die herbiciden gebruikt worden. Volgens de classificatie van het Herbicide Actie Comité (HRAC) is glyfosaat een Groep G herbicide.

Een strategie voor het vertragen van resistentieontwikkeling en het beheer van resistente onkruiden moet vastgesteld worden op basis van de lokale noden en geïntegreerd onkruidbeheer. Dit bevat het goed gebruik van herbiciden, het integreren van middelen met verschillende werkingsmechanismen en/of het gebruik van andere teelt of mechanische technieken:

- Volg de etiketvoorschriften, meer bepaald om te verzekeren dat de toepassing gebeurt in een correct onkruidstadium, onder geschikte klimaat omstandigheden en met de juiste dosis
- Optimaliseer het gebruik van verschillende technieken in uw onkruidbeheer die deel zijn van een normale teelt of landschapsbeheerprogramma
- Minimaliseer het risico op onkruidverspreiding. Zorg ervoor dat het landbouwmateriaal proper is wanneer van veld wordt gewisseld
- Volg de goede spuitpraktijken voor een effectieve onkruidcontrole

* laat het spuittoestel periodisch nakijken (vb. door bepaalde instanties hiervoor verantwoordelijk)

* doseer en spuit accuraat, calibreer het spuittoestel en stem uw hoeveelheid spuitvloeistof af op de te behandelen oppervlakte

* gebruik de juiste spuitdoppen voor een maximale dekking van de onkruiden en minimale drift

* pas enkel toe onder geschikte weersomstandigheden

* monitor de onkruidcontrole na behandeling en kijk uit naar potentiële onkruidcontroleproblemen

Verdere informatie is terug te vinden op HRAC (<http://www.hracglobal.com/>), uw distributeur of uw lokale Monsanto verantwoordelijke.

Roundup® Ultimate

Toelatingsnummer: 13865 N

Met water mengbaar concentraat (vloeistof).

Werkzame stof: 480 g/l glyfosaat / 35,7 % (w/w)



MONSANTO



Verdeeld door:

Monsanto Europe N.V.

Haven 627, Scheldelaan 460

B-2040 Antwerpen, België

Tel.: +32 3 568 54 92 - Fax: +32 3 568 54 94

Noodtelefoonnummer: (24 u. / 24 u.): 0032 3 568 51 23

Roundup® Ultimate

Een herbicide van Monsanto

Veiligheidsaanbevelingen:

P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Informatie over het gebruik en dosering zie binnenin wettelijk gebruiksvorschrift en aanbevelingen.

SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongemaakt zoals wettelijk voorgeschreven.



Onbeperkt houdbaar in gesloten verpakking. Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden.

Noodtelefoonnummer:
(24 u. / 24 u.) 0032 (0)3 568 51 23

NL, 1607, B - 1259 5031

MONSANTO



A. Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het *professionele* gebruik als

- onkruidbestrijdingsmiddel
- doodspuitmiddel
- middel voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Akkerbouwgewassen	doodspuiten	Dekvruchten	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-
Pootlaardappel	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Zetmeel- en consumptieaardappel	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
		Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha			-	-
Bieten	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Granen	kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Droog te oogsten erwten	kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Droog te oogsten bonen	kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Groenbemesters-gewassen	doodspuiten	Groenbemes-tergewassen	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per teeltcyclus	28	
Witlof (pennenteelt)	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Voedergrasland	over het gewas	Onkruiden en gras	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1 x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	5 dagen tussen toepassing en beweiden en/of maaien
Groot fruit	strokenbe-handeling	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha op zwartstrook ¹	2,25 l/ha in boomgaard	2x per 12 maanden	2,25 l/ha per 12 maanden	28	-
Uien-achtigen	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Asperge	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per teeltcyclus	28	-
Bloembol- en bloemknolgewassen	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Bloembol- en bloemknolgewassen	doodspuiten	Dekvruchten	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-
Narcis (meerjarige teelt, onbedekt)	na afsterven loof, voordat nieuwe uitloop begint	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-
Kerstbomen	over het gewas	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1 x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	-	-

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² met behulp van "onkruidbestrijkers", mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipt en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt

³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² per toepassing toegepast mag worden

Het gebruik in de teelt van boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt), vezelgewassen, blauwmaanzaad, vlas, mosterd, koolzaad (oliehoudende zaden), raapzaad, boekweit, sorghum, quinoa, lupine en prei is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Bosbouw	pleksgewijs	Prunus serotina	0,75% (75 ml in 10 liter water)	0,3 l/ha ³	2x per 12 maanden	0,3 l/ha per 12 maanden	28	-
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden, openbaar groen	pleksgewijs	Onkruiden	1,5% (200 ml in 10 liter water)	0,6 l/ha ³	2x per 12 maanden	0,6 l/ha ³ per 12 maanden	28	-
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen; cultuurgraslanden openbaar groen	aanstryken ²	Onkruiden	25% (0.5 liter in 2 liter water)	3 l/ha ³	1x per 12 maanden	3 l/ha ³ per 12 maanden	-	-
Akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen; openbaar groen	doodspuiten	Gewassen uit fytosanitaire overweging	3-6 l/ha ¹	6 l/ha	2x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	28	-
			1,5% (150 ml in 10 liter water)	0,6 l/ha ³	2x per 12 maanden		28	-
Fruitgewassen, sierteeltgewassen, openbaar groen, onbeteeld terrein	behandeling van stobben	(Nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken	3,75% (375 ml in 10 liter water)	0,15 ml/m ² (*)	1x per 12 maanden	0,15 ml/m ² per 12 maanden	-	-
Tijdelijk onbeteeld terrein (m.u.v akkerranden)	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	28	-
Akkerranden	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	0,45 l/ha ³	3x per 12 maanden	0,45 l/ha per 12 maanden	28	-
Open verhardingen	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha	28	-
Onverhard	-	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha	28	-

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² met behulp van "onkruidbestrijkers", mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipt en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt

³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² per toepassing toegepast mag worden

Toepassingsvoorwaarden

Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen slootaluds niet gespoten worden.

In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.

In kerstbomen geldt dat het gewas tenminste 2 jaar oud moet zijn.

Het doodspuiten van gewassen uit fytosanitaire overweging mag alleen plaatsvinden op aanwijzing van de hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal interval aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Boomkwekerij-gewassen (onbedekte teelt)	voor opkomst tussen de rijen	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	2x per 12 maanden	4,5 l/ha per 12 maanden	28	-
			1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha				
Vezelgewassen	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
			1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha				
Blauwmaanzaad	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
			1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha				
Vlas (oliehoudende zaden)	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
			1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha				
Mosterd	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
			1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha				
Koolzaad (oliehoudende zaden)	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
			1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha				
Raapzaad	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
			1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha				
Lupine (voedergewassen)	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
			1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha				
Boekweit	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Quinoa	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-
Sorghum	voor opkomst kort voor oogst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus		-
			1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha				
Prei	voor opkomst	Onkruiden	1,5-4,5 l/ha ¹	4,5 l/ha	1x per teeltcyclus	4,5 l/ha per teeltcyclus	-	-

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² met behulp van "onkruidbestrijkers", mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipt en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt

³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² per toepassing toegepast mag worden

Onze middelen worden eerst na langdurig onderzoek en/of op grond van verworven ervaring in de handel gebracht. Zij voldoen aan door de overheid gestelde eisen. Toch blijven aan de toepassing van chemische middelen risico's verbonden.

De volgende factoren kunnen daarbij een rol spelen: weersomstandigheden, tijdstip en wijze van toepassing, toestand en stadium van onkruiden e.d. Aangezien deze factoren niet door de verkoper kunnen worden beïnvloed, kunnen wij, ondanks de goede kwaliteit van onze middelen, geen goed resultaat garanderen; noch aansprakelijkheid op ons nemen voor schade, die direct of indirect, uit het gebruik of de toepassing van onze producten mocht voortvloeien.

Het spreekt vanzelf dat door een nauwkeurige naleving van bovenstaande voorschriften de risico's tot een minimum kunnen worden beperkt.

Noch voor herformulering, noch voor herverpakking.

Geen vergunning, expliciet of impliciet, toegekend onder enig Amerikaans patent.

Eerste hulp maatregelen

Inademen: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Inslikken: Spoel de mond. Bel het antigifcentrum en vraag of het drinken van en oplossing actieve houtskool in water aangewezen is. Indien er zich symptomen voordoen raadpleeg een arts.

Huid : Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten.

Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Als symptomen aanhouden arts raadplegen

Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten.

Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.

Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.

Als er symptomen optreden, arts raadplegen.