

Niet-selectief bladherbicide met systemische werking**ETNA**

W2

TOELATINGSNUMMER : 13424 N
AARD VAN HET PREPARAAT : MET WATER MENGBAAR CONCENTRAAT
WERKZAME STOF : GLYFOSAAT
GEHALTE : 360 G/L

VOORZORGSMaatregelen

- P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

Verdeeld door:
UPL Benelux BV
Postbus 295
4900 AG Oosterhout
0162 – 431 931

Erkenninghouder:
UPL Europe Ltd.
The Centre, Birchwood Park
Warrington, Cheshire,
WA3 6YN, United Kingdom



CHARGENUMMER:
Zie elders op de verpakking

111116

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als

- onkruidbestrijdingsmiddel
- doodspuitmiddel
- middel voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken

in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Akkerbouwgewas-sen	doodspuiten	Dekvruchten	2-4 l/ha ¹	4 l/ha	1x per 12 maanden	4 l/ha per 12 maanden	-	-
Poot aardappel	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	-
Zetmeel- en consumptieaardappel	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	-
	kort voor oogst		2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teeltcyclus		-	-
Bieten	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	-
Granen	kort voor oogst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Droog te oogsten erwten	kort voor oogst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Droog te oogsten bonen	kort voor oogst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	7 dagen
Groenbemesters-gewassen	doodspuiten	Groenbemes-tergewassen	2-4 l/ha ¹	4 l/ha	1x per 12 maanden	4 l/ha per 12 maanden	-	
Voedergrasland	over het gewas	Onkruiden en gras	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	5 dagen tussen toepassing en beweiden en/of maaien
Appel	strokenbehandeling	Onkruiden	2-6 l/ha op zwartstrook ¹	3 l/ha in boomgaard	1x per 12 maanden	3 l/ha per 12 maanden	-	-
Peer	strokenbehandeling	Onkruiden	2-6 l/ha op zwartstrook ¹	3 l/ha in boomgaard	1x per 12 maanden	3 l/ha per 12 maanden	-	-
Uien	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	-
Asperge	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bloembol- en bloemknolgewassen	voor opkomst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	-	-
	doodspuiten	Dekvruchten	2-4 l/ha	4 l/ha	1x per 12 maanden	4 l/ha per 12 maanden	-	-
Narcis (meerjarige teelt, onbedekt)	na afsterven loof, voordat nieuwe uitloop begint	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-
Kerstbomen	over het gewas	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-
Bosbouw	pleksgewijs	Prunus serotina	1% (100 ml in 10 liter water)	0,4 l/ha ³	1x per 12 maanden	0,4 l/ha per 12 maanden	-	-
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden, openbaar groen	pleksgewijs	Onkruiden	2% (200 ml in 10 liter water)	1,3 l/ha ³	1x per 12 maanden	1,3 l/ha per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen; cultuurgrasland, openbaar groen	aanstrijken ²	Onkruiden	33% (1 liter in 2 liter water)	1,3 l/ha ³	1x per 12 maanden	1,3 l/ha per 12 maanden	-	-
Akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen; openbaar groen	Doodspuiten	Gewassen uit fytosanitaire overweging	6-8 l/ha ¹	8 l/ha	1x per 12 maanden	8 l/ha per 12 maanden	-	-
	pleksgewijs		2% (200 ml in 10 liter water)	0,8 l/ha ³	1x per 12 maanden		-	-
Fruitgewassen, sierteeltgewassen, openbaar groen, onbeteeld terrein	behandeling van stobben	(Nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	0,2 ml/m ² (³)	1x per 12 maanden	0,2 ml/m ² per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Tijdelijk onbeteeld terrein (m.u.v akkerranden)	-	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-
Akkerranden ⁴	-	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	2x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	10 dagen	-
Open verhardingen	-	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-
Onverhard	-	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1x per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	-	-

¹ Dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

² Met behulp van “onkruidbestrijkers”, mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipet en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt

³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² toegepast mag worden

⁴ De toepassing op akkerranden is slechts toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van methoden en toestellen die geen drift veroorzaken, zoals onkruidstrijkers en toestellen met een afgeschermd spuitdop.

Toepassingsvoorwaarden

Dit middel mag niet worden toegepast op halfopen en gesloten verhardingen.

Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen slootaluds niet gespoten worden.

In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.

In kerstbomen geldt dat het gewas tenminste 2 jaar oud moet zijn.

Het doodspuiten van gewassen uit fytosanitaire overweging mag alleen plaatsvinden op aanwijzing van de hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

AANBEVELINGEN

Het middel is een niet-selectief bladherbicide met systemische werking. Het middel heeft geen werking via de grond. Het werkt tegen eenjarige en overblijvende grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleeftkruid, muur, varkensgras e.a. Minder gevoelig zijn: paardeestaart, klaver en wikkesoorten en moerasandoorn.

Mossen worden niet bestreden.

De onkruiden worden zowel in een jong als in een ouder stadium bestreden.

De werking is het beste als de onkruiden voldoende blad hebben ontwikkeld en niet zijn beschadigd door ziekten en plagen. De toepassing heeft het beste resultaat tijdens niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid. Het middel dient niet te worden toegepast als er kans is op aanhoudende vorst of als er binnen 4 à 6 uur na de toepassing kans bestaat op regen.

Tijdens de toepassing van het middel dienen gewas en onkruid bij voorkeur droog te zijn.

Het middel kan in zeer geringe hoeveelheden al schade doen aan te sparen gewassen, de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te geschieden. Gebruik in dit verband een middelmatige of grove druppelgrootte.

WAARSCHUWING

Bij de toepassing van het middel op een vegetatie met een behoorlijke hoeveelheid massa (organisch materiaal: blad en wortel) is het van belang dat het volggewas niet in aanraking komt met de afstervende massa. Door een goed kerende grondbewerking moet de massa worden ondergebracht. Daarna is het noodzakelijk dat deze massa de kans krijgt volledig te verteren voor het volgende gewas wordt gezaaid, geplant of gepoot.

Dosering

Tegen eenjarige onkruiden: 2-4 L/ha

Tegen overblijvende grassen: 3-4 L/ha

Tegen overblijvende tweezaadlobbige onkruiden: 4-6 L/ha

Bij pleksgewijze toepassing: 2% spuitconcentratie (20 ml in 1 liter water)

Overige selectieve toepassingen: zie het betreffende toepassingsgebied.

Watervolume

200-400 liter per ha is aan te bevelen (code 2M-4G). Lagere watervolumes kunnen worden gebruikt, als de spuitapparatuur hiervoor geschikt is.

Bereiding spuitvloeistof

- De tank half vullen met water, de roerinrichting starten, de juiste hoeveelheid middel toevoegen, en al roerend de tank verder vullen.
- Om schuimvorming te voorkomen de vulslang beneden het vloeistofniveau houden.

Belangrijk

- Vorstvrij opslaan.
- De spuitvloeistof niet opslaan of laten overstaan in gegalvaniseerde of metalen tanks, omdat daardoor een zeer brandbaar gas kan ontstaan (niet roken!).

- Alleen mengen met middelen vermeld in de gebruiksaanwijzing.
- De spuit voor en na gebruik onmiddellijk grondig schoonmaken.
- Voorkom drift, spuit met lage druk, houd rekening met de windrichting.

Toepassingen

Tijdelijk onbeteeld terrein

Stoppel, braakliggend bloembollenland en terreinen die bestemd zijn voor beplantingen, alsmede op de ploegvoor.

Grondbewerking:

- bij bestrijding van vnl. éénjarigen 1-2 dagen na toepassing;
- bij vnl. overblijvende onkruiden 1 week na toepassing.

Zaaien en planten:

- Na grondbewerking kan onmiddellijk worden gezaaid of geplant.

Opmerking:

Bij toevoeging van voor dit doel toegelaten additieven kan de dosering verlaagd worden, doch een minimum is vereist;

tegen kweek: 3 L/ha

tegen overblijvende tweezaadlobbigen: 4 L/ha.

Akkerranden

De toepassing op akkerranden is slechts toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van methoden en toestellen die geen drift veroorzaken, zoals onkruidbestrijkers en toestellen met een afgeschermd spuitdop.

Toepassing: gedurende het gehele groeiseizoen. Niet spuiten op sloottaluds en het gewas niet raken.

Voor opkomst van uien, bieten, aardappelen en bloembol- en bloemknolgewassen

Tegen reeds bovenstaande onkruiden.

Opmerking: Niet later toepassen dan enkele dagen voor de opkomst van genoemde gewassen. De grond mag nog niet breken.

Kort voor de oogst in afgerijpte graangewassen en droog te oogsten erwten en bonen

Granen:

de behandeling uitvoeren wanneer het graangewas geheel is afgerijpt:

- vlagblad geheel om de stengel geplooid;
- graankorrel deegrijp en minder dan 30% vocht bevat;
- het stro geheel geel is doch de knopen nog groen-geel zijn.
- Niet voor oogst gebruiken in brouwergerst en granen bestemd voor zaaizaadvermeerdering.

Droog te oogsten erwten en bonen (veldbonen en stambonen):

De behandeling uitvoeren op een afgerijpt gewas wanneer de zaden minder dan 30% vocht bevatten.

Veiligheidstermijn: tussen bespuiting en oogst tenminste 7 dagen aanhouden.

Opmerkingen:

- Veiligheidstermijn: tussen bespuiting en oogst tenminste 7 dagen aanhouden.
- Het behandelde graanstro kan na spoelen (bijv. een week in de regen) gebruikt worden voor alle doeleinden.
- Grondbewerking, na verwijderen/hakselen van stro, kan onmiddellijk uitgevoerd worden.
- Alle gewassen kunnen direct ingezaaid worden.

In zetmeel- en consumptie-aardappelen na volledig afsterven van het loof

Toepassing: als het loof van de aardappelen is doodgespoten of van nature volledig afgestorven is.

Opmerking:

Om het middel voldoende gelegenheid te geven in te werken op de onkruiden, dient niet later dan 1 week voor de oogst te worden gespoten.

Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Rogge, gerst of gras in het najaar gezaaid op stuifgevoelige grond in de bloembollenteelt of akkerbouw sterft na behandeling langzaam af, waardoor de bodembeschermende functie lang behouden blijft. Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden.

In de bloembollenteelt dient het dekgras te worden doodgespoten ruim voor de opkomst van de bloembolgewassen.

In de akkerbouw kan vanaf één week na de bespuiting in de onbewerkte grond worden gezaaid.

Groenbemestergewassen

Deze toepassing wordt uitgevoerd om bij ondiep onderwerken hergroei in het voorjaar te voorkomen.

Toepassing: circa 1 week voor de grondbewerking.

Diverse gewassen, indien dit uit fytosanitaire overwegingen noodzakelijk wordt geacht.

Dosering:

- indien volvelds moet worden gespoten: 6-8 L/ha;
- bij pleksgewijze toepassing: 2% spuitconcentratie

Voedergrasland

Ter bestrijding van kweekgras en andere ongewenste vegetaties bij graslandvernieuwing. Na maaien of beweiden wachten met spuiten tot het kweekgras weer 10-15 cm lang is, of 4-6 bladeren heeft.

a. Doorzaaien (zonder grondbewerking)

Bij voorkeur half juli-half september.

1 week na de bespuiting kan zonder grondbewerking met een speciale doorzaaimachine worden gezaaid. Om een goede aanslag van het jonge gras te verkrijgen is het nodig om het bespoten gras af te maaien en te verwijderen. Dit gras mag na 5 dagen afgegraasd of afgemaaid en als kuilvoeder, of als hooi vervoerd worden. Het uitrijden van runderdrijfmest kort voor het doorzaaien verbetert de opkomst van het nieuw ingezaaide gras: opletten voor de wetgeving dienaangaande.

b. Herinzaaien, inzaaien of planten van een ander gewas

Herinzaai van grasland bij voorkeur uitvoeren half juli/september.

Na de toepassing 1 week wachten voor een grondbewerking wordt uitgevoerd.

Het afstervende plantenmateriaal moet goed door de grond worden gewerkt alvorens wordt gezaaid of geplant.

In de fruitteelt onder appel- en perenbomenToepassingstijdstip:

Toepassen op de zwartstrook vanaf 1 februari tot uiterlijk 1 juli onder bomen welke minimaal drie jaar vaststaan. Menging met een bodemherbicide verdient bij de eerste toepassing in het voorjaar aanbeveling.

Opmerkingen:

- Bladeren, takken, onverhoude bast, alsook stoot- en snoeiwonden van de bomen niet met de spuitvloeistof raken, omdat anders ernstige schade kan optreden.
- Wortelopslag mag wel worden geraakt.

AspergesToepassingstijdstip:

Voor, tijdens en na de periode van steken, mits het gewas nog niet is opgekomen. De grond mag ook nog niet breken.

2-jarige teelt van narcissen

Alleen toepassen als het loof volledig is afgestorven en voordat nieuwe uitloop begint. Het beste tijdstip ligt tussen half augustus en half september.

Kerstbomen

Volvelds over het gewas toe te passen in tenminste 2 jaar oude aanplantingen van *Picea abies* (*P. excelsa*).

Toepassing:

In het najaar vanaf het moment dat het jonge schot van de kerstsparren geheel is verhout.

In de bosbouw ter bestrijding van Amerikaanse vogelkers

Toepassing:

- uitsluitend op één- à tweejarige loten die geen bessen dragen en niet hoger zijn dan 1,50 m;
- goede bevochtiging van de bladeren is nodig, zonder afdruipe;
- spuiten vanaf half augustus tot eind september.

Opmerking:

Bramen, bosbessen en houtopstand mogen niet worden geraakt, ook moet bevochtiging van de niet verhoude delen van andere gewenste soorten worden voorkomen.

Concentratie: 1% = 1 liter per 100 liter water.

Stobbenbehandeling

Verse zaagvlakken van afgezette bomen insmeren met de bokkepoot of bespuiten met een 5%-ige oplossing om uitlopen te voorkomen.

Ter markering kan een kleurstof toegevoegd worden.

Opmerking:

Bij het bespuiten van de stobben (werken met een dop) dient te worden voorkomen dat de omringende vegetatie wordt geraakt.

Stobben niet behandelen als ze voorkomen tussen niet afgezette bomen van dezelfde soort, omdat door systemische werking via met elkaar vergroeide wortels schade kan optreden.

In akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen en openbaar groen met behulp van onkruidbestrijders

Selectieve bestrijding van onkruiden met behulp van speciaal voor dit doel ontwikkelde onkruidbestrijders.

Ter bestrijding van boven het gewas uitstekend onkruid dient er minimaal een hoogteverschil van 10 cm tussen onkruid en gewas te zijn.

Ter bestrijding van individuele onkruidplanten en onkruidhaarden tussen het gewas of beplanting kan handapparatuur worden gebruikt.

Ter voorkoming van schade mag het cultuurgewas of de gewenste vegetatie beslist niet in aanraking komen met de oplossing.

Bestrijding van riet in cultuurgewassen wordt afgeraden in verband met kans op schade door gutatievocht.

Concentratie: 33% oplossing (1 liter op te lossen in 2 liter water)

Opmerkingen:

- Grotere verdunning kan aanleiding geven tot druipen en gewasschade.
- Alleen toepassen als het gewas en de onkruiden droog zijn.
- Resterende oplossing dient men in apparatuur te laten zitten of na verdere verdunning te gebruiken voor toegelaten bespuitingsdoeleinden.
- Tijdens opslag en transport moet om de afgevende delen (touw, doek, borstel, spons) van de apparatuur een beschermkap of plastic kap zijn aangebracht zodat contact met de huid uitgesloten is.

Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in land- en tuinbouwgewassen, cultuurgrasland alsmede in openbaar groen

Ter bestrijding van wortelonkruiden zoals distels, klein hoefblad, bentpollen, knolcyperus, kweekgras e.d. door middel van een pleksgewijze bespuiting van de onkruiden. Om beschadiging van het gewas te voorkomen is het aanbevolen een afschermkap te gebruiken.

Gewasplanten en/of plantsoenbeplantingen die geraakt worden, sterven af. Ter markering kan een kleurstof aan de spuitoplossing toegevoegd worden.

Open verharding

Hieronder wordt verstaan gestort of waterdoorlatend materiaal, zoals grint, schelpen of grasbetontegels.

REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet onmiddellijk en grondig schoongemaakt worden na gebruik van ETNA FREE, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld. Gewassen die zéér gevoelig zijn: wortelen, cichorei, suikerbieten, koolgewassen en koolzaad. Deze lijst is niet volledig.

Ledig het spuittoestel volledig op het behandelde veld. Ledig zowel het spuitvat, de spuitarmen als de leidingen. Reinig onmiddellijk de inwendige en de uitwendige wanden van het spuittoestel met een hogedrukspuit, in geval van polyethyleen of metaalachtige tank, of met een tuinslang. Met de hoge druk is er minder water vereist dan met de klassieke methode zonder druk. Vul daarna het spuitvat met een oplossing die 0,3 l ammoniak 20% bevat per 100 l water. Indien het toestel met hoge druk werd gereinigd, vul het vat voor 1/4; indien het met de tuinslang werd gereinigd, vul het vat dan volledig. Zet het roersysteem aan en laat het product inwerken gedurende 15 minuten. Ledig daarna het spuitvat en de spuitarmen en reinig met proper water. In alle gevallen, steeds de spuitdoppen en de filters demonteren en grondig reinigen in een emmer met goede afwaszeep.

Het spoelwater verspreiden over de grasachtige teelt.

EERSTE HULP

Algemeen advies: Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

Contact met de huid: Onmiddellijk afspoelen met veel water. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

Inslikken: Mond spoelen met water. Waarschuw een arts bij blootstelling of onwel worden.

Inademing: In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.