

Een onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van suiker- en voederbieten, graszaad, graszoden en cichorei.

OBLIX® 200 EC

TOELATINGSNUMMER

: 10568 N

W10

AARD VAN HET PREPARAAT

: EMULGEERBAAR CONCENTRAAT (EC)

WERKZAME STOF

: ETHOFUMESAAT

GEHALTE

: 200 G/L

BEVAT

: XYLEEN

GEVARENAANDUIDINGEN

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



VOORZORGSMAATREGELEN

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

WAARSCHUWING

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

Verdeeld door:

UPL Benelux BV
Postbus 295
4900 AG Oosterhout
0162 – 431 931

Erkenninghouder:

UPL Europe Ltd.
The Centre, Birchwood Park
Warrington, Cheshire,
WA3 6YN, United Kingdom



® gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd.

UN 1993

CHARGENUMMER:
Zie elders op de verpakking

010515

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	na opkomst	eenjarige onkruiden	1,5 l/ha ¹	2	4 l/ha per teeltcyclus	10
			2,5 l/ha ²	1		-
			0,5 - 1 l/ha ³	8		7
Graszaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras	over het gewas	eenjarige onkruiden	7,5 - 10 l/ha	1	10 l/ha per 12 maanden	-

¹ In combinatie met 3,5 l/ha fenmedifam (160 g/l).

² In combinatie met 5 l/ha fenmedifam (160 g/l).

³ In LDS-systeem met toegelaten middelen.

Het gebruik in de graszaadteelt (met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras) en de graszodenteelt is op basis van een “vereenvoudigde uitbreiding”. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van cichorei is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Graszaadteelt met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras	over het gewas	eenjarige onkruiden	10 l/ha	1 per teeltcyclus	10 l/ha per teeltcyclus	-
Graszodenteelt	over het gewas	eenjarige onkruiden	2,5 - 10 l/ha	1 per 12 maanden	10 l/ha per 12 maanden	-
Cichorei	na opkomst	eenjarige onkruiden	0,25-0,5 l/ha ¹	4 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	7

¹ In LDS-systeem met toegelaten middelen.

Dit middel dient te worden toegepast in 200-300 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden

Na gebruik in de graszaadteelt, het gras/hooi niet vervoederen.

De totale dosering in één seizoen mag niet hoger zijn dan 2 kg ethofumesaat (als werkzame stof) per hectare.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de graszaadteelt en graszodenteelt uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Voor bieten geldt dat tijdelijk enige gewasbeschadiging op kan treden, vooral bij kleine bietenplantjes.

Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin dit middel werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.

AANBEVELINGEN

Algemeen

Oblix 200 EC is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Vochtige grond op het moment van toepassen en enige neerslag nadien bevorderen de werking. De gewassen moeten echter bij behandeling droog zijn. Met uitzondering van kamille bestrijdt Oblix 200 EC een breed spectrum éénjarige onkruiden waaronder kleeftkruid.

Waterhoeveelheid: 200-300 liter per ha.

Suiker- en voederbieten

Oblix 200 EC is na opkomst alleen werkzaam in combinatie met middelen op basis van fenmedifam. Deze tankmenging geeft een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige zaadonkruiden.

Deze combinatie komt vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en specifiek voor de bestrijding van veelknopigen en kleeftkruid op alle grondsoorten.

Dosering:

Vanaf het 2 bladstadium (BBCH 12) van de biet:

1,5 liter Oblix 200 EC + 560 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 3,5 liter fenmedifam (157 of 160 g/l) per hectare).

Zonodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren met 1,5 liter Oblix 200 EC + 560 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 3,5 liter fenmedifam (157 of 160 g/l) per hectare). Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste 2 echte blaadjes moeten daarom bij alle bieten min. 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen opgevolgd te worden.

Dosering:

Vanaf het 4 bladstadium (BBCH 14) van de biet:

2,5 liter Oblix 200 EC + 800 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 5 liter fenmedifam (157 of 160 g/l) per hectare) als enkelvoudige behandeling.

Ook kan gekozen worden voor toepassing in een tankmix in een Lage-Dosering-Systeem, op onkruiden in het kiembladstadium.

Dosering:

0,5 liter Oblix 200 EC + 0,5 liter of 0,5 kg metamitron (700 g/l of 70%) + 80 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 0,5 liter fenmedifam (157 of 160 g/l) per hectare).

Indien gewenst kan 0,5 l/ha olie (voor deze toepassing geschikt) worden toegevoegd.

De toepassing herhalen als nieuwe onkruiden aanwezig zijn. Als de onkruiden 1-2 echte blaadjes hebben of als minder gevoelige onkruiden voorkomen kunnen de doseringen verhoogd worden tot 1 liter Oblix 200 EC + 1 liter of 1 kg metamitron (700 g/l of 70%) + 160 gram fenmedifam (actieve stof) per hectare (bijvoorbeeld 1 liter fenmedifam (157 of 160 g/l) per hectare).

Mengvoorschriften

Oblix 200 EC toegepast in combinatie met middelen op basis van fenmedifam en eventueel metamitron:

- Giet 20-50 liter water in de tank
- Voeg fenmedifam toe en zet het roersysteem in werking
- Voeg water toe tot de helft van de benodigde hoeveelheid
- Voeg Oblix200 EC en eventueel metamitron toe
- Vul verder aan met water

Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.

Restricties:

- Spuit op een afgehard en gezond bietengewas, dat niet verzwakt is door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.
- Spuit niet bij maximale dagtemperatuur boven 18°C en niet bij scherp zonnig weer. In deze gevallen bij voorkeur 's avonds spuiten.

Graszaadteelt en graszodenteelt

Oblix 200 EC bestrijdt duist, windhalm, straatgras, muur en herderstasje in de graszaad- en graszodenteelt. Het effect op graanopslag is wisselvallig. Toepassing vindt bij voorkeur in het najaar plaats, op kleine onkruiden.

Oblix 200 EC kan worden gespoten vanaf het moment dat het gras 2 spruiten heeft gevormd. Bij toepassing na de oogst van de dekvrucht dient het gras afgehard te zijn. Behandeling niet herhalen. Spuit op een gezond gewas.

Zaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras

Dosering:

- 7,5 l/ha, indien duist en windhalm kleiner zijn dan 3 spruiten
- 10,0 l/ha, indien reeds 3-5 spruiten zijn gevormd.

Grotere duist of windhalm wordt niet meer bestreden.

Zaadteelt van overige grassen

Dosering:

Maximaal 10,0 l/ha.

Het sortiment in graszaadteelt is groot en de gevoeligheid voor dit middel kan zelfs binnen een soort nog zeer variabel zijn. Indien nog geen ervaring met dit middel werd opgedaan, verdient het aanbeveling eerst het middel aan de omstandigheden op het bedrijf op kleine schaal te toetsen.

Graszodenteelt

Dosering:

2,5 - 10,0 l/ha.

Het sortiment in graszodenteelt is groot en de gevoeligheid voor dit middel kan zelfs binnen een soort nog zeer variabel zijn. Indien nog geen ervaring met dit middel werd opgedaan, verdient het aanbeveling eerst het middel aan de omstandigheden op het bedrijf op kleine schaal te toetsen.

Cichorei

In cichorei is Oblix 200 EC toegelaten in een LDS systeem na opkomst. Het advies is om Oblix 200 EC toe te voegen aan een LDS mengsel met toegelaten middelen vanaf eerste echte blad van de cichorei.

Dosering

0,25-0,375 l/ha Oblix 200 EC in LDS systeem met toegelaten middelen

Maximaal 4 toepassingen per teelt, totaal dosering maximaal 1,0 l/ha Oblix 200 EC per teelt.

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP

Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Contact met de ogen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen

Contact met de huid Onmiddellijk afspoelen met veel water. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden

INSLIKKEN Mond spoelen met water. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum

INADEMING In de frisse lucht brengen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

NOTA

Voor schade voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.