

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitief lijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011 onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing¹	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Spinazie (productieteelt) onbedekte teelt	voor opkomst	Breedbladige onkruiden en eenjarige grassachtige onkruiden	6 l/ha	1 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	nvt
Spinazie (zaadteelt)	voor opkomst	Breedbladige onkruiden en eenjarige grassachtige onkruiden	6 l/ha	1 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	nvt
Hyacint (onbedekte teelt)	na opkomst	Breedbladige onkruiden	2 l/ha	6 per teeltcyclus	12 l/ha per teeltcyclus	14
Tulp (onbedekte teelt)	na opkomst	Breedbladige onkruiden	2 l/ha	6 per teeltcyclus	12 l/ha per teeltcyclus	14
Lelie (onbedekte teelt)	na opkomst	Breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	12 per teeltcyclus	12 l/ha per teeltcyclus	14
Gezaaide zomerbloemen (onbedekte teelt)	na opkomst	Breedbladige onkruiden	2 l/ha	6 per 12 maanden	12 l/ha per 12 maanden	14
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	na opkomst	Breedbladige onkruiden	2 l/ha	6 per 12 maanden	12 l/ha per 12 maanden	14

De gevoeligheid van de onkruiden is afhankelijk van het toepassingstijdstip, de dosering is afhankelijk van de grondsoort.

Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

In lelie kan de toepassing van Agrichem Asulam 2 onder bepaalde omstandigheden (warm weer, veel instraling) en in sommige cultivars leiden tot enige gewasreactie in de vorm van lichtgroene bladplekjes.

Toepassingsvoorwaarden

Draag handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in de bollenteelt van hyacint, tulp en lelie uitsluitend toegestaan vóór BBCH 40 (vóór het bladerdek gesloten is, minder dan 90% van de planten raakt elkaar in de rij).

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt gemaakt van

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5, of
- een overdekte beddenspuit.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

AANBEVELINGEN

Algemeen

Agrichem Asulam 2 is een systemisch onkruidbestrijdingsmiddel dat zowel door het blad als door de wortels kan worden opgenomen. Het middel kan afhankelijk van het gewas vóór en na opkomst worden toegepast. Agrichem Asulam 2 toepassen op vochtige grond in minstens 600 ltr water per ha. Na opkomst is warm, zonnig weer bevorderlijk voor de werking. Bij veel regen kort na de toepassing kan er enige drukking of uitdunning van het gewas optreden, met name op humusarme grondsoorten.

Onkruidgevoeligheid

De gevoeligheid van de onkruiden is afhankelijk van het toepassingstijdstip. Gevoelig zijn bij behandeling

- voor opkomst:
- duist, straatgras en andere éénjarige grassen.
- voor of na opkomst:
- kamille, muur, ereprijssoorten, kleine brandnetel, steenraket en veelknipogen.
- na opkomst:

klein hofblad, melkdistel, akkerkrakers, akkerpaardenstaart en klein kruiskruid.

- dubbele bespuiting (voor en na opkomst): herderstasje, herik en witte krodde. Verder wordt een onderdrukkende werking verkregen op zwarte nachtschade en meldesoorten.

Weinig gevoelig zijn wolfsmelkachtigen, dovenetelsoorten en duivekervel.

TOEPASSINGEN

Spinazie productieteelt (onbedekt) en zaadteelt

Toepassen: tot uiterlijk 3 dagen na het zaaien. Het zaad mag niet zijn voorgekiemd.

Dosering: 6 l/ha, 1 toepassing

Tulp, Hyacint en Lelie

Toepassen: na opkomst van het gewas in LDS toepassing tegen onder anderen composiete onkruiden (kamille, klein kruiskruid) en wikkesoorten. Toepassen op jonge onkruiden in een afgehard en droog gewas. Tijdens toepassen tot enkele uren nadien moet het droog en groeizaam weer zijn. Bij hergroei en/of opkomst van nieuwe onkruiden de bespuiting herhalen.

Dosering: Hyacint en Tulp: 2 l/ha, 6 toepassingen met minimaal 14 dagen interval. Maximaal 12 l/ha

Lelie: 1-2 l/ha, 12 toepassingen met minimaal 14 dagen interval. Maximaal 12 l/ha.

Opmerking: In lelie kan de toepassing van Agrichem Asulam 2 onder bepaalde omstandigheden (warm weer, veel instraling) en in sommige cultivars leiden tot enige gewasreactie in de vorm van lichtgroene bladplekjes.

Bloemeteelt (gezaaide zomerbloemen- en bloemenzaadteelt) (onbedekte teelt)

Toepassen: na opkomst van het gewas in LDS toepassing tegen onder anderen composiete onkruiden (kamille, klein kruiskruid) en wikkesoorten. Toepassen op jonge onkruiden. Bij hergroei of opkomst nieuwe onkruiden de toepassing herhalen.

Gunstige ervaringen met Agrichem Asulam 2 zijn opgedaan in de soorten:

- Amaranthus: na opkomst, vanaf het 4-6 bladstadium van het gewas;
- Mesembryanthemum: na opkomst, vanaf het 4-6 bladstadium van het gewas;
- Nemesia: na opkomst, vanaf het 4-6 bladstadium van het gewas;
- Nigella: na opkomst, vanaf het 3-4 bladstadium van het gewas;
- Papaver: na opkomst, vanaf het 5-6 bladstadium van het gewas;
- Viola: na opkomst, vanaf het 3-4 bladstadium van het gewas.

N.B.: Gezien de beperkte ervaring en het grote assortiment aan bloemgewassen verdient het aanbeveling, voor zover geen ervaring werd opgedaan, door middel van een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen bloemgewas het middel goed verdraagt.

NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

AGRICHEM ASULAM 2

TOELATINGSNUMMER

FORMULERING

AARD WERKING

WERKZAME STOF

GEHALTE

: VOORHEEN 11078 N
: MET WATER MENGBAAR CONCENTRAAT
: HERBICIDE
: ASULAM
: 400 G/L

GEVARENAANDUIDINGEN

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H410

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P280

Beschermende handschoenen dragen.

P302+P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P391

Gelekte/gemorst stoff opruimen.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

UPL Benelux BV

Claudius Prinsenlaan 144A

4818 CP Breda

Tel. 085-071 23 00

UN3082



WAARSCHUWING



8 717185 520524

CHARGEENUMMER:
Zie elders op de verpakking.

