

DEVIRINOL® 45SC

W1

TOELATINGSNUMMER

: 14282 N

FORMULERING

: SUSPENSIE CONCENTRAAT

AARD WERKING

: HERBICIDE

WERKZAME STOF

: NAPROPAMIDE

GEHALTE

: 450 G/L

Dit middel is uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik.

GEVARENAANDUIDINGEN

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

**WAARSCHUWING****VOORZORGSMAATREGELEN**

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale
wetgeving.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.**Verdeler:**

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085 0712300

Toelatingshouder:

UPL Europe Ltd.
The Centre, Birchwood Park
Warrington, Cheshire
WA3 6YN, United Kingdom



® gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd.

CHARGENUMMER:
Zie elders op de verpakking

211218

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgj juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Winter koolzaad (onbedekte teelt)	Grondbehandeling voor opkomst	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1
Zomer koolzaad (onbedekte teelt)	Grondbehandeling voor zaaien	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1
Koolgewassen (onbedekte teelt)	Inwerken kort voor het planten	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1

Het gebruik in de teelt van aardbei, zwarte bes, kruisbes, druif, framboos, raapstelen, rucola, veldsla, boon met peul, radijs-achtigen, koolraap, knolraap, laanbomen en bloemisterijgewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	1,0 L/ha	2 per teeltcyclus	7
Zwarte bes (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-
Kruisbes (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-
Druif (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	2,75 L/ha	1 per 12 maanden	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Framboos (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-
Raapstelen (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Veldsla (onbedekte teelt)	Na zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	1,22 - 1,84 L/ha*	1 per teeltcyclus	-
Rucola (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	1,6 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Boon met peul (onbedekte teelt)	Voor opkomst (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	1,6 L/ha	1 per 12 maanden	-
Radijsachtigen (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Knolraap (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Koolraap (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Laanbomen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-
Bloemisterijge wassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-

*1,22 afhankelijk van de weersomstandigheden: 1,22 L/ha bij koud weer, anders 1,84 L/ha.

Toepassingsvoorwaarden

Schudden voor gebruik.

In de onbedekte teelt van koolgewassen, boon met peul, knol- en koolraap, raapstelen, radijsachtigen, veldsla en rucola (grondbehandeling) het middel toepassen in 150-600 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van koolzaad (grondbehandeling) het middel toepassen in 150-400 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van aardbei, zwarte bes, kruisbes, druif en framboos (grondbehandeling) het middel toepassen in 150-800 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen en laanbomen het middel toepassen in 300-800 liter water per ha.

In verband met residuen in volg- of vervanggewassen mogen in de eerstvolgende 180 dagen na toepassing van het middel geen voeder-/voedselgewassen anders dan de toegelaten gewassen worden geteeld. Voorafgaand aan het zaaien/planten van een vervanggewas mag het middel niet nogmaals toegepast worden.

Om zoogdieren te beschermen mag dit product, in de teelt van zwarte bes, kruisbes en framboos, alleen worden toegepast, indien er geen permanente grasstroken aanwezig zijn tussen de teeltreijen.

In verband met de lange nawerking van het middel in de bodem moet rekening worden gehouden met kans op schade aan volg- of vervanggewassen. Als de teelt mislukt kunnen koolsoorten of koolzaad als vervanggewas veilig geteeld worden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen napropamide. Napropamide behoort tot de acetamiden. De HRAC code is K3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

DEVIRINOL® 45SC bestrijdt de onkruiden op het ogenblik van de kieming en is werkzaam tegen de volgende onkruiden:

- Grassen: duist, windhalm, straatgras en graanopslag;
- Tweezaadlobbigen: akkerleeuweklauw, gewone klaproos, paarse dovenetel, echte kamille, boterbloem en gewone spurrie.

Kleefkruid, muur, ereprijs en herderstasje zijn matig gevoelig.

Inwerken kort voor planten koolgewassen:

Spuiten bij bewolkt weer op een onkruidvrije bodem voor het planten. Binnen 8 uur na spuiten 2-5 cm inwerken met een zaaibedcombinatie of rotorkoep. Na het inwerken kan direct gestart worden met het planten van de koolplanten.

Grondbehandeling overige gewassen:

Bodem of grond wordt behandeld voor het planten of tussen de planten waarbij al dan niet tegelijkertijd met een grondbewerking DEVIRINOL® 45SC wordt op- of ingebracht om kieming van onkruiden te voorkomen.

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP

Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Contact met de ogen Onmiddellijk spoelen met overvloedig water. Na de eerste spoeling eventueel contactlenzen verwijderen en doorgaan met spoelen gedurende minstens 15 minuten. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

Contact met de huid Huid wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Inslikken Mond spoelen met water. Waarschuw een VERGIFTIGINGSINFORMATIECENTRUM of een dokter/arts bij blootstelling of onwel worden.

Inademing In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.