

DEVIRINOL® 45SC

HERBICIDE

Toelatingsnummer: 14282 N (W.3)

Aard van het preparaat: Suspensie

Concentraat

Werkling: Herbicide

Werkzame stof: napropamide

Gehalte: 450 G/L

Dit middel is uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik.

Waarschuwing



Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Toelatingshouder:

UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan 144a
4181 CP Breda

Distributeur:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144a
4181 CP Breda
085 0712300
www.upl-ltd.com/nl



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven. Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

® gedeponeerd handelsmerk van UPL Holdings Coöperatief U.A.



8 717185 524574

INHOUD:
5 L





DEVIRINOL® 45SC

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgj juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Winterkoolzaad (onbedekte teelt)	Grondbehandeling voor opkomst	Eenjarige grasachtige en een- jarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1
Zomerkoolzaad (onbedekte teelt)	Grondbehandeling voor zaaien	Eenjarige grasachtige en een- jarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1
Koalgewassen (onbedekte teelt)	Inwerken kort voor het planten	Eenjarige grasachtige en een- jarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings- gebied	Type toepassing	Werkzaam- heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheid- stermijn in dagen
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Grondbe- handeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-



DEVIRINOL® 45SC

Toepassings- gebied	Type toepassing	Werkzaam- heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheid- stermijn in dagen
Aardbei (onbedekte teelt)	Grondbe- handeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,0 L/ha	2 per teeltcyclus	7	-
Bessen (onbedekte teelt)	Strokenbe- handeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Druif (onbedekte teelt)	Strokenbe- handeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,75 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Braam- en framboosach- tigen (onbedekte teelt)	Strokenbe- handeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Spinazie-acht- igen (onbedek- te teelt)	Na zaaien, voor op- komst (grondbe- handeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,22 - 1,84 L/ ha**	1 per teeltcyclus	-	62
Raapstelen (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbe- handeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcyclus	-	-

DEVIRINOL® 45SC

Toepassings- gebied	Type toepassing	Werkzaam- heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheid- stermijn in dagen
Veldsla (onbedekte teelt)	Na zaaien (grondbehan- deling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,22 - 1,84 L/ ha**	1 per teeltcy- clus	-	-
Rucola (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehan- deling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,6 L/ha	1 per teeltcy- clus	-	-
Baby leaves (onbedekte teelt)	Na zaaien (grondbehan- deling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,22 - 1,84 L/ ha**	1 per teeltcy- clus	-	28
Boon met peul (onbedekte teelt)	Voor opkomst (grondbehan- deling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,6 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Radijs-achtig- en (onbedek- te teelt)	Voor zaaien (grondbehan- deling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcy- clus	-	-
Knolraap (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehan- deling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcy- clus	-	-

DEVIRINOL® 45SC

Toepassings- gebied	Type toepassing	Werkzaam- heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheid- stermijn in dagen
Koolraap (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehan- deling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcy- clus	-	-
Aromatische kruidgewas- sen (onbedek- te teelt)	Na zaaien, voor opkomst (grondbehan- deling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,22 - 1,84 L/ ha**	1 per teeltcy- clus	-	-
Bloembollen en bloem- knollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte teelt)	Grondbehan- deling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Bolbloe- men en knolbloemen (onbedekte teelt)	Grondbehan- deling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Bloemisterij- gewassen (onbedekte teelt)	Grondbehan- deling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Bloemisterij- gewassen (onbedekte teelt)	Grondbehan- deling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-



DEVIRINOL® 45SC

Toepassings- gebied	Type toepassing	Werkzaam- heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheid- stermijn in dagen
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Grondbehan- deling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Bloemen- zaadteelt (onbedekte teelt)	Na zaaien, voor opkomst (grondbehan- deling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

**afhankelijk van de weersomstandigheden: 1,22 L/ha bij koud weer, anders 1,84 L/ha.

Overige toepassingsvoorwaarden

Schudden voor gebruik.

In de onbedekte teelt van koolgewassen, boon met peul, knol- en koolraap, spinazie-achtigen, raapstelen, radijsachtigen, veldsla, rucola, baby leaves, aromatische kruidgewassen en bloemenzaad het middel toepassen in 150-600 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van koolzaad het middel toepassen in 150-400 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van steenvruchten, aardbei, bessen, druif en braam- en framboos-achtigen het middel toepassen in 150-800 liter water per ha. In de onbedekte teelt van bloembollen- en bloemknollen (m.u.v. tulp en lelie), bolbloemen en knolbloemen, bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen en vaste planten het middel toepassen in 300-800 liter water per ha.

In verband met residuen in volg- of vervanggewassen mogen in de eerstvolgende 180 dagen na toepassing van het middel geen voeder-/voedselgewassen anders dan de toegelaten gewassen worden geteeld. Voorafgaand aan het zaaien/planten van een vervanggewas mag het middel niet nogmaals toegepast worden.

Om zoogdieren te beschermen mag dit product, in de teelt van bessen, braam- en framboos-achtigen, alleen worden toegepast, indien er geen permanente grasstroken aanwezig zijn tussen de teeltrijen.

In verband met de lange nawerking van het middel in de bodem moet rekening worden gehouden met kans op schade aan volg- of vervanggewassen.

Als de teelt mislukt kunnen koolsoorten of koolzaad als vervanggewas veilig geteeld worden.



DEVIRINOL® 45SC

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen napropamide. Npropamide behoort tot de acetamiden. De HRAC code is ø (onbekend werkingsmechanisme). Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

DEVIRINOL® 45SC bestrijdt de onkruiden op het gebruik van de kieming en is werkzaam tegen de volgende onkruiden:

- Grassen: duist, windhalm, straatgras en graanopslag;
- Tweezaadlobbigen: akkerleeuwklaauw, gewone klaproos, klein kruiskruid, perzikkruid, knopkruid, papegaaienkruid, paarse dovenetel, echte kamille, boterbloem en gewone spurrie.

Kleefkruid, muur, ereprijs en herderstasje zijn matig gevoelig.

Inwerken kort voor planten koolgewassen:

Spuiten bij bewolkt weer op een onkruidvrije bodem voor het planten. Binnen 8 uur na spuiten 2-5 cm inwerken met een zaaibedcombinatie of rotorkop. Na het inwerken kan direct gestart worden met het planten van de koolplanten.

Grondbehandeling overige gewassen:

Bodem of grond wordt behandeld voor het planten of tussen de planten waarbij al dan niet tegelijkertijd met een grondbewerking DEVIRINOL® 45SC wordt op- of ingebracht om kieming van onkruiden te voorkomen. Regen of beregening na de bespuiting met DEVIRINOL® 45SC verbetert de duurwerking tegen kiemende onkruiden.

Toepassing in boomkwekerijgewassen:

In de maanden april t/m september 4-8 uur na de bespuiting het middel inwerken (3-5 cm) of naregenen (10mm). Voor de hoogste effectiviteit DEVIRINOL® 45SC toepassen op een onkruidvrije bodem.

Toepassing in spinazie-achtigen:

Inwerken van DEVIRINOL® 45SC kan groeiremming geven. Het advies is om direct na de bespuiting na te regenen (10 – 15mm).

Toepassing in baby leaves:

Pas op: sla soorten zijn gevoelig voor DEVIRINOL® 45SC en er kan groeiremming plaatsvinden.

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP

Algemeen advies: Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

Contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met overvloedig water. Na de eerste spoeling eventueel contactlenzen verwijderen en doorgaan met spoelen gedurende minstens 15 minuten. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

Contact met de huid: Huid wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Inslippen: Mond spoelen met water. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Inademing: In de frisse lucht brengen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.



DEVIRINOL® 45SC

HERBICIDE

Toelatingsnummer: 14282 N **(W.3)**
Aard van het preparaat: Suspensie
Concentraat
Werking: Herbicide

Werkzame stof: napropamide
Gehalte: 450 G/L
Dit middel is uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik.

Waarschuwing



Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Toelatingshouder:

UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan 144a
4818 CP Breda

Distributeur:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144a
4818 CP Breda
085 0712300
www.upl-ltd.com/nl



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven. Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

® gedeponeerd handelsmerk van UPL Holdings Coöperatief U.A.

NL-2060716-02-0324



INHOUD:
5 L



