

Amphore Flex WG en aanbevelingen 14516 N W.1

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Aardappelziekte ¹	0,6 kg/ha	6	7	7

¹ aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

Amphore Flex dient toegepast te worden in 200 tot 600 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden

In aardappelen mag dit middel worden toegepast vanaf BBCH 21 (stadium waarbij eerste basale zij scheut zichtbaar is (>5cm)).

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen mandipropamid en cymoxanil. Mandipropamid behoort tot de mandelic acid amides. De FRAC code is 40. Cymoxanil behoort tot de cyanoaceetamide-oximes. De FRAC code is 27. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Aanbevelingen

Maatregelen ter voorkoming van oppervlaktewaterverontreiniging

“Gewasbeschermingsmiddelen horen niet thuis in water”

Om waterleven te beschermen en omdat oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding gebruikt kan worden is het van groot belang emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen. Syngenta raadt daarom aan de volgende maatregelen te nemen:

- Respecteer de verplichte maatregelen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) zoals de voorgeschreven driftreducerende maatregelen en teeltvrije zones. Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl of www.activiteitenbesluitagrarisch.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals onder meer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
- Smitapparaat gebruikt in onbedekte teelten dient overdekt gestald te worden en gereinigd op een was- en spoelplaats met (vloeistofdichte) opvangmogelijkheid. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen, die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden, in een Heliosec® (of gelijkwaardig alternatief) om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Algemeen

Niet vaker dan 6x per seizoen een mandipropamid houdend product spuiten. Vanuit het oogpunt van resistentie ontwikkeling Phytophthora producten afwisselen en dit product combineren met een product met een ander werkingsspectrum.