

# Lentagran®

WP

Inhoud:

# 1kg<sup>e</sup>

**Onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van sluit- en bloemkoolachtigen (onbedekte teelt), boerenkool, zaaiui, eerste- en tweedejaars plantui, sjalot, asperge (onbedekte teelt), prei en 20 gewas(groepen) onder KUG toelating.**

Werkzame stof: 45% pyridaat  
Aard van het preparaat: Spuitpoeder (WP)

Toelatingsnummer :

12915 N (W.6)

Chargennummer /  
Formuleringsdatum:  
Zie verpakking

**Lentagran® WP**

Toelatingsnummer: 12915 N (W.6)

Werkzame stof: pyridaat

Gehalte: 45 %

Aard van het preparaat: spuitpoeder (WP)

**WAARSCHUWING****Gevarenaanduidingen:**

- H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
**H410** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Voorzorgsmaatregelen:**

- P272** Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.  
**P273** Voorkom lozing in het milieu.  
**P280** Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.  
**P302+P352** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.  
**P333+P313** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
**P391** Gelekte / gemorste stof opruimen.  
**P501** Inhoud / verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

**Aanvullende etiketelementen:**

- EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Pyridaat.

**24u Noodnummer : +32 (0)14/58.45.45**

Toelatinghouder en distributeur: **Belchim Crop Protection nv/sa**

Technologielaan 7, 1840 Londerzeel | Tel.: 0167 521 246 | Fax: 0167 521 323 | Infolijn: +32 (0)52/315.815 | www.belchim.nl

® Gedeponoerd handelsmerk  
en product van Belchim Crop  
Protection NV/SA



5 414572 010353 &gt;



## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgj juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Sluitkoolachtigen	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	42
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	42
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	
Boerenkool	Na uitplanten / na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per teeltcyclus	2 kg/ha per 12 maanden	-	42
			1 kg/ha	2 per teeltcyclus		7	
Zaaiui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha*	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per 12 maanden	5	56
Eerstejaars plantui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha*	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per 12 maanden	5	56
Tweedejaars plantui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha*	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per 12 maanden	5	56
Sjalotten	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 - 0,5 kg/ha*	4 per teeltcyclus	1,5 kg/ha per 12 maanden	5	56
Asperge (onbedekte teelt)	Voor het steken of onderbladbehandeling na het steken	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	-
	Na het steken, onderblad bespuiting		1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	
Prei	Na planten / na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1 per 12 maanden	2 kg/ha per 12 maanden	-	28
			1 kg/ha	2 per 12 maanden		7	

\*maximaal 2 keer toepassen met 0,25 kg/ha en 2 keer met 0,5 kg/ha of maximaal 3 keer toepassen met 0,5 kg/ha

Het gebruik in de onbedekte teelt van lupine, blauwmaanzaad, koolzaad, klaver, luzerne, koolrabi, schorseneer, zilverui, picklers, bosuien, knoflook, asperge (zaai-bed, eerstejaars aanplant), zaai-prei, suikermais, maggiplant, valeriana, gladiool, bloemisterijgewassen, coniferen en sierheesters is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Lupine (Peulvrucht)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Blauwmaanzaad (Oliehoudende zaden)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Koolzaad (Oliehoudende zaden)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	-
Klaver (Voedergewassen)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	28
Luzerne (Voedergewassen)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per teeltcyclus	7	28
Koolrabi	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,65 kg/ha	1	1,65 kg/ha per 12 maanden	-	42
Schorseneer	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 kg/ha	3	1,5 kg/ha per teeltcyclus	7	56
Zilverui	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 kg/ha + 0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Picklers	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 kg/ha + 0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Bosuien (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 kg/ha + 0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Knoflook	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 kg/ha + 0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Asperge (zaai-bed, eerstejaars aanplant, onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per 12 maanden	7	-
Zaai-prei	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 kg/ha + 0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	56
Suikermais	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1	2 kg/ha per teeltcyclus	-	-
			1 kg/ha	2		7	
Maggiplant (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 kg/ha	2	2 kg/ha per 12 maanden	7	-
Valeriana (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 kg/ha	3	1,5 kg/ha per teeltcyclus	14	56
Gladiool (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 kg/ha + 0,5 kg/ha	2+3**	2 kg/ha per teeltcyclus	5	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Onderbladbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1	2 kg/ha per 12 maanden	-	-
Coniferen (onbedekte teelt)	Onder het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1	2 kg/ha per 12 maanden	-	-
Sierheesters (onbedekte teelt)	Onderbladbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 kg/ha	1	2 kg/ha per 12 maanden	-	-

\*\* maximaal 2 keer toepassen met 0,25 kg/ha en 3 keer met 0,5 kg/ha

### Toepassingsvoorwaarden

Drag beschermende kleding, handschoenen en adembescherming met een minimale beschermingsfactor van 10 bij toepassingen met een handspuit.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen is toepassing in de periode van 1 september tot 1 maart niet toegestaan.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing in lupine, blauwmaanzaad, koolzaad, klaver, luzerne, koolrabi, schorseneer, asperge (zaai-bed, eerstejaars aanplant), zaai-prei, suikermais, maggiplant, valeriana, gladiool, bloemisterijgewassen, coniferen en sierheesters uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing in ui en ui-achtigen uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen en een kantdop.

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in schorseneren uitsluitend toegestaan tot BBCH 40, het begin van de wortelverdikking/groei

In koolgewassen kan er kort na toediening enige gewasschade ontstaan. Dit verschijnsel is van voorbijgaande aard en leidt niet tot opbrengstderiving en/of kwaliteitsverlies.

Ter voorkoming van gewasschade dienen de onderstaande toepassingstijdstippen in acht te worden genomen:

- In ter plaatse gezaaide kool het middel toepassen na opkomst van het gewas vanaf het 4 tot 6 bladstadium van het gewas. In geplante kool het middel 2 tot 4 weken na het uitplanten toepassen als het gewas goed is aangeslagen en tenminste 4 bladeren heeft ontwikkeld.
- In uien toepassen na het vlagbladstadium in een LDS-systeem op een afgehard gewas. Vanaf het 2 bladstadium van het gewas bespuitingen uitvoeren.
- In prei toepassen na opkomst (vanaf het 2 tot 3 bladstadium) of na het uitplanten.

**In de productieteel van asperges toepassen voor het steken of na het steken door middel van een onderbladbehandeling. In 1e jaars aanplant en op zaai-bedden van asperges toepassen vanaf het 2 tot 3 bladstadium van het gewas.**

### Aanbevelingen

- Toepassen op afgehard gewas (voldoende waslaag).

- Toepassen op droog gewas en onkruiden.
- Let op groeistadium gewas.
- Toepassen op kleine goed groeiende onkruiden.
- Gebruik grove druppels (grove spuitdop).
- Gebruik voldoende water (200 L – bij voorkeur 400 L water/ ha).
- Toepassen bij weinig wind (zo weinig mogelijk).
- Lentagran combineren met andere contactherbiciden versterkt de wederzijdse werking. Dit varieert per teelt, moment en onkruidenspectrum.

### Eerste hulp maatregelen

**Algemeen:** na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

**Na inademing:** de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

**Na contact met de huid:** de huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

**Na contact met de ogen:** als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.

**Na opname door de mond:** bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.



Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan.

19\_02010401\_31V | 01035-NL



**BELCHIM**  
CROP PROTECTION

