



Contans®

12 kg

Toelatingsnr. 12423 N

Fungicide

ARTIKELNR.: 60469529

Productnaam: Contans

Toelatingsnummer: 12423 N (W2)

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat

Werkzame stof:

Coniothyrium minitans

Gehalte: 5%

Voorzorgsmaatregelen

P261 Inademing van stof vermijden.

P280 Beschermende handschoenen dragen.

P284 Adembescherming dragen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval.

Zie STORL.

Aanvullende etiketelementen

EUH208 Bevat Coniothyrium minitans. Kan een allergische reactie

STORL

VERPAKKING

Bedrijfsafval

Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie



veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties provoceren.

Opslag en verwijdering

Verkoop alleen toegestaan in onze

oegepende originele verpakking.

Droog en achter slot bewaren.

Verpakking koel bewaren bij

maximum 4°C.

Bij kamertemperatuur (20°C) het

product binnen 14 dagen verwerken.

Verpakking mag niet opnieuw worden

gebruikt.

Voor persoonlijk beschermings-

advies op maat ga naar

www.dresscode.bayer.nl

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



IN GEVAL VAN NOOD:

Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor

professionele hulpverleners:

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

(NVIC) +31 (0)30-274 8888

In overige gevallen Bayer CropScience

+31 (0)6-553 724 90

NL60504510G



4 000680 075684

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Buiten de gevaarlijke zone brengen. Liggen en vervoer van het slachtoffer in stabiele ligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Anraking met de huid: Met zeep en water wassen.

Anraking met de ogen: Bij aanhoudende oogirritatie of roodheid een oogarts opzoeken. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten.

Inslukken: Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten drinken. GEEN braken opwekken tenzij op aanwijzing van arts of Nederlands Vergiftigings Informatie Centrum (NVIC).

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen: Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: Symptomatisch behandelen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitief lijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctpb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Akkerbouwgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien, planten of potten	Sclerotienrot ^{1,2}	2 kg/ha	1
Aardappelen	Na de oogst behandeling, voor de koude bewaring	Sclerotienrot ^{1,2}	50 g per 1000 kg aardappelen	1
Witlof (pennenteelt)	Na de oogst behandeling, voor de koude bewaring	Sclerotienrot ^{1,2}	50 g per 1000 kg pennen	1
Groenteteelt	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien of planten	Sclerotienrot ^{1,2}	4 kg/ha	1
Wortelen	Na de oogst behandeling, voor de koude bewaring	Sclerotienrot ^{1,2}	50 g per 1000 kg wortelen	1
Siertelggewassen	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien of planten	Sclerotienrot ^{1,2}	4 kg/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

1 Sclerotienrot (*Sclerotinia minor*)

2 Sclerotienrot (*Sclerotinia sclerotiorum*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Voor de na-oogst behandeling dient 10-20 liter spuitvloeistof te worden gebruikt per 1000 kg aardappelen, witlofpennen of wortelen.

Inwerken in de grond voor landbouwgewassen tot 5 cm, voor groenteteelt en siertelggewassen tot 10 cm.

In de teelt van akkerbouwgewassen het middel toepassen in 150-400 L water /ha.

In de bedekte groenteteelt en in de teelt van siertelggewassen het middel toepassen in 200-1200 L water /ha.

In de onbedekte groenteteelt het middel toepassen in 200-800 L water /ha.

In de teelt van siertelggewassen het middel toepassen in 200-1200 L water /ha.

Bevat *coniothyrium minitans* CON/M/91-8. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

AANBEVELINGEN

Algemeen

Contans bevat sporen van *Coniothyrium minitans* - een schimmel die de sclerotien van bepaalde *Sclerotinia*-soorten zoals *Sclerotinia sclerotiorum* en *Sclerotinia minor* parasiteert. Het parasiteren van de sclerotien gebeurt na contact met de sporen van *Coniothyrium minitans*. Door het parasiteren van de sclerotien wordt de infectiebron van *Sclerotinia sclerotiorum* en *S. minor* vermindert zodat de infectiedruk verlaagd wordt met een verminderde aantasting tot gevolg. Daarnaast heeft Contans ook een directe werking op de myceliumontwikkeling van *Sclerotinia minor*.

Op zwaar besmette percelen is het effect van een eenmalige behandeling veelal niet toereikend. In dergelijke situaties zullen opeenvolgende behandelingen noodzakelijk zijn om uiteindelijk te komen tot verlaging van de infectiedruk vanuit de grond.

TOEGELATEN IN

Definitief lijst toepassingsgebieden (DTG). De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctpb, juni 2015).

Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (<http://agro.bayer.nl/Products/DTG>)

Toepassing

Contans kan worden toegepast met de gebruikelijke spuitapparatuur gevolgd door het inwerken in de bodem. Pas Contans toe met gereinigde spuitapparatuur zonder resten van voorafgaande behandelingen. Om aantasting door *Sclerotinia* via ascosporen te vermijden, wordt aanbevolen om Contans goed te mengen door de volledige - door *Sclerotinia* aangetaste - zone.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Geen.

Voorkomen emissie

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Chargennummer: zie elders op de verpakking

© is een geregistreerd handelsmerk

van de Bayer Groep

Bayer CropScience SA-NV

Postbus 231

3640 AE Mijdrecht

Tel. 0297-280358

Bayer