

Force, WG en aanbevelingen 13135 N W3

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een zaadbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing
Bieten	Bietenkever ¹ , miljoenpoot ²	60 ml per 100.000 zaden
Zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden	afhankelijk van het land van bestemming	afhankelijk van het land van bestemming

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Bietenkever (*Atomaria linearis*)

² Miljoenpoot (*Blaniulus guttulatus*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Voor zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden geldt het volgende:

- Het middel mag uitsluitend op zaaizaden worden aangebracht door bedrijven, die in het bezit zijn van een risico-inventarisatie en -evaluatie zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
- Te behandelen gewassen, toepassingen en doseringen zijn afhankelijk van het land van bestemming; de voorschriften van het betreffende land dienen in acht te worden genomen.
- Voor de toepassing op zaaizaad bestemd voor export is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd

Het volgende moet worden vermeld op de zakken met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Draag beschermende kleding, handschoenen en adembescherming bij het laden van de zaai-apparaat.

Draag beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming tijdens het schoonmaken van de zaai-apparatuur.

Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.

In verband met residuen in volggewassen, binnen 30 dagen na toepassing geen gewassen telen die bestemd zijn voor menselijke consumptie of als diervoeder.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het behandelde zaad volledig in de bodem moet worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het zaad ook op de kopakker is ondergewerkt. Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst zaad verwijderen.

Resten van behandeld zaad nooit verspreiden of vervoederen aan dieren.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof tefluthrin. Tefluthrin behoort tot de pyrethroiden. De IRAC code is 3A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Het volgende moet additioneel worden vermeld op de zakken met behandeld bietenzaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Uitzaai van behandeld bietenzaad is alleen toegelaten met behulp van precisiezaai van gepileerd zaad, waarbij het behandelde zaad direct met grond bedekt wordt.

Aanbevelingen

Maatregelen ter voorkoming van oppervlaktewaterverontreiniging

“Gewasbeschermingsmiddelen horen niet thuis in water”

Om waterleven te beschermen en omdat oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding gebruikt kan worden is het van groot belang emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen. Syngenta raadt daarom aan de volgende maatregelen te nemen:

- Respecteer de verplichte maatregelen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) zoals de voorgeschreven driftreducerende maatregelen en teeltvrije zones.
- Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl of www.activiteitenbesluitagrarisch.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Algemeen

Het middel uitsluitend toepassen via het coaten van zaden ter voorkoming van schade door insecten. Force is ondermeer werkzaam tegen bodeminsecten zoals ritnaalden en engerlingen en tegen wortelvlieg, uienvlieg en bonenvlieg.