

Elatus Era, WG en aanbevelingen, 15483 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Bruine roest ¹ Gele roest ² Bladvlekkenziekte ³ Aarfusarium ⁴	1 l/ha	1	42
Wintergerst	Netvlekkenziekte ⁵ Bladvlekkenziekte ⁶ Ramularia ⁷ Dwergroest ⁸	1 l/ha	1	
Winterrogge	Bruine roest ¹ Bladvlekkenziekte ⁶	1 l/ha	1	42
Triticale	Bruine roest ¹ Bladvlekkenziekte ³	1 l/ha	1	42
Spelt	Bruine roest ¹ Gele roest ² Bladvlekkenziekte ³	1 l/ha	1	42
Zomertarwe	Bruine roest ¹ Gele roest ² Bladvlekkenziekte ³ Aarfusarium ⁴	1 l/ha	1	42
Zomergerst	Netvlekkenziekte ⁵ Bladvlekkenziekte ⁶ Ramularia ⁷ Dwergroest ⁸	1 l/ha	1	
Zomerrogge	Bruine roest ¹ Bladvlekkenziekte ⁶	1 l/ha	1	42

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

¹ Bruine roest (*Puccinia recondita*)

² Gele roest (*Puccinia striiformis*)

³ Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici*, *Septoria nodorum*)

⁴ Aarfusarium (*Fusarium spp*)

⁵ Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

⁶ Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

⁷ Ramularia (*Ramularia collo-cygni*)

⁸ Dwergroest (*Puccinia hordei*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van winter- en zomertarwe, winter- en zomerrogge, triticale en spelt Elatus Era toepassen vanaf het zichtbaar worden van de eerste knoop (BBCH 31) tot aan het einde van de bloei (BBCH 69). In de teelt van winter- en zomergerst Elatus Era toepassen vanaf het zichtbaar worden van de eerste knoop (BBCH 31) tot aan einde van de aarvorming (BBCH 59).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in granen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen benzovindiflupyr en prothioconazool. Benzovindiflupyr behoort tot de pyrazole-carboximiden, de FRAC code is 7. Prothioconazool behoort tot de triazolen, de FRAC code is 3. Bij dit product bestaat kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Maatregelen ter voorkoming van oppervlaktewaterverontreiniging

“Gewasbeschermingsmiddelen horen niet thuis in water”

Om waterleven te beschermen en omdat oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding gebruikt kan worden is het van groot belang emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen. Syngenta raadt daarom aan de volgende maatregelen te nemen:

- Respecteer de verplichte maatregelen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) zoals de voorgeschreven driftreducerende maatregelen en teeltvrije zones. Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl of www.activiteitenbesluitagrarisch.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
- Spuitapparatuur gebruikt in onbedekte teelten dient overdekt gestald te worden en gereinigd op een was- en spoelplaats met (vloeistofdichte) opvangmogelijkheid. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen, die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden, in een Heliosec® (of gelijkwaardig alternatief) om onnodige milieubelasting te voorkomen.