

Fusilade Max WG en aanbevelingen, 12519 N W.4 bij etiketinstructie versie 9

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappel	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha	1 per teeltcyclus	75
Bieten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Peulvruchten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	90
Roodzwenkgras	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	49
Hardzwenkgras	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	49
Blauwmaanzaad	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Karwij	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Koolzaad	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Veldbonen (voor ensilage)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	90
Cichorei	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Witlof (pennenteelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Appel	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Peer	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Kers (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Pruim (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Aardbei (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	42
Aalbes (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	90
Kruisbes	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	90
Braam- en framboosachtigen (<i>Rubus</i> spp.) (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	45
Boon met peul (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Erwt zonder peul	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Wortelen	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Koolraap	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Rode biet	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Knolselderij (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Schorseneer	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Uien	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	28
Sjalotten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	28
Asperge (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulpen (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Houtige beplanting	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Akkerranden	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-

Het middel dient te worden toegepast in 400-500 liter water per hectare

Toepassingsvoorwaarden

Toepassing is slechts toegestaan in de periode van 1 april tot en met 30 september.

Voor de teelt van aardbei (onbedekte teelt), aalbes (onbedekte teelt), kruisbes, braam- en framboosachtigen (*Rubus* spp.) (onbedekte teelt), geldt dat de toepassing alleen is toegestaan vóór de bloei en/of na de oogst

Voor de teelt van boon met peul (onbedekte teelt) en erwt zonder peul geldt dat de toepassing alleen is toegestaan vóór de bloei

Voor asperge (onbedekte teelt) geldt dat de toepassing uitsluitend is toegestaan na de oogst.

Het middel is gevaarlijk voor roofmijten. Vermijd onnodige blootstelling.

Aanbevelingen

Maatregelen ter voorkoming van oppervlaktewaterverontreiniging

“Gewasbeschermingsmiddelen horen niet thuis in water”

Om waterleven te beschermen en omdat oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding gebruikt kan worden is het van groot belang emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen. Syngenta raadt daarom aan de volgende maatregelen te nemen:

- Respecteer de verplichte maatregelen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) zoals de voorgeschreven driftreducerende maatregelen en teeltvrije zones.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl of www.activiteitenbesluitagrarisch.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
- Spuitapparatuur gebruikt in onbedekte teelten dient overdekt gestald te worden en gereinigd op een was- en spoelplaats met (vloeistofdichte) opvangmogelijkheid. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen, die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden, in een Heliosecc® (of gelijkwaardig alternatief) om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Algemeen

Fusilade Max bestrijdt éénjarige grassen, inclusief graanopslag en overblijvende grassen (kweekgras). De werking tegen straatgras is onvoldoende.

Fusilade Max is een systemisch herbicide dat door het blad wordt opgenomen. De te bestrijden onkruidgrassen moeten daarom boven de grond staan. Vanuit het blad wordt het middel naar de groeipunten en de wortels getransporteerd. De groei van het onkruidgras stopt binnen 1 á 2 dagen na de bespuiting. De eerste afstervingsymptomen zijn na ongeveer een week zichtbaar, het eerst bij de groeipunten. Na 3-5 weken is de afsterving in het algemeen compleet.

Het is aan te bevelen om Fusilade Max toe te passen als zoveel mogelijk onkruid aanwezig is, echter het gewas mag het onkruid niet afschermen. Toepassen op een droog gewas en onkruid en met enige uren droog weer in het vooruitzicht. Toepassing op onkruid dat goed aan de groei is, geeft over het algemeen een beter resultaat.

Bij toepassing voldoende water (400-500 l/ha) gebruiken omdat goede bevochtiging van het onkruid van belang is voor een goed resultaat. Na toepassing minstens 1 week wachten met een eventuele grondbewerking om het middel voldoende te laten inwerken.

Het is raadzaam om tussen een bespuiting met Fusilade Max en een bespuiting ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden zeven dagen tussenruimte aan te houden.

Toepassingen

Onderstaande dosering worden aanbevolen voor de in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift vermelde gewassen en toepassingen:

Te bestrijden onkruid	Dosering (l/ha)	Groeistadium onkruid	Opmerking
hanepoot	1	Vanaf 3 bladstadium tot einde uitstoeling	
duist en windhalm	1,25 – 1,5	Vanaf 3 bladstadium tot einde uitstoeling	de hoogste dosering op uitgesteelde planten

wilde haver, graanopslag, als stuifdek ingezaaide gerst of rogge, opslag ruw- en veldbeemdgras en groene naaldaar	1,5	Vanaf 3 bladstadium tot einde uitstoeling	
opslag van raaigras	2	In het 2 tot 4 bladstadium	
kweekgras	2,5 – 3	Vanaf 20 cm lengte.	de hoogste dosering toepassen in openblijvende gewassen en als er sprake is van een lang gevestigd en/of zware begroeiing van kweekgras. Deze toepassing is niet toegestaan in aardappel omdat de maximale dosering in aardappel 2 L/ha is.

Het sierteelt assortiment is zeer breed en voortdurend aan verandering onderhevig. Bij de ontwikkeling van een middel kan het slechts in een beperkt aantal gewassen/rassen worden getest. Indien nog geen ervaring is opgedaan in een specifiek gewas of ras, wordt aangeraden om eerst op kleine schaal een proefbespuiting uit te voeren om de verdraagzaamheid te testen. Blijf het gewas gedurende tenminste 10 dagen nauwlettend volgen op mogelijke ongewenste gewasreacties. Wees voorzichtig met het mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen, bladmeststoffen, uitvloeiers of hechters indien daarmee nog geen ervaring is opgedaan. In dat geval wordt aangeraden de betreffende middelencombinatie eerst op kleine schaal te testen op gewasveiligheid.

Boomkwekerijgewassen en plantsoenbeplantingen

In de volgende gewassen heeft Fusilade Max in proeven gewasreacties veroorzaakt:

Abies nordmanniana, Amelanchier lamarckii, Acer pseudoplatanus (eenjarige zaailing), Acer campestre, Deutzia sp. , Euonymus fortunei 'Vegetus', Gingko, Juniperus horizontalis 'Bar Harbor', Juniperus media 'Pfitzeriana' en Sequoiadendron giganteum.