

Arysta
LifeScience

CLIOPHAR 100 SL

CLOPYRALID : 100 g/l

Aard van het preparaat : vloeistof
Toelatingsnummer : 11955 N (W3)
Werkzame stof : clopyralid
Gehalte : 100 g/l

WAARSCHUWING



Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar

SPI Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden !

De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product. Daar door hem geen controle over het gebruik ervan kan worden uitgeoefend, kan hij niet de aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



Distributie door :
R. VAN WESEMAEL b.v.
Zoutestraat 109, 4561 TB Hulst, Ned.
Tel. 0114-314853

Inhoud : 1 liter

Chargennummer : zie verpakking



Toelatingshouder:
Arysta LifeScience Benelux Sprl.
rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée, Belgique
Tél. 32-4-385 97 11
Fax 32-4-385 97 49

CA603277 ELI. 2018-01 v01

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	na opkomst	breedbladige onkruiden	1,2 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,5 l/ha per teeltcyclus	-
		kleine eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	3 x per teeltcyclus		7
Maïs	na opkomst	breedbladige onkruiden	1,2 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,2 l/ha per teeltcyclus	-
Koolzaad	na opkomst	breedbladige onkruiden	1,2 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,2 l/ha per teeltcyclus	-
Vlas (lijnzaad en vezelvlas)	na opkomst	breedbladige onkruiden	1,0 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,0 l/ha per teeltcyclus	-
Aardbei (onbedekte teelt)	na oogst	breedbladige onkruiden	1,0 l/ha	1 x per 12 maanden	1,0 l/ha per 12 maanden	-
	na uitplanten	kleine eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	2 x per teeltcyclus		7
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	na uitplanten of na opkomst	breedbladige onkruiden	1,0 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,0 l/ha per teeltcyclus	-
		kleine eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	2 x per teeltcyclus		10
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	na uitplanten of na opkomst	breedbladige onkruiden	1,0 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,0 l/ha per teeltcyclus	-
		kleine eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	2 x per teeltcyclus		10

*in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen.

Het gebruik in de teelt gewassen voor bloemenzaad, de onbedekte teelt van meekrap en onbedekte teelt van brandnetel is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsprocedure". Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemenzaad-teelt (onbedekte teelt)	voor opkomst of na opkomst	breedbladige onkruiden	0,75-1,2 l/ha	1	1,2 l/ha	-
		kleine éénjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	3	1,5 l/ha	7
Meekrap (onbedekte teelt)	na uitplanten	Breedbladige onkruiden	1,2 l/ha	1	1,2 l/ha	-
		kleine éénjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	3	1,5 l/ha	7
Brandnetel (onbedekte teelt)	na opkomst	Breedbladige onkruiden	0,75-1,2 l/ha	1	1,2 l/ha	-

*in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen.

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product tussen 1 september en 1 maart niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing op perceelsranden die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Bij het mislukken van de teelt kunnen problemen verwacht worden bij de teelt van de vervanggewassen boon, erwt, aardappel, klaver, sla, schorseeneer, witlof, chicorei, wortel, ui, spinazie (deze lijst is niet volledig).

AANBEVELINGEN

Algemeen

CLIOPHAR 100 SL is een systemisch bladherbicide. Het middel bij voorkeur spuiten bij groeizaam weer, bij temperaturen van $\pm 15^{\circ}\text{C}$ en hoge luchtvochtigheid. Niet spuiten bij temperaturen hoger dan 25°C of als binnen 6 uur regen wordt verwacht.

CLIOPHAR 100 SL heeft een goede werkzaamheid tegen samengesteldbloemige onkruiden en distels.

Toepassingen

Bieten

Tijdstip van toepassing: 1 tot 10 bladstadium van de bieten (BBCH 10-19)

De volle dosis van 1,2 l/ha wordt toegepast op bieten in 8 of 9 bladstadium ter bestrijding van distels en samengesteldbloemige onkruiden.

3 fracties van 0,5 l/ha CLIOPHAR 100 SL toevoegen aan de standaardmiddelen van het lage doseringssysteem vanaf het 2-bladstadium van de biet. Een interval van 7 dagen tussen de behandelingen dient gerespecteerd te worden.

Deze toevoeging van 3 x 0,5 l/ha CLIOPHAR 100 SL bestrijdt zeer kleine hondspeterselle en drielidelig tandzaad en heeft eveneens een werking tegen o.a. veelknopigen, zwarte nachtschade, kamille-soorten, akkerkool en klein kruiskruid.

Maïs

Tijdstip van toepassing: 6 tot 10 bladstadium van de maïs (BBCH 16-19)

Koolzaad

Tijdstip van toepassing: vanaf het 2 bladstadium in de herfst, of na het hernemen van de groei en voor het begin van de bloei in de lente.

Vlas

Tijdstip van toepassing: 12 tot 18 cm hoogte van het vlas, niet spuiten na het verschijnen van de bloemknop

Onbedekte teelt van aardbei

Tijdstip van toepassing: BBCH 15 tot 97 (zomer/herfst)

De volle dosis van 1,0 l/ha wordt toegepast in het najaar na de oogst (BBCH 90-97) ter bestrijding van distels en samengesteldbloemige onkruiden.

Gefractioneerde toepassing van Cliophar 100 SL in 2 fracties van 0,5 l/ha ter bestrijding van kleine éénjarige onkruiden.

De behandeling dient plaats te grijpen vanaf 10 dagen na het planten in de zomer (BBCH 15-19) en zal herhaald worden in functie van het stadium van de aardbeien of de onkruiden. Een interval van 7 dagen tussen de behandelingen dient gerespecteerd te worden.

Onbedekte teelt van sluitkoolachtigen en bloemkoolachtigen

Tijdstip van toepassing: BBCH 12-18 (3 tot 4 weken na het planten)

De volle dosis van 1,0 l/ha wordt toegepast vanaf het 2 bladstadium of 3 tot 4 weken na planten ter bestrijding van distels of samengesteldbloemige onkruiden.

Gefractioneerde toepassing van Cliophar 100 SL in 2 fracties van 0,5 l/ha ter bestrijding van kleine éénjarige onkruiden.

De eerste behandeling vindt plaats op BBCH 15-16 en de tweede op BBCH 17-18. Een interval van 10 dagen tussen de behandelingen dient gerespecteerd te worden.

Bloemzaadteelt (onbedekte teelt)

Tijdstip van toepassing: periode van 1 maart tot en met 31 oktober

Dosering:

- 1 x 0.75-1.2 l middel per ha voor opkomst **of**
- 2 of 3 x 0.5 l middel per ha (LDS, na opkomst) met een interval van tenminste 7 dagen.

Onbedekte teelt van meekrap

Tijdstip van toepassing: Pleksgewijze toepassing: periode van 1 april tot en met 31 juli, Volveldstoepassing: direct na het planten in de periode van 1 april tot 31 mei.

Ter bestrijding van akker- en melkdistel, en andere onkruidplanten in een later ontwikkelingsstadium.

Dosering:

Met een veldspuit: 1.2 l middel per ha voor de te behandelen perceelsgedeelten

Ter bestrijding van diverse onkruiden. Bij voorkeur toepassen op zeer jonge onkruiden, kiemlob- tot 2 echt bladstadium

Dosering:

- 1.2 l middel per ha, maximaal 1 maal toepassen direct na het planten **of**
- 0.5 l middel per ha, maximaal 3 maal toepassen gedurende het groeiseizoen met een interval van tenminste 7 dagen.

Arysta
LifeScience

CLIOPHAR 100 SL

CLOPYRALID : 100 g/l

Aard van het preparaat : vloeistof
Toelatingsnummer : 11955 N 
Werkzame stof : clopyralid
Gehalte : 100 g/l

WAARSCHUWING



Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar

SPI Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden !

De fabrikant garandeert de kwaliteit van het produkt. Daar door hem geen controle over het gebruik ervan kan worden uitgeoefend, kan hij niet de aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



Distributie door :

R. VAN WESEMAEL b.v.

Zoutestraat 109, 4561 TB Hulst, Ned.

Tel. 0114-314853

Inhoud : 1 liter

Chargennummer : zie verpakking



Toelatingshouder:
Arysta LifeScience Benelux Sprl.
rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée, Belgique
Tél. 32-4-385 97 11
Fax 32-4-385 97 49

CA603277 ELI. 2018-01 v01

