



GEVAAR

Gevaar aanduidingen

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtweg terecht komt.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

H066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

H208 Bevat clethodim: Kan een allergische reactie veroorzaken.

H401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Vorstvrij, koel en droog bewaren.

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen:

Algemeen advies: Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).

Na inademing: Frisse lucht laten inademen. Slachtoffer laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Na contact met huid: Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.

Na contact met de ogen: Spoel met veel water gedurende 10 minuten.

Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Een arts raadplegen indien pijn en/of roodheid aanhouden.

Na inslikken: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Toelatingsnummer: 15810 N

Aard van het preparaat:
Emulgeerbaar concentraat

Werkzame stof: clethodim

Gehalte: 120 g/L

Inhoud: 5 L

Chargennummer:
Zie opdruk verpakking

Toelatingshouder:
Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Artix - BP 80
F-64150 Nogueres
Frankrijk

VERKOOP:



WESEMAEL

R. VAN WESEMAEL b.v.
ZOUTESTRAAT 109,
4561 TB HULST (Ned.)
TELEFOON 0114-314 853



Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst behandeling of behandeling na uitplanten in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2,5 l/ha	1	
Bieten	Eenjarige grasachtige onkruiden en stuifdek	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2,5 l/ha	1	
Winterkoolzaad	Eenjarige grasachtige onkruiden en graanopslag	1 l/ha	1	120
Boon met peul (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	30
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	30
Sluitkoolachtigen	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	28
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Wortelen	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	48
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Zaaiui	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Eerstejaars plantui	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Tweedejaars plantui	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Sjalotten	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2 l/ha	1	
Knoflook	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1	56
	Kweek ¹	2 l/ha	1	

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet aangetoond.

¹Kweek (*Agropyron repens*)

Het gebruik in de onbedekte teelt van blauwmaanzaad, karwij (oliehoudende zaden), zonnebloem (oliehoudende zaden), vezelgewassen, lupine (groenbemester), Afrikaantjes, witlof (pennenteelt), cichorei, aardbei (vermeerdering, wachtbed en productie), bloemkoolachtigen, schorseneer, zilverui en picklers, maggi, engelwortel, bevernelwortel, wortelpeterselie, lelie, iris, dahlia, zantedeschia, hyacint, narcis, bloemisterijgewassen, boomwekerijgewassen, vaste planten en bij de veredelingsteelt, bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheids termijn in dagen
Blauwmaanzaad	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	120
Karwij (oliehoudende zaden)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	120
Lijnzaad	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	-
Zonnebloem (oliehoudendezaden)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	100
Vezelgewassen	Voor en na opkomst	Kweek ¹	2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-
		Eenjarige grasachtige onkruiden en stuifdek	1 l/ha			
Lupine (groenbemester)	Voor en na opkomst	Kweek ¹	2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-
		Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha			
Afrikaantjes (groenbemesters)	Na opkomst	Kweek ¹	2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-
		Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha			
Witlof (pennenteelt)	Na opkomst	Kweek ¹ en straatgras ²	2 l/ha	1 per teeltcyclus	2,5 l/ha per teeltcyclus	56
		Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha			
Cichorei	Na opkomst	Kweek ¹	2,5 l/ha	1 per teeltcyclus	2,5 l/ha per teeltcyclus	56
		Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha			
Aardbei vermeerdering en wachtbed (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Kweek ¹	2,5 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-
		Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha			
Aardbei productie (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Kweek ¹	2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	30
		Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha			
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Voor en na opkomst	Kweek ¹	2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	28
		Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha			
Schorseneer	Na opkomst	Kweek ¹	2 l/ha	1 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	48
Zilverui	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	56
		Kweek ¹	2 l/ha			
Picklers	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	56
		Kweek ¹	2 l/ha			
Maggi	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	48
		Kweek ¹	2 l/ha			
Engelwortel	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	48
		Kweek ¹	2 l/ha			
Bevernelwortel	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	48
		Kweek ¹	2 l/ha			

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheids termijn in dagen
Wortelpeterselie	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden Kweek ¹	1 l/ha 2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	48
Lelie (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden Eenjarige grasachtige onkruiden Kweek ¹	0,5 l/ha ³ 1 l/ha 2 l/ha	4 per teeltcyclus 1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-
Dahlia (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden Kweek ¹	1 l/ha 2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-
Narcis (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden Kweek ¹	1 l/ha 2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-
Zantedeschia (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden Kweek ¹	1 l/ha 2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-
Iris (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden Kweek ¹	1 l/ha 2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-
Hyacint (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden Kweek ¹	1 l/ha 2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden Kweek ¹	1 l/ha 2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-
Boomkwekerijgewassen (grondgebonden, onbedekte teelt)	Voor en na opkomst ⁴ , rijenbehandeling	Straatgras ²	2 l/ha	1 per 12 maanden	2 l/ha per 12 maanden	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden Kweek ¹	1 l/ha 2 l/ha	1 per 12 maanden	2 l/ha per 12 maanden	-
Veredelingsteelt, bloemen- zaadteelt, groenten-zaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbe- mestersgewassen, voedergras- sen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap (onbedekte teelt)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden Kweek ¹	1 l/ha 2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	-

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Kweek (*Agropyron repens*)

² Straatgras (*Poa annua*)

³ In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

⁴ Toepassen met gebruikmaking van afschermkappen om het gewas niet te raken

Behandeld lijnzaad niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.

Behandelde vezelgewassen niet voor dierlijke consumptie bestemmen.

Toepassing van het middel in karwij is alleen toegestaan voor productie van karwij als oliehoudend zaad (niet als kruidenzaadgewas).

Toepassen in de teelt van bloemkoolachtigen voordat de oogstbare delen (bloemkool of broccoli) worden gevormd (voor BBCH 41).

Om niet tot dedoelsoorten behorende geleedpotigen/insecten en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de onderstaande maatregelen:

- Lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met minimaal 50% diffracterende spuitdoppen + kantdop + luchtondersteuning; of
- Lage spuitboomhoogte (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met Venturidop + kantdop + 1,0 meter teeltvrije zone (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelgrens); of
- Conventionele spuit in combinatie met 75% diffracterende spuitdoppen + kantdop + 2,75 meter teeltvrije zone (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelgrens); of
- Sleepdoek in combinatie met minimaal 50% diffracterende spuitdoppen; of
- Overkapte beddenspuit.

Met name de gewassen mais en granen zijn zeer gevoelig voor de stof clethodim. Met deze gewassen in de directe nabijheid dient bij bespuiting van het te behandelen perceel elke mate van drift naar genoemde gewassen te worden vermeden.

Aanbevelingen

Algemeen

Balistik is een systemisch werkend bladherbicide voor de bestrijding van diverse soorten eenjarige grassen (inclusief opslag van granen) en kweekgras. Ook straatgras wordt bestreden. Balistik is een kant- en klare formulering.

Op moment van toepassen moeten grassen goed aan de groei zijn en voldoende bladmassa en wortelmassa hebben.

Niet spuiten bij hoge temperaturen ($>25^{\circ}\text{C}$) en op gewassen onder stress-omstandigheden.

Na toepassing moet het tenminste 1 uur droog weer blijven.

Toepassen met een fijne druppel op een droog gewas in 200-400 liter spuitvloeistof per ha. Onkruid goed raken.

De groei van onkruiden stopt binnen enkele dagen na de bespuiting. Afhankelijk van de weersomstandigheden en onkruiden is de werking 1-2 weken na toepassing zichtbaar en na 5 weken volledig voltooid

Attentie

Het gewas moet gezond en vitaal zijn.

Niet gemengd met andere middelen verspuiten, tenzij anders aangegeven.

Toepassingsmoment

Eenjarige grassen, graan-en grasopslag en straatgras worden het beste bestreden vanaf 3 blad – (begin) uitstoeiing maar zijn gevoelig tot het eind van het uitstoeiingsstadium. Gebruik voor groot straatgras (einde uitstoeiing) een dosering van 2 l/ha. Tegen kweek spuiten op het moment dat het onkruid 15-20 cm hoog is.

Blauwmaanzaad

Toepassen uiterlijk einde bladvorming (BBCH19) en in ieder geval voordat de stengels gaan strekken.

Winterkoolzaad

Maximaal 1 liter toepassen in verband met gevoeligheid van dit gewas.

Toepassen in perioden met verwachte (nacht) vorst en niet later dan 1 november. Toepassing kort voor een winterperiode met lage temperaturen kan namelijk een negatief effect hebben op de gewasontwikkeling in het voorjaar.

Erwt met peul (onbedekte teelt)

Maximaal 1 liter toepassen in verband met gevoeligheid van dit gewas.

Boon met peul (onbedekte teelt)

Maximaal 1 liter toepassen in verband met gevoeligheid van dit gewas.

Zantedeschia, Iris

Ervaringen in deze gewassen zijn nog beperkt.

Lelie (onbedekte teelt)

Volle dosering Balistik altijd apart toepassen en na volledige gewasstrekking. Bij LDS-toepassing (0,5l/ha) kan het middel toegevoegd worden aan de tankmix. Start de LDS-bespuiting zodra de grassen kiemen.

Hyacint (onbedekte teelt)

Toepassen na de bloei om bloemverkleuring te voorkomen op het veld.

Aardbeien onbedekte teelt (productie, vermeerdering en wachtbed)

gebruik bij pas geplante aardbeien maximaal 1 l/ha Balistik.

Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) en vaste planten (onbedekte teelt)

Ervaringen met toepassing van dit middel zijn nog beperkt. Het verdient daarom aanbeveling, voor zover nog geen ervaring is opgedaan, door middel van een proefbe-sputing vast te stellen of de te behandelen soorten en/of variëteiten het middel goed verdragen.

Kijk voor meer informatie op de productpagina op www.certiseurope.nl.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.

De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Arysta LifeScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Arysta LifeScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.