

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-Gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Aardappelziekte ¹	0,15 L/ha	4	7	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

RESISTENTIE

Dit middel bevat de werkzame stof oxathiapiprolin. Oxathiapiprolin behoort tot de piperidiny-thiazole- isoxazolines. De Frac code is 49. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

GEBRUIKSAANWIJZING**ALGEMEEN**Werking

Zorvec Enicade® is een fungicide ter bestrijding van blad- en vruchtschimmels in sommige cultuurgewassen. Het bevat de werkzame stof oxathiapiprolin, een geheel nieuwe schimmelbestrijder die de ontwikkeling van sporen in een vroeg stadium voorkomt en zo de uitgroei van schimmels remt. Dit nieuwe werkingsmechanisme wordt door de FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) ingedeeld in klasse 49. Oxathiapiprolin dringt door tot in de plantdelen en verdeelt zich door de hele plant, zodat het een systemische werking heeft.

Omstandigheden tijdens en na de toepassing

Zorvec Enicade® kan worden ingezet ter voorkoming van aardappelziekte in aardappelen. Pas het product toe op een droog en gezond gewas. Al vanaf 20 minuten na aanbrengen is Zorvec Enicade® regenvast.

TOEPASSINGENAlgemeen

Verspuit gelijkmatig over het te behandelen oppervlak, met voldoende water zodat de planten vol worden geraakt. Om te voorkomen dat er stukken onbehandeld blijven of dat er te veel wordt aangebracht, is het nodig dat de spuitmachine in goede staat van onderhoud verkeert.

Aantal toepassingen

Het is toegestaan in totaal maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus uit te voeren, waarvan maximaal 3 achter elkaar.

Waterhoeveelheid

Zorvec Enicade® toepassen in een volume van 150-400 l water per ha. Bij een zeer dicht gewas is het aan te bevelen het hoogste watervolume te gebruiken om het gewas ook onderin voldoende te raken.

AARDAPPELENGebruik

Zorvec Enicade® kan worden ingezet ter voorkoming van aardappelziekte (*Phytophthora infestans*).

Dosering : Combineer 0,15 L/ha Zorvec Enicade® met het partnerproduct.

Voor de beste werking van Zorvec Enicade® + partnerproduct adviseren wij een blok van 3 bespuitingen met een verlengde spuitinterval in de snelle loofgroeifase.

Een verlengde spuitinterval betekent dat u de periode tussen 2 bespuitingen 3-4 dagen langer kunt oprekken dan dat u gewend was. Zijn de omstandigheden zodanig dat u met standaardmiddelen om de 7 dagen spuit, dan kunt u met Zorvec Enicade® + partnerproduct naar een interval van 10-11 dagen. Is de druk erg hoog en spuit u normaal op 5 dagen, dan kunt u met Zorvec Enicade® + het partnerproduct naar een interval van 8 tot 9 dagen.