

Voorspellings- en waarschuwingssystemen zijn zinvolle hulpmiddelen in het bepalen van het moment van de bespuitingen.

Dosering: 0,20 kg/ha

GEREEDMAKEN VAN DE SPUITVLOEISTOF

- Begin met een schone spuitmachine;
- Vul de tank voor een kwart met water en stel het roersysteem in werking.
- Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe.
- Vul de tank verder met water;
- Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking.
- Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden geleegd, schoongemaakt met water, en het spoelwater te worden toegevoegd aan de tank.

LET OP:

De verpakking hermetisch sluiten om het product in de beste condities te bewaren. Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk.

MENGINGEN

CURZATE® PARTNER kan met vele gangbare insecticiden, herbiciden en fungiciden in de aardappelteelt worden gemengd (inclusief minerale olie en uitvloeiers).

Bij het maken van mengingen eerst vaste formuleringen, daarna vloeibare formuleringen en tenslotte eventuele uitvloeiers toevoegen aan de tank.

Voor tankmengingen raadpleeg uw leverancier. Raadpleeg te allen tijde ook het etiket van de mengpartner.

DRIFTMANAGEMENT

Het overwaaien van spuitnevel (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten), naburige en/of nog te zaaien of planten gewassen moet worden voorkomen.

Spuut daarom bij rustig weer met weinig wind.

SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR
Het is van groot belang en tevens goed agrarisch gebruik om de apparatuur direct na de behandeling zorgvuldig schoon te maken.

1. Verdun de restvloeistof ca. 10 maal en verspuit deze op het behandelde perceel;
2. Vul de tank halfvol met water;
3. Het roersysteem in werking stellen en een aantal minuten laten inwerken;
4. Vervolgens dit mengsel verspuiten over het zojuist bespoten perceel;
5. Tenslotte de gehele machine (spuittank, spuitboom, leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen.

LET OP:

Vermijd verontreiniging van oppervlaktewater.

RESISTENTIE

Wanneer fungiciden met hetzelfde werkingsmechanisme verschillende jaren achter elkaar worden gebruikt in hetzelfde perceel, kunnen van nature voorkomende minder gevoelige stammen overleven, zich uitbreiden, en dominant worden in dit veld.

Om dit verschijnsel tegen te gaan is het goed om indien mogelijk afwisselend fungiciden te gebruiken met een verschillend werkingsmechanisme.

CURZATE® PARTNER mag alleen worden gebruikt in combinatie met een middel met een preventieve (contact) werking. Bij het gebruik van fungiciden dienen altijd de gebruiksvoorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen en een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze

gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **SGS**, **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) **+31 30 2748888 (alleen voor artsen)**.

BELANGRIJK

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.



K-42910/1911 - THE NETHERLANDS

Chargennummer / Productiedatum:



Curzate® Partner

FUNGICIDE/FONGICIDE

Fungicide voor de phytophthorabestrijding in aardappelen.

Water dispergeerbaar granulaat
Werkzame stof(fen): cymoxanil
Gehalte(n): 60%

Toelatingsnummer: 12755 N (W.1)

©™ Trademark of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

Production Agriscience Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht
Tel.: 0164-444 000 - Website: www.corteva.nl

Geproduceerd in EU

INHOUD: 1,5 KG e

Bij noodgevallen contacteer SGS, telefoonnummer **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) **+31 30 2748888 (alleen voor artsen)**.

OPSLAG: Vorstvrij, in originele goed gesloten verpakking bewaren. Opslagruimte goed ventileren. Niet nat laten worden.

GEBRUIKSAANWIJZING: zie etiket.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STORL
VERPAKKING

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.



WAARSCHUWING

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: cymoxanil

GEVARENAANDUIDINGEN

- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

- P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.
- P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.
- P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
aardappelen	aardappelziekte ²	0,2 kg/ha*	6	5	1

* toepassen in combinatie met een toegelaten middel met een preventieve werking.

² aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

Toepassingsvoorwaarden

Het middel dient in aardappelen toegepast te worden in een spuitvolume van 150 tot 400 liter water per hectare.

gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof cymoxanil. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamideoximen. De Frac code is 27. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die

ALGEMEEN

Werking
CURZATE® PARTNER bevat cymoxanil. Cymoxanil is een lokaal systemisch werkend fungicide met zowel een preventieve (beperkt) als curatieve werking. CURZATE® PARTNER is effectief tegen

gevoelige en phenylamide resistente isolaten van *Phytophthora infestans*.
CURZATE® PARTNER kan alleen worden gebruikt in combinatie met een middel met een preventieve (contact) werking.

Omstandigheden tijdens en na de toepassing
CURZATE® PARTNER kan veilig gebruikt worden in aardappelen.
Het middel dient te worden toegepast op een droog, gezond gewas.

Indien regen volgt binnen 2 uur na de toepassing, kan de werking verminderd worden. Daarna is CURZATE® PARTNER goed regenvast. Dit omdat de cymoxanil dan grotendeels in het gewas is opgenomen.

ZIEKTEN

Werkingspectrum

CURZATE® PARTNER kan ingezet worden voor de bestrijding van de aardappelziekte (*Phytophthora infestans*).

Stadium

CURZATE® PARTNER toepassen in combinatie met een toegelaten middel met een preventieve (contact) werking. Reeds aanwezige, zichtbare infecties worden niet afdoende bestreden.

TOEPASSINGEN

Algemeen

CURZATE® PARTNER moet homogeen worden

verdeeld. Het vereist een goed afgestelde spuitmachine om niet behandelde gedeelten en overdosering te vermijden.

Aantal toepassingen

Het is toegestaan in totaal maximaal 6 toepassingen uit te voeren per groeiseizoen. Het gewas dient voldoende beschermd te zijn totdat blad en stengel volledig zijn afgestorven.

Waterhoeveelheid

CURZATE® PARTNER dient in aardappelen toegepast te worden in een spuitvolume van 150 tot 400 liter water per hectare.

CONSUMPTIE-, POOT- en ZETMEELAARDAPPELEN

Toepassing ter voorkoming van *Phytophthora infestans*

CURZATE® PARTNER mag alleen worden geb-

ruikt in combinatie met een middel met een preventieve (contact) werking. Raadpleeg voor de dosering van dit middel het desbetreffende etiket.

CURZATE® PARTNER kan worden toegevoegd aan een middel met een preventieve (contact) werking wanneer curatieve of lokaal-systemische werking nodig is. Wanneer CURZATE® PARTNER in achtereenvolgende bespuitingen wordt ingezet mag het interval niet korter dan 5 dagen zijn. Zie ook het etiket van het preventieve (contact) middel.

In zijn algemeenheid hangt het tijdstip van de eerste bespuiting af van de ziektedruk (aanwezigheid van een bron), de weersomstandigheden, het ras en de ontwikkeling van het gewas. De eerste bespuiting kan al nodig zijn kort na opkomst van het gewas. Het gewas dient beschermd te zijn vanaf opkomst totdat het loof volledig is afgestorven.