

HIMALAYA® 60 SG

GROEIREGULATOR



Productnaam: Himalaya 60 SG
Toelatingsnummer: 15119 N - (W1)
Aard van het preparaat: Wateroplosbaar granulaat
Werkzame stof: Maleinehydrazide
Gehalte: 600 g/kg

Gevarenaanduidingen

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.


Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd

NL-FAZ-170-03a (0420)



Toelatingshouder:

Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.
Brooklands Farm, Cheltenham Road
EVESHAM, WR11 2LS Worcestershire
United Kingdom

Distributie door:

R. VAN WESEMAEL b.v.
Zoutestraat 109,
4561 TB Hulst,
Ned.
Tel. 0114-314853

5 Kg

 **Arysta**
LifeScience

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als anti spruitmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgj juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings- gebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Consumptieaardappel	Tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaring en tegengaan van aardappelopslag in het volggewas	5 kg/ha	1	21
Zetmeelaardappel				
Uien (m.u.v. eerstejaars plantui)	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	3,75 kg/ha ¹	1	14
Sjalotten				
Knoflook				

¹ toepassen met een uitvloeier

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt consumptieaardappel en zetmeelaardappel 350 tot 500 liter water per hectare toepassen, in de teelt van zaaiuien, zilveruien, picklers, 2e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook 500 tot 800 liter water per hectare toepassen.

Aanbevelingen

Algemeen

Zaaiuien, zilveruien, picklers, 2e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook

Dit middel dient door middel van een gewasbehandeling te velde te worden toegepast voor het tegengaan van spruitvorming bij zaaiuien, zilveruien, picklers, 2e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook. Daar het middel door het loof opgenomen moet worden, dient het na de bespuiting minimaal 10 uur droog te blijven om een goed effect te verkrijgen. Na behandeling kan de bewaarperiode zonder bezwaar met 1 à 2 maanden worden verlengd.

Consumptie- en zetmeelaardappelen

Dit middel remt na een gewasbehandeling de kieming van de geoogste aardappelen. De werkingsduur is afhankelijk van ras, jaar van toepassing en bewaaromstandigheden.

Een aanvullende behandeling met een ander toegelaten kiemremmingsmiddel kan noodzakelijk zijn; inspecteer daarom met regelmaat de aardappelen op kieming.

Toepassing van dit middel leidt ook tot vermindering van het aantal opslagplanten in het volggewas. Het effect is onder meer afhankelijk van het aardappelras en het jaar van toepassing. Om een voldoende bestrijding te verkrijgen kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te treffen.

Het meest geschikte toepassingsmoment is afhankelijk van:

- de maatsortering van de nieuw gevormde knollen; - de vitaliteit van het loof.

Alle knollen die op het moment van toepassen een diameter hebben van 25 mm of meer groeien uit, terwijl knollen met een diameter van kleiner dan 25 mm niet verder uitgroeien.

Het geschikte toepassingsmoment is daarom alleen te bepalen door een knolbemonstering uit te voeren.

Om een goede opname van het middel door het gewas te verkrijgen is het belangrijk dat het loof op het moment van toepassing nog groen en vitaal is en actief groeit.

Hoogstens mogen de onderste bladeren iets geel beginnen te verkleuren. Het loof moet vrij zijn van aantasting door ziekten en plagen.

Voor een goede opname dient de periode tussen het moment van toepassen en loofvernietiging minimaal 3 weken te zijn.

Regen of beregening binnen 24 uur na toepassing kan de werking verminderen.

Niet toepassen bij temperaturen hoger dan 25°C.

Niet mengen met andere producten of uitvloeiers.

Toepassingen

Zaaiuien, zilveruien, picklers, 2e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook, voor het tegengaan van spruitvorming.

Het toepassen van dit middel dient op het eind van de groeiperiode plaats te vinden. Het meest geschikte tijdstip van toepassing is het moment dat het vroegst gestreken loof nog geheel groen is.

Als regel ligt dit tijdstip 4 à 5 weken voor het rooien.

Dosering: 3,75 kg per ha toepassen in tenminste 500 liter water + 0,15 liter uitvloeier

Consumptie- en zetmeelaardappelen, voor het tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaring en het tegengaan van aardappelopslag in het volggewas.

Een eenmalige gewasbehandeling uitvoeren.

Dosering: 5 kg per ha toepassen in 350 tot 500 liter water per hectare.

Opmerkingen

Niet mengen met andere bestrijdingsmiddelen.

Uitsluitend toepassen op een gezond gewas.

Toepassen op zaaiuien is zinvol wanneer bewaring tot in het voorjaar zal plaatsvinden.

Ondanks de behandeling de uien niet afgestaart bewaren.

Het middel mag niet worden toegepast op pootaardappelen.

Na de bespuiting de spuitank en het spuitmateriaal grondig schoonmaken.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de —na zorgvuldig onderzoek— opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Arysta LifeScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Arysta LifeScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

