

Dicophar SL

Toelatingsnummer: 14852 N W1

Aard van het preparaat: met water mengbaar concentraat (SL)

Werkzame Stoffen en Gehalte:

MCPA70 G/L

2,4-D70 G/L

dicamba20 G/L

mecoprop-P 42 G/L

Gevarenaanduidingen:

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (zie ook de STORL informatie).

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Waarschuwing

!

AANBEVELINGEN
Algemeen:
Dicophar SL is een combinatie van 4 bladherbiciden met systemische werking. Het wordt vooral opgenomen via het blad maar ook deels door de wortels. Dicophar SL is uitermate geschikt voor het bestrijden van breedbladige onkruiden zoals dovenetel, herderstasje, akkervergeet-mij-nietje, ridderzuring, gewone brunel, ereprijs, paardenbloem, kruipende boterbloem, madeliefje, duizendblad, valse kamille en witte klaver. Grassen worden niet bestreden. De onkruiden worden zowel in een jong als in een iets ouder stadium bestreden.

Toepassingen:
Het beste resultaat wordt verkregen bij toepassing op een droge vegetatie, bij groeizaam weer, als het onkruid voldoende blad heeft gevormd. Niet toepassen bij felle zonneschijn of als regen verwacht wordt kort na de toepassing (24 uur). Niet opnieuw toepassen wanneer onkruidvernietiging niet onmiddellijk zichtbaar is. Dit kan tot 3 weken duren. Niet spuiten kort vóór of kort na het maaien, een wachtperiode van een week aanhouden. Wacht 6-8 weken na toepassing alvorens opnieuw in te zaaien. Behandeld gras mag niet worden gevoerd aan het vee. Dicophar SL heeft een 3 maanden lange werking.

Dosering:
- met behulp van een rugspuit/veldspuit: 75 ml Dicophar SL in 10 l water / 100 m2
- met behulp van een gieter (met medium sproeiroos): 7.5 ml Dicophar SL in 10 l water / 10 m2
Gebruik een rugspuit/veldspuit voor een optimale toepassing.
Goed schudden vóór gebruik.

DICOPHAR SL

HERBICIDE

Toelatingsnummer:

14852 N W1

Chargenr.: zie verpakking

Inhoud: 5L e

STORL

VERPAKKING

BEDRIJFS-AFVAL

DEZE VERPAKKING IS BEDRIJFSAFVAL, MITS DEZE IS SCHOONGESPOELD ZOALS WETTELIJK IS VOORGESCHREVEN.

8 717185 529562 >

WESEMAEL

NL-DIC-002-03 (0220)

5L e

Toelatingshouder:

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Rue de Renory 26/1

B-4102 Ougrée België

Tel. No.: 0031-850657366

www.arysta.nl

24-uurs noodtelefoon nee.

+44 (0) 1235 239670

Batch No. en productie datum:

zie verpakking

VERKOOP:

R. VAN WESEMAEL b.v.

ZOUTESTRAAT 109, 4561 TB HULST (Ned.)

TELEFOON 0114-314 853

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens-Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:				
Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Sportveld	Spuiten of gieten over het gewas	breedbladige onkruiden	7,5 L/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Overige toepassingsvoorwaarden
Het middel toepassen in 1000 liter water per ha.

Het middel kan op zijn vroegst 6 maanden na het opkomen van het gras worden gespoten of gegoten.

Na het toepassen van het middel op sportvelden mogen de sportvelden 48 uur (2 dagen) niet betreden worden.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Het middel toepassen in de periode april-september.
Om het grondwater te beschermen mag dit product in september niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing van dit middel uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een afstand van tenminste 300 centimeter waarin geen bespuiting mag plaatsvinden, gemeten vanaf de rand van de grasmat tot aan de zone waar zich niet-doelwitplanten bevinden;
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een afstand van tenminste 150 centimeter waarin geen bespuiting mag plaatsvinden, gemeten vanaf de rand van de grasmat tot aan de zone waar zich niet-doelwitplanten bevinden;
- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een afstand van tenminste 125 centimeter waarin geen bespuiting mag plaatsvinden, gemeten vanaf de rand van de grasmat tot aan de zone waar zich niet-doelwitplanten bevinden;
- een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5.