



Registratiehouder/Distributeur:

Arysta LifeScience Benelux Sprl
Rue De Renory 26/1
B-4102 Ougree
België
Tel. No.: 0850657366
www.arysta.nl

Chargennummer: zie verpakking



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

merk van Arysta LifeScience Benelux Sprl.

NL-PRC-017-02 (0119)

Inhoud: 5L e

FUNGICIDE



AXIDOR

Naam van het middel: AXIDOR
Toelatingsnummer: 15644 N
Werkzame Stoffen: Propamocarb hydrochloride
Cymoxanil
Gehalte: 400 g/l respectievelijk 50 g/l
Formulering: Suspensie Concentraat

Gevarenaanduidingen

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de —na zorgvuldig onderzoek — opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Arysta LifeScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Arysta LifeScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgj juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Het gebruik in de teelt van bloemisterijgewassen, rozen (boomkwekerij), sierheesters en vaste planten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

WAARSCHUWING



Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	valse meeldauw ² taksterfte ³	2 L/ha 2.5 L/ha	6	9 11	-
Laanbomen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ² Taksterfte ³	2 L/ha	6	9	-
Rozen (boomkwekerij, onbedekte teelt)	valse meeldauw ² taksterfte ³	2 L/ha 2.5 L/ha	6	9 11	-
Coniferen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ² Taksterfte ³	2 L/ha	6	9	-
Sierheesters (onbedekte teelt)	valse meeldauw ² taksterfte ³	2 L/ha 2.5 L/ha	6	9 11	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ² Taksterfte ³	2 L/ha	6	9	-
Vruchtbomen- en struiken (boomkwekerijgewas, onbedekte teelt)	Valse meeldauw ² Taksterfte ³	2 L/ha	6	9	-
Vaste planten (onbedekte teelt)	valse meeldauw ² taksterfte ³	2 L/ha 2.5 L/ha	6	9 11	-

² valse meeldauw (*Peronospora* spp.)

³ taksterfte (*Phytophthora citricola*, *Phytophthora cactorum*, *Phytophthora syringae*, *Phytophthora ilicis*)

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van bloemisterijgewassen, rozen (boomkwekerij), sierheesters en vaste planten het middel toepassen in 200-400 liter water per ha. Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bloemisterijgewassen, rozen (boomkwekerij), sierheesters en vaste planten.

Voor veldtoepassingen in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, rozen (boomkwekerij), sierheesters en vaste planten is gebruik uitsluitend toegestaan middels neerwaartse toepassingen met behulp van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij op- en zijwaartse veldbespuitingen en toepassing met een handspuit.

Om zoogdieren te beschermen is de toepassing in de teelt van bloemisterijgewassen, rozen, sierheesters en vaste plantenteelt uitsluitend toegestaan wanneer de bodembedekking meer dan 70% is en in de teelt van laanbomen, coniferen, bos en haagplantsoen, vruchtbomen en struiken uitsluitend toegestaan wanneer de bodembedekking meer dan 60% is.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Om in het water levende organismen te beschermen mag het middel in de teelt van vruchtbomen en –struiken op het gehele perceel uitsluitend door middel van een neerwaartse bespuiting worden toegepast.

Reeds aanwezige, zichtbare infecties worden niet afdoende bestreden. Dit middel kan met name preventief worden ingezet aan het begin van het groeiseizoen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen cymoxanil en propamocarb. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamide-oximes, de FRAC code is 27. Propamocarb behoort tot de carbamaten, de FRAC code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.