



PROPLANT®

FUNGICIDE



Toelatingshouder:

Arysta LifeScience Benelux Spri
Rue De Renory 26/1
B-4102 Ougree
België
Tel. No.: 085-071 23 00

VERKOOP:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda.
085-0712300
www.upl-ltd.com/nl

Chargennummer: zie verpakking



www.agrirecover.eu

Verpakking niet hergebruiken.
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits
deze is schoongespoeld, zoals wettelijk
is voorgeschreven.



INHOUD : 5L e

Proplant is een handelsmerk van Arysta LifeScience Benelux Spri.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toe- passing	Maximaal aantal toe- passinge n per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassin- gen in dagen	Veiligheid- stermijn in dagen
Sla m.u.v. veldsla (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹	1,5 L/ha	10 (2 per teeltcyclus)	10	14
Sla m.u.v. veldsla (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹	1,5 L/ha	6 (2 per teeltcyclus)	10	7
Aubergine, paprika en tomaat (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot/ wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Courgettes incl. patisson (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot/ wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Komkommers (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot/ wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Meloen (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot/ wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Bolbloemen (bedekte teelt)	Dompelbehandeling **	Zachtrot/ wortelrot ^{2,3}	0,3% (300 ml middel per 100 L water)	1	-	-

Bloemisterijge- wassen (bedekte teelt)	Potgrond behandeling	Voetrot/ wortelrot ^{2,3}	300 ml middel in 10 L water per m ³ potgrond	1	-	
	Grondbehandeling na zaaien, stekken, vers- penen of oppotten	Voetrot/ wortelrot ^{2,3}	5-10 ml middel in 3-6 L water per m ²	2	14	-
	Aangietbehandeling in pot	Voetrot/ wortelrot ^{2,3}	0,15% (150 ml middel per 100 L water); 100 ml per pot met diameter van 10-11 cm	1	-	-
	Druppelbehandeling (grond of substraat)	Voetrot/ wortelrot ^{2,3}	1-2 L middel per ha (20.000 platen)	2	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** 20-30 minuten dompelen

¹ Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

² Voetrot, wortelrot (*Pythium* spp.)

³ Voetrot, wortelrot (*Phytophthora* spp.)

Het gebruik in de teelt van aardbei (opkweek en vermeerderingsteelt) en de bedekte teelt van bolbloemen en knolbloemen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toe- passingen per teeltcy- clus of per 12 maanden	Minimum interval tussen to- epassin- gen in dagen	Veili- gheds termijn in dagen
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	Toevoegen aan proceswater	Voetrot/ wortelrot ^{2,3}	0,035% (35 ml/100L water)	1 per 12 maanden	-	-
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte teelt)	Dompelbehandeling	Wortelrot ^{2,3} , Stengelbasisrot ⁴ , Roodwortelrot ⁵	0,3% (300 ml middel per 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-
	Aangietbehandeling		0,15% (150 ml middel per 100 L water); 4,425 L middel per ha	1 per 12 maanden	-	-
	Druppelbehandeling		2 L/ha	4 per 12 maanden	7	-
	Gewasbehandeling		1,5 L/ha	10 per 12 maanden	10	-
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	Wortelrot ^{2,3} , Stengelbasisrot ⁴ , Roodwortelrot ⁵	1,5 L/ha	1 per teeltcyclus	-	-
	Gewasbehandeling		1,5 L/ha	6 per 12 maanden	10	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

² Wortelrot (Pythium spp.)

³ Wortelrot (Phytophthora spp.)

⁴ Stengelbasisrot (Phytophthora cactorum)

⁵ Roodwortelrot (Phytophthora fragariae)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van sla het middel toepassen in 400-1500 L water/ha.

In de teelt van paprika, tomaat, aubergine, komkommer, courgette, pattison, meloen, het middel toepassen in 500-1500 L water/ha.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen.



PROPLANT®

FUNGICIDE



Toelatingshouder:

Arysta LifeScience Benelux Spri
Rue De Renory 26/1
B-4102 Ougree
België
Tel. No.: 085-071 23 00

VERKOOP:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda.
085-0712300
www.upl-ltd.com/nl

Chargennummer: zie verpakking



www.agrirecover.eu

Verpakking niet hergebruiken.
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits
deze is schoongespoeld, zoals wettelijk
is voorgeschreven.



INHOUD : 5L e

Proplant is een handelsmerk van Arysta LifeScience Benelux Spri.