

BALISTIK[®]

HERBICIDE

Toelatingsnummer: 15810 N (W.2)

Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat

Werkzame stof: clethodim

Gehalte: 120 g/L

Toelatingshouder:

Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Artix - BP 80, F-64150 Nogueres,
Frankrijk

Chargenummer and Productie Datum:

Zie opdruk verpakking

Distributeur:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda.
tel. nr: 085-0712300
www.upl-ltd.com/nl



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

NL 2641224 07-0524



INHOUD
5 L



Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst behandeling of behandeling na uitplanten in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgj juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2,5 L/ha	-	56
	Straatgras ¹	1-2 L/ha*				
	Kweek ²	2,5 L/ha				
Bieten	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,5 L/ha**	2	2,5 L/ha	7	56
	Eenjarige grasachtige onkruiden en stuifdek	1 L/ha	1		-	
	Straatgras ¹	1-2 L/ha*				
	Kweek ²	2,5 L/ha				
Winterkoolzaad	Eenjarige grasachtige onkruiden en graanopslag	1 L/ha	1	1 L/ha	-	120
Boon met peul (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-	30
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-	30
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	28
	Kweek ²	2 L/ha				
Wortelen (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	48
	Straatgras ¹	1-2 L/ha*				
	Kweek ²	2 L/ha				
Zaaiui (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	56
	Straatgras ¹	1-2 L/ha*				
	Kweek ²	2 L/ha				
Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	56
	Straatgras ¹	1-2 L/ha*				
	Kweek ²	2 L/ha				



Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	56
	Straatgras ¹	1-2 L/ha*				
	Kweek ²	2 L/ha				
Sjalotten (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	56
	Straatgras ¹	1-2 L/ha*				
	Kweek ²	2 L/ha				
Knoflook (onbedekte teelt)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1	2 L/ha	-	56
	Straatgras ¹	1-2 L/ha*				
	Kweek ²	2 L/ha				

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

*Dosering afhankelijk van het groeistadium van het onkruid.

** In Lage Dosering Systeem (LDS) in combinatie met toegelaten middelen.

¹ Straatgras (*Poa annua*)

² Kweek (*Elytrigia repens*)



Het gebruik in de onbedekte teelt van droog te oogsten erwten, droog te oogsten bonen incl. sojafoon, karwij (oliehoudende zaden), zonnebloem (oliehoudende zaden), vezelgewassen, lupine (groenbemester), afrikaantjes (groenbemers), witlof (pennenteelt), cichorei, aardbei (vermeerdering, wachtbed en productie), pastinaak, knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel, zilverui en picklers, maggi, engelwortel, bevernelwortel, wortelpeterselie, lelie, iris, dahlia, zantedeschia, hyacint, narcis, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en bij de veredelingscultuur, bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.



Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Droog te oogsten erwten	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	56
Droog te oogsten bonen incl. sojafoon	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	56
Karwij (oliehoudende zaden)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	120
Lijnzaad	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	-



Zonnebloem (oliehoudende zaden)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	100
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Vezelgewassen	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden en stuitdek	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Lupine (groenbemester)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Afrikaantjes (groenbemesters)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras ¹ en kweek ²	2 L/ha			
Witlof (pennenteelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2,5 L/ha per teeltcyclus	56
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2,5 L/ha			
Cichorei	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2,5 L/ha per teeltcyclus	56
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2,5 L/ha			
Aardbei vermeerdering en wachtbed (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Aardbei productie (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	30
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Pastinaak (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			



Knolraap (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Koolraap (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Aardpeer (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Japanse aardappel (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Rode biet (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Knolselderij (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Schorseneer (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	1 L/ha per teeltcyclus	48
Mierikswortel (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Zilverui (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	56
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Picklers (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	56
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			





Maggi (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Engelwortel (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Bevemelwortel (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Wortelpeterselie (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	48
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Lelie (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,5 L/ha ³	4 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus		-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*	1 per teeltcyclus		-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	2 L/ha	1 per teeltcyclus		-
Dahlia (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Narcis (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*	1 per teeltcyclus		-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	2 L/ha	1 per teeltcyclus		-
Zantedeschia (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Iris (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			

Hyacint (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*	1 per teeltcyclus		-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	2 L/ha	1 per teeltcyclus		-
Bloemisterijgewas- sen (onbedekte teelt)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Boomkwekeri- gewassen (grondge- bonden, onbedekte teelt)	Voor en na opkomst ³ , rijenbehan- deling	Straatgras ¹	2 L/ha	1 per 12 maanden	2 L/ha per 12 maanden	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per 12 maanden	2 L/ha per 12 maanden	-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			
Veredelingsteelt, bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemesters- gewassen, voederge- wassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap (onbedekte teelt)	Voor en na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 L/ha	1 per teeltcyclus	2 L/ha per teeltcyclus	-
		Straatgras ¹	1-2 L/ha*			
		Kweek ²	2 L/ha			

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

* Dosering afhankelijk van het groeistadium van het onkruid.

¹ Straatgras (*Poa annua*)

² Kweek (*Elytrigia repens*)

³ In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

4 Toepassing met gebruikmaking van afschermkappen om het gewas niet te raken

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van zonnebloem (oliehoudende zaden), vezelgewassen, lupine (groenbemester), witlof (pennenteelt) en cichorei het middel tegen straatgras toepassen in 150-240 liter water per ha.

In de teelt van droog te oogsten erwten, droog te oogsten bonen, soja-boon, pastinaak, knolraap, koolraap, aardpeer, japanse aardappel, rode biet en knolselderij het middel toepassen in 150-400 liter water per ha.

In de teelt van droog te oogsten erwten alleen toepassen tot BBCH 39 (voor de eerste bloemknoppen zichtbaar zijn).

In de teelt van droog te oogsten bonen m.u.v. soja-boon alleen toepassen tot BBCH 29 (voor de eerste bloemknoppen zichtbaar zijn).

In de teelt van soja-boon, aardpeer en Japanse aardappel en tegen straatgras in zonnebloem alleen toepassen tot BBCH 19 (9 bladeren ontvouwen). In de teelt van rode biet alleen toepassen tot BBCH 33 (30% bodembedekking door het gewas)

Behandeld lijnzaad niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.

Behandelde vezelgewassen niet voor dierlijke consumptie bestemmen.

Toepassing van het middel in karwij is alleen toegestaan voor productie van karwij als oliehoudend zaad (niet als kruidenzaadgewas).

Om niet tot de doelsorten behorende insecten/geleedpotigen en ter-
restrische planten te beschermen is toepassing van het middel met een
dosering groter dan 1 L/ha tot maximaal 2 L/ha, uitsluitend toegestaan
indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5, of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teelt-vrije zone van tenminste 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceel-grens), of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teelt-vrije zone van tenminste 225 centimeter (gemeten vanaf het midden



van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens), of

- een veldspuit met verlaagde spuitboom en luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen met druppelgrootte M met een tophoek van maximaal 90° en een kantdop van tenminste druppelgrootte M en een spuitdopafstand van 25 cm en spuitdophoogte van maximaal 30 cm, of
- een veldspuit met sleepdoeksysteem in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD 50% en een bijbehorende driftarme kantdop bij een spuitdophoogte van maximaal 20 cm, of
- een overkapte beddenspuit in combinatie met spuitdoppen van tenminste druppelgrootte M en een kantdop aan beide kanten van de spuit met tenminste druppelgrootte M, of
- een veldspuit met Hardi Twin Force luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD 75% en bijbehorende kantdop van tenminste DRD 75% bij een rijnsnelheid van maximaal 12 km/uur.

Alleen geldend voor de teelt van uien:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 125 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en terrestrische planten te beschermen is toepassing van het middel met een **dosering groter dan 2 L/ha** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5, of
- een veldspuit met verlaagde spuitboom en luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen met druppelgrootte M met een tophoek van maximaal 90° en een kantdop van tenminste druppelgrootte M en een spuitdopafstand van 25 cm en spuitdophoogte van maximaal 30 cm, of
- een overkapte beddenspuit in combinatie met spuitdoppen van tenminste druppelgrootte M en een kantdop aan beide kanten van de spuit met tenminste druppelgrootte M.

Met name de gewassen maïs en granen zijn zeer gevoelig voor de stof clethodim. Met deze gewassen in de directe nabijheid dient bij bespuiting van het te behandelen perceel elke mate van drift naar genoemde gewassen te worden vermeden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof clethodim. Clethodim behoort tot de Cyclohexanedionen. De HRAC code is A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Algemeen

De waterkwaliteit kan de bestrijding van grassen met Balistik beïnvloeden. Bij een pH>7 en/of een hardheid water >14 °DH raden we aan om een waterverbeteraar te gebruiken bij de toepassing van Balistik.

Niet mengen met andere herbiciden. Mengten met andere herbiciden kan de effectiviteit van Balistik beïnvloeden. Toepassen met een fijne druppel op een droog gewas in 200-400 liter spuitvloeistof per ha. Het is belangrijk dat het onkruid goed geraakt wordt.

De groei van onkruiden stopt binnen enkele dagen na de bespuiting. Afhankelijk van de weersomstandigheden en onkruiden is de werking 1-2 weken na toepassing zichtbaar en na 5 weken volledig voltooid

Attentie

Het gewas moet gezond en vitaal zijn.

Niet gemengd met andere middelen verspuiten, tenzij anders aangegeven.

Toepassingsmoment

Enjarige grassen, graan- en grasopslag en straatgras worden het beste bestreden vanaf 3 blad – (begin) uitstooling maar zijn gevoelig tot het eind van het uitstoolingsstadium. Gebruik voor groot straatgras (einde uitstooling) een dosering van 2 l/ha. Tegen kweek spuiten op het moment dat het onkruid 15-20 cm hoog is. Het gewas moet gezond en vitaal zijn.

Balistik niet toepassen wanneer nachtvorst verwacht wordt vanwege een verhoogde kans op schade aan het gewas.

Ook een hoge temperatuur boven de 25 graden Celsius vergroot de kans op schade aan het gewas bij toepassing Balistik. Niet toepassen op gewassen onder stress-omstandigheden.

Na toepassing moet het tenminste 1 uur droog weer blijven.

Toepassingsmoment voor specifieke teelten

Winterkoolzaad

Maximaal 1 liter toepassen in verband met gevoeligheid van dit gewas. Niet toepassen in perioden met verwachte (nacht) vorst en niet later dan 1 november. Toepassing kort voor een winterperiode met lage temperaturen kan namelijk een negatief effect hebben op de gewasontwikkeling in het voorjaar.

Erwt met peul (onbedekte teelt)

Maximaal 1 liter toepassen in verband met gevoeligheid van dit gewas.

Boon met peul (onbedekte teelt)

Maximaal 1 liter toepassen in verband met gevoeligheid van dit gewas.

Zantedeschia, Iris

Ervaringen in deze gewassen zijn nog beperkt.

Lelie (onbedekte teelt)

Volle dosering Balistik altijd apart toepassen en na volledige gewasstrekking. Bij LDS-toepassing (0,5l/ha) kan het middel toegevoegd worden aan de tankmix. Start de LDS-bespuiting zodra de grassen kiemen.

Hyacin (onbedekte teelt)

Toepassen na de bloei om bloemverkleuring te voorkomen op het veld.

Aardbeien onbedekte teelt (productie, vermeerdering en wachtbed)

Gebruik bij pas geplante aardbeien maximaal 1 l/ha Balistik.

Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) en vaste planten (onbedekte teelt)

Ervaringen met toepassing van dit middel zijn nog beperkt. Het verdient daarom aanbeveling, voor zover nog geen ervaring is opgedaan, door middel van een proefbe- spuiting vast te stellen of de te behandelen soorten en/of variëteiten het middel goed verdragen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert UPL om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.





De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van UPL zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat UPL in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

Vorstvrij, koel en droog bewaren.

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen:

Algemeen advies: Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).

Na inademing: Frisse lucht laten inademen. Slachtoffer laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.


Na contact met huid: Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.

Na contact met de ogen: Spoel met veel water gedurende 10 minuten.

Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Een arts raadplegen indien pijn en/of roodheid aanhouden.

Na inslikken: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.





BALISTIK[®]

HERBICIDE

Toelatingsnummer: 15810 N (W.2)

Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat

Werkzame stof: clethodim

Gehalte: 120 g/L

Toelatingshouder:

Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Artix - BP 80, F-64150 Nogueres,
Frankrijk

Chargennummer and Productie Datum:

Zie opdruk verpakking

Distributeur:

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda.
tel. nr: 085-0712300
www.upl-ltd.com/nl



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

NL 2641224 07-0524



INHOUD
5 L



