

Serifel

GROEP

BM 02

FUNGICIDE

Toelatingsnummer	15888 N
Wnr	W.2
Productgroep	Fungicide
Aard van het preparaat	Spruitpoeder
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600 (5,5 x 10 ¹⁰ CFU/g)

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:

Pictogram

-

Signaalwoord

-

Gevarenaanduidingen

-

Voorzorgsmaatregelen

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280 Draag beschermende handschoenen.
P284 Adembescherming dragen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.

Aanvullende etiketelementen

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH212 Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes gevormd worden. Stof niet inademen.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STORL

STORL_Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht.

Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Mond spoelen en daarna 200-300 ml water drinken.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering # middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbeien (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	5
Bessen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	5

Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 12 per 12 maanden	5
Sla; <i>Lactuca</i> spp. (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1 Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 70 per 12 maanden	5
Veldsla (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1 Sclerotinia *2	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 70 per 12 maanden	5
Rucola (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1 Sclerotinia *2	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 70 per 12 maanden	5
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Champignon (binnen)	Teeltbed-behandeling	Trichoderma *3	100 g in 11 liter water per 100 m ² teeltbed	1 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	-

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

*1 Grauwe schimmel (*Botrytis* spp.)

*2 Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia minor*)

*3 Trichoderma (*Trichoderma aggressivum*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering# middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Voederbiet	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *4	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Rogge	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *5	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

Triticale	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *5	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Spelt	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *5	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kanariezaad	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *5	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Haver	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *5	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Peulvruchten	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *5	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Oliehoudende zaden	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Vezelgewassen	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Groenbemesters	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Voedergewassen	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Witlof (pennenteelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6 Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Witlof (pennenteelt)	Voor opslag Pennenbehandeling, bij het inschuren	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Witlof (trekteelt)	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Cichorei	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6 Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Boekweit	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Hop	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1 Echte meeldauw *3	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Meekrap	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Miscanthus	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Olifantsgras	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Quinoa	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Wede	Gewasbehandeling	Spikkelziekte *13	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Wouw	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

Sorgum	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte *14	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Teff	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte *15	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Gierst	Gewasbehandeling	Rhizoctonia *19	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Russische paardenbloem	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Graszodenteelt	Gewasbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kweeper (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *9	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Mispel (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *9	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Aardbei (onbedekte teelt)	Aangietbehandeling	Stengelbasisrot *18	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Grondbehandeling	Stengelbasisrot *18	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Stengelbasisrot *18	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Aardbei (vermeerdering, onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *8	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *8	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Bessen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *9 Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Druif (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Braam- en framboos-achtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Vijg (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Verbruining *21	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kiwi (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Noten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *10 Bladvlekkenziekte *16	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Bladgroenten (bedekte opkweek)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1 Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	5
	Aangietbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Grondbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-

Bladgroenten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1 Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus 30 per 12 maanden	7
	Grondbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Bladgroenten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1 Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	5
	Grondbehandeling	Rattenkeutelziekte *2	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Peulgroenten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 20 per 12 maanden	7
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 18 per 12 maanden	5
	Druppelbehandeling	Pythium *20	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus, 3 per 12 maanden	-
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> niet eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
	Druppelbehandeling	Pythium *20	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Augurk (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
	Aangietbehandeling	Pythium *20	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Pythium *20	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Courgette (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 20 per 12 maanden	7
	Aangietbehandeling	Pythium *20	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus, 2 per 12 maanden	-
	Druppelbehandeling	Pythium *20	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus, 2 per 12 maanden	-
Pompoen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
	Aangietbehandeling	Pythium *20	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Pythium *20	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Meloen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

	Aangietbehandeling	Pythium *20	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Druppelbehandeling	Pythium *20	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Vruchtgroenten van <i>Malvaceae</i> (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus,	5
	Druppelbehandeling	Pythium *20	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Koolgewassen (bedekte opkweek)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6 Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 70 per 12 maanden	5
	Aangietbehandeling	Zwarte pootjes *23	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Grondbehandeling	Zwarte pootjes *23	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6 Spikkelziekte *13	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	7
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6 Spikkelziekte *13	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 20 per 12 maanden	7
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6 Spikkelziekte *13	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 20 per 12 maanden	7
Stengelkool (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6 Spikkelziekte *13	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 20 per 12 maanden	7
Radijs-achtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Spikkelziekte *13	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	7
	Grondbehandeling	Zwarte pootjes *23	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Radijs-achtigen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Spikkelziekte *13	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 48 per 12 maanden	5
	Grondbehandeling	Zwarte pootjes *23	0,5 kg/ha	1 per teeltseizoen	-
Wortelgewassen (Umbelliferae) m.u.v. wortel (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *11	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam	Gewasbehandeling	Grauw schimmels *1 Spikkelziekte *13	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

(onbedekte teelt)					
Ui-achtigen m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte *17	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Eerste jaarsplantui (onbedekte teelt)	Plantgoedbehandeling	Koprot *26	0,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Asperge (opkweek en vermeerdering onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Asperge (onbedekt teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Bleekselderij (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kardoen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Rabarber (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Knolvenkel (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Prei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte *17	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Artisjok (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Zeekool (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Zeekraal (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6 Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *6 Grauwe schimmel *1	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus,	5
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur *22	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur *22	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur *22	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 42 per 12 maanden	5
Potplanten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Potplanten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

				70 per 12 maanden	
Snijbloemen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Snijbloemen (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus 70 per 12 maanden	7
Snijbloemen (bedekte, niet grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus 70 per 12 maanden	7
Trekheesters (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Snijgroen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Klimplanten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Coniferen inclusief kerstbomen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Heide soorten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Vruchtbomen- en struiken (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus,	5
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus	5
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, mais, granen,	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	10 per teeltcyclus	7

graszaadteelt (onbedekte teelt)					
Veredeling en zaadteelt (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *12	0,5 kg/ha	6 per teeltcyclus,	5
Champignon (binnen)	Substraatbehandeling ##	Trichoderma *27	100 g per 100 m2 teeltbed	1 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	-

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Toepassing met bijvoeding in substraat/compost

*1 Grauwe schimmel (*Botryotinia fuckeliana*)

*2 Rattenkeutelziekte (*Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia minor*)

*3 Echte meeldauw (*Podosphaera macularis*)

*4 Echte meeldauw (*Erysiphe betae*)

*5 Echte meeldauw (*Blumeria graminis*)

*6 Echte meeldauw (*Erysiphe cichoracearum*)

*7 Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

*8 Echte meeldauw (*Sphaerotheca macularis*)

*9 Echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uevea*)

*10 Echte meeldauw (*Phyllactinia guttata*)

*11 Echte meeldauw (*Erysiphe heracleii*, *Oidium spp*)

*12 Echte meeldauw (*Erysiphe spp*, *Oidium spp*, *Microsphaera spp*, *Podosphaera spp*, *Sphaerotheca spp*, *Unicula spp*)

*13 Spikkelziekte (*Alternaria brassicicola*)

*14 Bladvlekkenziekte (*Cercospora sorghi*)

*15 Bladvlekkenziekte (*Phoma sorghina*)

*16 Bladvlekkenziekte (*Gnomonia leptostyla*)

*17 Bladvlekkenziekte (*Alternaria porri*)

*18 Stengelbasisrot (*Phytophthora cactorum*, *Phytophthora fagariae*)

*19 Rhizoctonia/stengelrot (*Rhizoctonia solani*)

*20 Pythium soorten (*Pythium spp*)

*21 Verbruining (*Cladosporium herbarum*)

*22 Vuur (*Botrytis spp*)

*23 Zwarte pootjes (*Phoma lingam*)

*24 Schurft (*Phoma apiicola*)

*25 Stemphylium (*Stemphylium vesicarium*)

*26 Koprot (*Botrytis allii*)

*27 Trichoderma (*Trichoderma aggressivum*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Continu roeren tijdens gebruik.

In de onbedekte teelt van kweeper, mispel, steenvruchten, aardbei, braam-en framboosachtigen, vijg, kiwi en noten, het middel toepassen in 100-1000 liter water per ha.

In de bedekte teelt van koolgewassen, vruchtgroenten van Solanaceae, Curbitaceae, Malvaceae en de bedekte veredeling en zaadteelt het middel toepassen in 200-2000 liter water per ha.

In de bedekte teelt van potplanten, snijbloemen (grondgebonden en niet-grondgebonden) het middel toepassen in 150-400 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van bessen, bladgroenten, peulgroenten, augurk, courgette, pompoen, meloen, koolgewassen, radijsachtigen, wortel-en knolgewassen, ui-achtigen, stengelgroenten, kruidenteelt, sierteeltgewassen, het middel toepassen in 150-400 liter water per ha

In de bedekte teelt van bladgroenten, kruiden en sierteeltgewassen het middel toepassen in 200-1200 liter water per ha.

In de teelt van champignon (teeltbedbehandeling en substraatbehandeling) in totaal maximaal 1 toepassing per teeltcyclus en 10 toepassingen per 12 maanden toepassen.

Bevat *Bacillus amyloliquefaciens* stam MBI600. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Aanbevelingen

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Algemeen

Serifel niet in een tankmix combineren met mancozeb- of folpet bevattende middelen, omdat deze middelen de werking van Serifel negatief beïnvloeden, wanneer dit in een tankmix wordt gespoten. Wekelijks afwisselen met deze middelen is geen probleem.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.