

Geoxe, WG en aanbevelingen, 14414 N W.3

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings- gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Appel (onbedekte teelt)	Bewaarziekten ¹	0,04% (0,04 kg/100 Liter water)	0,45 kg/ha	2	7	3
Peer (onbedekte teelt)	Bewaarziekten ¹	0,04% (0,04 kg/100 Liter water)	0,45 kg/ha	2	7	3
Aardbei (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ²	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	3
Sla; <i>Lactuca spp.</i>	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7
Andijvie	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7
Veldsla	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7
Rucola	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7

Toepassings- gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Boon met peul (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	2	10	14
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	2	10	14
Aromatische kruidgewassen	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Bewaarziekten (*Botrytis cinerea*/*Botryotinia fuckeliana*, *Penicillium expansum*, *Monilia frutigena*, *Phlyctema vagabunda* (= *Gloeosporium*), *Nectria galligena*)

² Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

³ Rattenkeutelziekte (*Sclerotinia spp.*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In appel en peer het middel toepassen in maximaal 1125 liter water per ha.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

De gewasveiligheid van het middel in de wintermaanden is voor de bedekte teelten van sla (*Lactuca spp.*), andijvie, veldsla en rucola niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat het middel in de bedekte teelt van deze gewassen op grote schaal toegepast wordt.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof fludioxonil. Fludioxonil behoort tot Phenylpyrrolen. De Frac code is 12. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Aanbevelingen

Maatregelen ter voorkoming van oppervlaktewaterverontreiniging

“Gewasbeschermingsmiddelen horen niet thuis in water”

Om waterleven te beschermen en omdat oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding gebruikt kan worden is het van groot belang emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen. Syngenta raadt daarom aan de volgende maatregelen te nemen:

- Respecteer de verplichte maatregelen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) zoals de voorgeschreven driftreducerende maatregelen en teeltvrije zones.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl of www.activiteitenbesluitagrarisch.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.
- Sproeiapparatuur gebruikt in onbedekte teelten dient overdekt gestald te worden en gereinigd op een was- en spoelplaats met (vloeistofdichte) opvangmogelijkheid. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen, die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden, in een Heliosecc® (of gelijkwaardig alternatief) om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Algemeen

Het middel toepassen voordat symptomen zichtbaar zijn.