

WG en aanbevelingen Advion Kakkerlakken Gel NL-0004382-0000

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kakkerlakken door pleksgewijze toepassing en in naden en kieren zowel buitenshuis als binnenshuis in commerciële, industriële, openbare en residentiële gebouwen, in ziekenhuizen en in transportmiddelen (bus, trein, vliegtuig).

Restricties

- Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
- Gebruik het product alleen op locaties die niet toegankelijk zijn voor kinderen, huisdieren of niet-doelwit organismen.
- Om in het water levende organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat middelresten op het riool worden geloosd.
- Niet toepassen op plaatsen die in aanraking kunnen komen met voedsel of die regelmatig worden afgenomen met water (bijvoorbeeld badkamer- en keukenvloeren).
- Bij gebruik buitenshuis: niet toepassen in de buurt van waterafvoersystemen, ter bescherming van in water levende organismen
- Middelresten met papieren tissues opvegen en deze tissues afvoeren als chemisch afval.
- Niet toepassen op plaatsen waar de temperatuur boven de 50°C kan komen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen Advion® Kakkerlakken Gel is effectief tegen zowel het volwassen stadium als tegen de jongere stadia (= nymfen) van de kakkerlak. Met behulp van een speciaal doseerpistool (baitgun) kan de gel worden aangebracht op de te behandelen plekken, naden en kieren.

Toepassingen

1. Binnenshuis

- Vóór het gebruik van Advion® Kakkerlakken Gel moeten de schuilplaatsen en de populatiegrootte onderzocht worden.
- Om het bestrijdingseffect met lokaas te versnellen, is het noodzakelijk een goede hygiëne in acht te nemen, zodat - afgezien van het lokaas - zo weinig mogelijk voedsel voor de kakkerlakken beschikbaar is
- Advion® Kakkerlakken Gel moet worden aangebracht in de buurt van schuilplaatsen, looproutes en plaatsen waar veel kakkerlakken gezien worden.
- Advion® Kakkerlakken Gel niet aanbrengen op plaatsen waar water gebruikt wordt of mogelijkere wijze door routinematige reiniging wordt verwijderd.
- Tijdens het gebruik van Advion® Kakkerlakken Gel dienen geen andere insecticiden of insectwerende middelen toegepast te worden.
- Advion® Kakkerlakken Gel kan ook toegepast worden in lokdoosjes of iets dergelijks, zodat het product onbereikbaar is voor kinderen of huisdieren. Deze dienen te worden geplaatst op plekken waar kakkerlakken actief zijn.

2. Buitenshuis

- Gebruik Advion® Kakkerlakken Gel bij ingangsoeningen van gebouwen of mogelijke schuilplaatsen en plaatsen waar kakkerlakken veel gezien worden.
- Advion® Kakkerlakken Gel niet aanbrengen op plaatsen waar water gebruikt wordt of mogelijkere wijze door routinematige reiniging wordt verwijderd.
- Tijdens het gebruik van Advion® Kakkerlakken Gel dienen geen andere insecticiden of insectwerende middelen toegepast te worden.
- Advion® Kakkerlakken Gel kan ook toegepast worden in lokdoosjes of iets dergelijks, zodat het product onbereikbaar is voor kinderen of huisdieren. Deze dienen te worden geplaatst op plekken waar kakkerlakken actief zijn.

Dosering

- 2 tot 5 druppels met een diameter van 5 mm per vierkante meter afhankelijk van de grootte van de populatie.
- Een druppelgrootte van 5 mm diameter weegt ongeveer 0.1 g.
- Ga regelmatig de hoeveelheid aanwezige Advion® Kakkerlakken Gel na en vul aan waar nodig. Tijdens de gehele behandeling dient er gel aanwezig te zijn.
- Advion® Kakkerlakken Gel dient te worden toegepast in de vorm van kleine gel druppels. Meerdere kleine toedieningen in een bepaald gebied zijn effectiever dan 1 of 2 grotere toedieningen.

Gevarenaanduidingen

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

AANVULLENDE ETIKETVOORSCHRIFTEN

EUH208 Bevat indoxacarb. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Resistentie management

- Indien langdurige behandeling vereist is (>8 weken), afwisselen met een product met een ander werkingsmechanisme dan Indoxacarb.
- Meld aan de producent als er een vermoeden bestaat op afnemende werkzaamheid of aantrekkelijkheid van het middel.

Ten minste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum.

De kwaliteit van het product wordt door ons gegarandeerd. Aangezien bij de toepassing factoren een rol kunnen spelen waarover wij geen controle kunnen uitoefenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van het product.