



23_02012303_05 • 108031120-NL

Niet-selectief systemisch herbicide voor de bestrijding van overblijvende grassen, overblijvende tweezaadlobbige onkruiden en de meeste eenjarige onkruiden.

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 360 g/l glyfosaat

Toelatingsnummer: 13450 N (W.3.)

CATAMARAN

Toelatingsnummer: 13450 N (W.3.)

Werkzame stof: glyfosaat

Gehalte: 360 g/l

Formulering: met water mengbaar concentraat (SL)

Gevarenaanduidingen:

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



Toelatingshouder: Certis Belchim BV
Stadsplateau 16 • 3500 AP Utrecht
Tel.: +31 (0)30 200 1200 • www.certisbelchim.nl

152.0 mm

HERBICIDE

Inhoud:

20L

Chargennummer / Formuleringdatum:
zie verpakking

Aandachtig het etiket lezen alvorens
te gebruiken.



5 414572 011183 >

146.0 mm

* Gedeponiseerd handelsmerk van
Belchim Crop Protection NV/SA

121.0 mm

123.0 mm

125.0 mm

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

N.B. Certis Belchim B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen.

6

7

8



108031120-NL Niet-selectief systemisch herbicide voor de bestrijding van overblijvende grassen, overblijvende tweezaadlobbige onkruiden en de meeste eenjarige onkruiden.

- Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 360 g/l glyfosaat

Toelatingsnummer: 13450 N (W.3.)

CATAMARAN
Toelatingsnummer: 13450 N **W.3.**
Werkzame stof: glyfosaat
Gehalte: 360 g/l
Formulering: met water mengbaar
 concentraat (SL)



Gevarenaanduidingen:
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBICIDE

Inhoud:
20L

Chargennummer /
Formuleringsdatum: zie
verpakking

**Aandachtig het etiket lezen
alvorens te gebruiken.**



5 414572 011183 >

® Gedeponiseerd handelsmerk van
Belchim Crop Protection NV/SA



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Toelatingshouder:
Certis Belchim BV
Stadsplateau 16
3500 AP Utrecht
Tel.: +31 (0)30 200 1200
www.certisbelchim.nl

Cover

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel en middel voor de behandeling van stobben voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-gebied	Type toe-passing	Te bestrijden organisme	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toe-passing	Maximaal aantal toepassin-gen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Mini-mum interval tussen toepas-singen in dagen	Veiligheids-terminj in dagen
Akkerbouwgewas-sen Bloembol- en bloemknolgewas-sen (onbedekte teelt	Doods-puiten voor het planten of zaaien van het gewas	Dek-vruchten	2-3 L/ha ¹	3 L/ha	1 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-	-
Akkerbouwge-wassen Fruitgewassen Groenteteelt Kruidenteel Sierteltegewassen Cultuurgraslanden (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten ¹	Onkruiden	2% (200 ml in 10 liter water)	0,4 L/ha ¹	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-
Akkerbouwge-wassen Fruitgewassen Groenteteelt Kruidenteel Sierteltegewassen Cultuurgraslanden Openbaar groen en particuliere tuinen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs aanstrijken ²	Onkruiden	33% (1 liter in 2 liter water)	0,4 L/ha ¹	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-
Akkerbouwge-wassen Fruitgewassen Groenteteelt Kruidenteel Sierteltegewassen Cultuurgraslanden (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten	Gewassen uit fytosanitaire overweging op aanwijzing van de directeur van NPPO van NWWA, of rechtsopvolger	2% (200 ml in 10 liter water)	0,4 L/ha ¹	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-

Toepassings-gebied	Type toe-passing	Te bestrijden organisme	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toe-passing	Maximaal aantal toepassin-gen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Mini-mum interval tussen toepas-singen in dagen	Veiligheids-terminj in dagen
Aardappelen	Behandeling na het poten, voor opkomst	Onkruiden	2-6 L/ha ¹	6 L/ha	1 per teeltcyclus	6 L/ha per teeltcyclus	-	-
Bieten	Behandeling na het poten, voor opkomst	Onkruiden	2-6 L/ha ¹	6 L/ha	1 per teeltcyclus	6 L/ha per teeltcyclus	-	-
Droog te oogsten erwten	Pleksgewijs spuiten, kort voor oogst ⁵	Onkruiden	2-5 L/ha ¹	0,5 L/ha ³	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	7
Groenbemesters	Doods-puiten; over het gewas	Groenbemes-tergewassen	2-3 L/ha ¹	3 L/ha	1 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-	-
Fruitgewassen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	2 L/ha ³	1 per 12 maanden	2 L/ha per 12 maanden	-	-
Ui-achtigen (onbedekte teelt)	Behandeling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden	2-6 L/ha ¹	6 L/ha	1 per teeltcyclus	6 L/ha per teeltcyclus	-	-
Asperge (onbedekte teelt)	Behandeling voor opkomst	Onkruiden	2-6 L/ha ¹	6 L/ha	1 per 12 maanden	6 L/ha per 12 maanden	-	-
Sierteltegewassen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	2 L/ha ³	1 per 12 maanden	2 L/ha per 12 maanden	-	-
Bloembol- en bloemknolgewassen	Behandeling na het poten, voor opkomst	Onkruiden	2-6 L/ha ¹	6 L/ha	1 per teeltcyclus	6 L/ha per teeltcyclus	-	-

Toepassings-gebied	Type toe-passing	Te bestrijden organisme	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toe-passing	Maximaal aantal toepassin-gen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Mini-mum interval tussen toepas-singen in dagen	Veiligheids-terminj in dagen
Openbaar groen en particuliere tuinen	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	2 L/ha ³	1 per 12 maanden	2 L/ha per 12 maanden	-	-
Bosbouw	Pleksgewijs spuiten	Amerikaanse vogelkers ^a	1% (100 ml in 10 liter water)	0,4 L/ha ³	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-
Onbeteeld terrein	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	5% (500 ml in 10 liter water)	2 L/ha ³	1 per 12 maanden	2 L/ha per 12 maanden	-	-
Tijdelijk onbeteeld terrein m.a.v. akkerranden	Spuiten over het onkruid	Onkruiden	2-3 L/ha ¹	3 L/ha	1 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-	-
Open verharding	Spuiten over het onkruid ⁵	Onkruiden	2-3 L/ha ¹	3 L/ha	1 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-	-

- * Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
- ^a Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*)
- ¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid
- ² met behulp van "onkruidstrijkers", mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipt en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt
- ³ Dit is de totale dosering die per ha of per m² toegepast mag worden
- ⁵ Toepassen met handgedragen spuit met afschermkap.

Overige toepassingsvoorwaarden

Voor zilte teelten (lamsoor, zeekraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt in bassins.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is pleksgewijze toepassing met meteen handgedragen/handgetrokken spuitboom op gewassen uit fytosanitaire overweging en in de bosbouw uitsluitend toegestaan indien op het hele perceel gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen of een afschermkap.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing met standaard techniek op open verhardingen uitsluitend toegestaan indien op het hele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit ten minste de klasse DRT75).

Dit middel mag niet worden toegepast op onverhard terrein, halfopen en gesloten verhardingen.

Let op: In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.

Bereiding spuitvloeistof

- De tank half vullen met water, de roerinrichting starten, de juiste hoeveelheid middel toevoegen, en al roerend de tank verder vullen.
- Om schuimvorming te voorkomen de vulslang beneden het vloeistofniveau houden.

Eerstehulpmaatregelen

- Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- Na opname door de mond: Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.
- Na contact met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De huid met overvloedig water wassen.
- Na contact met de ogen: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.