

KENJA®

Toelatingsnummer: 16375 N W.1

FUNGICIDE

Toelatingshouder:

ISK BIOSCIENCES Europe N.V.

Pegasus Park - De Kleetlaan 12B

B-1831 Diegem - België

Tel.: +32 (0)2 627 86 11

In de handel gebracht door:

Certis Belchim B.V.

Stadsplateau 16

3500 AP Utrecht

Tel.: +31 (0)30 200 1200

KENJA

Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Werkzame stof: isofetamid

Gehalte: 400 g/L

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: -



Gevarenaanduidingen:

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Vorstvrij, koel en droog bewaren.

Chargennummer: zie opdruk verpakking.

BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen: Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Na opname door de mond: Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Water laten drinken. Niet laten braken. De patiënt in de buitenlucht brengen en warm en rustig houden. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Na contact met de huid: De huid wassen met zachte zeep en water. De huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Na contact met de ogen: Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts bellen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een pootgoedbehandeling (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Koolzaad	Sclerotienrot ¹	0,8 l/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Sclerotienrot (*sclerotinia* spp.)

Het gebruik in de onbedekte teelt van abrikoos en druif de in teelt van aardbei, sla (m.u.v. baby leaves), spinazie, snijbiet, postelein, basilicum, bieslook, dragon, kervel, peterselie, rozemarijn, salie, tijm, bladselderij en laurier is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Abrikoos (onbedekte teelt)	Tak- en bloesemsterfte ³	0,9 l/ha	2 per 12 maanden	9	-
Druif (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ²	1,5 l/ha	2 per 12 maanden	21	21
Aardbei	Grauwe schimmel ²	1,2 l/ha	2 per 12 maanden	7	1
Sla; <i>Lactuca</i> spp. m.u.v. baby leaves (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Sla; <i>Lactuca</i> spp. m.u.v. baby leaves (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Spinazie (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ²	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Snijbiet (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ²	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Postelein (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ²	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Spinazie (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ²	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Snijbiet (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ²	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Postelein (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ²	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Basilicum (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Bieslook (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Dragon (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Kervel (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Peterselie (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Rozemarijn (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Salie (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Tijm (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Bladselderij (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Laurier (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	21
Basilicum (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ¹	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Bieslook (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotiënrot ¹	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Dragon (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotiënrot ¹	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Kervel (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotiënrot ¹	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Peterselie (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotiënrot ¹	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Rozemarijn (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotiënrot ¹	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Salie (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotiënrot ¹	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Tijm (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotiënrot ¹	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Bladselderij (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotiënrot ¹	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21
Laurier (onbedekte teelt)	Grauwe schimmel ² , Sclerotiënrot ¹	1,0 l/ha	2 per 12 maanden	14	21

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Sclerotiënrot (*sclerotinia* spp.);

² grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*);

³ tak- en bloesemsterfte (*Monilinia laxa* en *Monilinia fructigena*).

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van koolzaad het middel toepassen van BBCH 60 tot 65 (begin bloei tot volle bloei).

In de teelt van abrikoos het middel toepassen van BBCH 57 tot 69 (kelkbladeren geopend, uiteinden van witte of roze kroonbladeren zichtbaar (bloemen nog gesloten) tot einde bloei).

In de teelt van druif het middel toepassen vanaf BBCH 61 (begin bloei).

In de teelt van aardbei het middel toepassen vanaf BBCH 60 (eerste bloemen open).

In de teelt van aardbei, sla (m.u.v. baby leaves), spinazie, snijbiet, postelein, basilicum, bieslook, dragon, kervel, peterselie, rozemarijn, salie, tijm, bladselderij en laurier het middel toepassen in 400 tot 800 liter water per ha.

In de teelt van abrikoos en druif het middel toepassen in 100 tot 800 liter water per ha.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof isofetamid. Isofetamid behoort tot de phenyl-oxo-ethyl thiophene amiden. De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

N.B. Certis Belchim B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen.