



**decis**  
protech

1 L

Insecticide



ARTIKELNR.: 85773437

Productnaam: Decis Protech

Werkzame stof: deltamethrin

Gehalte: 15 g/L

Toelatingsnummer: 15889 N - W3

Aard van het preparaat: emulsie, olie in water

#### Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Voorzorgsmaatregelen

P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval. Zie STORL

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

#### Aanvullende etiketelementen

EJH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1), alpha-N-hexylkaneelaldehyde en benzyl salicylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EJH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking.

Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.



WAARSCHUWING

UFI: 6Y90-V0U3-500E-JGNV

#### Werkingswijze

GROUP

3A

INSECTICIDE

**STORL**

VERPAKKING

Bedrijfsafval

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

UN 1993



NL86293579B



© is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep

Partijnummer/Productiedatum: zie separaat etiket

Bayer CropScience SA-NV  
Postbus 88  
2130 AB Hoofddorp  
Tel. 023-7991095

Bayer

## **Beschrijving van de eerste hulpmiddelen**

### **Algemeen advies:**

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

### **Inademing:**

In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts raadplegen (**die evt. contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)**).

### **Aanraking met de huid:**

Onmiddellijk met veel water en zeep gedurende minstens 15 minuten afwassen. Warm water kan de hevigheid van de irritatie/paresthesie subjectief verhogen. Dit is geen teken van een systemische vergiftiging. Bij huidirritatie een huidolie of huidlotion met Vitamine E gebruiken. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

### **Aanraking met de ogen:**

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten.

Warm water kan de hevigheid van de irritatie/paresthesie subjectief verhogen. Dit is geen teken van een systemische vergiftiging. Kalmerende oogdruppels, eventueel verdovende oogdruppels toedienen.

Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

### **Inslikken:**

Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten drinken. GEEN braken opwekken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

## **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

### **Verschijnselen:**

Plaatselijk: Kan bij huid- en oog-contact mogelijk ernstige paresthesie veroorzaken. Dit effect is van voorbijgaande aard en meestal binnen 24 uur verdwenen. Irritatie van huid, ogen en slijmvlies, Hoesten, proesten

Systemisch: onbehaaglijk gevoel in de borst, tachycardie, lage bloeddruk, Misselijkheid, Buikpijn, Diarree, Braken, Troebel zicht, Hoofdpijn, Anorexia, Somnolentie, Coma, Stuiptrekkingen, Sidderingen, Prostratie, Hyperreactie van de luchtwegen, Longoedeem, Hartklopping, Musculaire fasciculatie, Apathie, Duizeligheid

## **Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

### **Gevaren:**

Dit product bevat een pyrethroid. Een pyrethroid-vergiftiging moet anders behandeld worden als een of carbamaat- of organofosfaat-vergiftiging!

### **Behandeling:**

Systemische behandeling: Behandel symptomatisch. Bewaken: ademhaling en hartfunctie. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat **aanbevolen**. Ademhalingswegen vrijhouden. Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling. Bij krampen een benzodiazepine (bijv. diazepam) in standaard doseringen geven. Als dit niet werkzaam is, **phenobarbital** geven. Contra-indicatie: atropine. Contra-indicatie: adrenaline derivaten. Een specifiek tegengif is niet bekend. Herstel volgt doorgaans spontaan zonder gevolgen.

Bij huidirritatie een huidolie of huidlotion met Vitamine E gebruiken.

# WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

| Toepassingsgebied                                                         | Werkzaamheid getoetst op                                                                                | Dosering*<br>middel per toepassing | Maximale dosering<br>middel per toepassing | Maximaal aantal<br>toepassingen<br>per teeltcyclus<br>of per 12 maanden | Maximaal aantal liter mid-<br>del per ha per teeltcyclus<br>of per 12 maanden | Minimum interval<br>tussen toepas-<br>singen<br>in dagen | Veiligheidstermijn in dagen |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pootaardappel                                                             | Kevers <sup>1</sup>                                                                                     | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 1 per teeltcyclus                                                       | 1 L/ha per teeltcyclus                                                        | -                                                        | 7                           |
|                                                                           | Bladluis (aardappelbladrolvirus = PLRV-virus) <sup>2</sup><br>Bladluis <sup>4</sup>                     | 0,66 L/ha                          | 0,66 L/ha                                  | 1 per teeltcyclus                                                       |                                                                               | -                                                        |                             |
|                                                                           | Bladluis (Y-virus) <sup>3</sup> , Bladluis <sup>4</sup>                                                 | 0,33 L/ha                          | 0,33 L/ha                                  | 3 per teeltcyclus                                                       |                                                                               | 14                                                       |                             |
| Consumptie- en zetmeelaardappel                                           | Kevers <sup>1</sup>                                                                                     | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 1 per teeltcyclus                                                       | 1 L/ha per teeltcyclus                                                        | -                                                        | 7                           |
|                                                                           | Bladluis <sup>4</sup>                                                                                   | 0,33 L/ha                          | 0,33 L/ha                                  | 3 per teeltcyclus                                                       |                                                                               | -                                                        |                             |
| Bieten                                                                    | Trips <sup>5</sup> , rupsen <sup>6</sup>                                                                | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 1 per teeltcyclus                                                       | 0,5 L/ha per teeltcyclus                                                      | -                                                        | 30                          |
| Granen                                                                    | Bladluis <sup>7</sup>                                                                                   | 0,42 L/ha                          | 0,42 L/ha                                  | 2 per teeltcyclus                                                       | 0,84 L/ha per teeltcyclus                                                     | 14                                                       | 30                          |
| Peulvruchten m.u.v. lupine en sojaboon                                    | Bladrandkever <sup>9</sup> , Trips <sup>5,10,19</sup> , rupsen <sup>11</sup>                            | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 1 per teeltcyclus                                                       | 0,5 L/ha per teeltcyclus                                                      | -                                                        | 7                           |
| Veldboon (peulvrucht)                                                     | Bladrandkever <sup>9</sup> , Trips <sup>5,10,19</sup> , rupsen <sup>11</sup>                            | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 1 per teeltcyclus                                                       | 0,5 L/ha per teeltcyclus                                                      | -                                                        | 7                           |
| Karwij                                                                    | Rupsen <sup>15</sup>                                                                                    | 0,33 L/ha                          | 0,33 L/ha                                  | 1 per teeltcyclus                                                       | 0,33 L/ha per teeltcyclus                                                     | -                                                        | 45                          |
| Vlas (Lijnzaad en vezelvlas)                                              | Trips <sup>5,14,19</sup>                                                                                | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 1 per teeltcyclus                                                       | 0,5 L/ha per teeltcyclus                                                      | -                                                        | 60                          |
| Koolzaad                                                                  | Kevers <sup>16,17</sup>                                                                                 | 0,33 L/ha                          | 0,33 L/ha                                  | 1 per teeltcyclus                                                       | 0,33 L/ha per teeltcyclus                                                     | -                                                        | 45                          |
| Teff                                                                      | Bladluis <sup>7</sup>                                                                                   | 0,42 L/ha                          | 0,42 L/ha                                  | 2 per teeltcyclus                                                       | 0,84 L/ha per teeltcyclus                                                     | 14                                                       | 30                          |
| Cultuurgrasland                                                           | Vliegen en muggen <sup>12</sup>                                                                         | 0,42 L/ha                          | 0,42 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                        | 0,84 L/ha per 12 maanden                                                      | 14                                                       | 14                          |
| Aardbei (onbedekte teelt)                                                 | Trips <sup>5,14,19</sup> , rupsen <sup>6,20,21,22,23,24,34</sup> ,<br>aardbeibloesemkever <sup>25</sup> | 0,033% (33ml/100L<br>water)        | 0,2 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 0,4 L/ha per 12 maanden                                                       | 14                                                       | 3                           |
| Aardbei (bedekte teelt)                                                   | Trips <sup>5,14,19</sup> , rupsen <sup>6,20,21,22,23,24,34</sup> ,<br>aardbeibloesemkever <sup>25</sup> | 0,033% (33ml/100L<br>water)        | 0,33 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                        | 0,66 L/ha per 12 maanden                                                      | 14                                                       | 3                           |
| Aalbes (onbedekte teelt)                                                  | Rupsen <sup>20,21,22,23,24,26,27</sup> ,<br>wantsen <sup>29</sup>                                       | 0,033% (33ml/100L<br>water)        | 0,4 L/ha                                   | 2 per teeltcyclus                                                       | 0,8 L/ha per 12 maanden                                                       | 14                                                       | 7                           |
| Kruisbes (onbedekte teelt)                                                | Rupsen <sup>20,21,22,23,24,26,27</sup> ,<br>wantsen <sup>29</sup>                                       | 0,033% (33ml/100L<br>water)        | 0,4 L/ha                                   | 2 per teeltcyclus                                                       | 0,8 L/ha per 12 maanden                                                       | 14                                                       | 7                           |
| Braam (onbedekte teelt)                                                   | Aardbeibloesemkever <sup>25</sup>                                                                       | 0,033% (33ml/100L<br>water)        | 0,4 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 0,8 L/ha per 12 maanden                                                       | 14                                                       | 7                           |
| Framboos (onbedekte teelt)                                                | Aardbeibloesemkever <sup>25</sup>                                                                       | 0,033% (33ml/100L<br>water)        | 0,4 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 0,8 L/ha per 12 maanden                                                       | 14                                                       | 7                           |
| Sla ( <i>Lactuca</i> spp.) (onbedekte teelt)                              | Rupsen <sup>6,32,33,34</sup>                                                                            | 0,083% (83ml/100L<br>water)        | 0,66 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                        | 1,32 L/ha per 12 maanden                                                      | 7                                                        | 7                           |
| Sla ( <i>Lactuca</i> spp.) (bedekte teelt)                                | Rupsen <sup>6,32,33,34</sup>                                                                            | 0,083% (83ml/100L<br>water)        | 0,83 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                        | 1,66 L/ha per 12 maanden                                                      | 7                                                        | 14                          |
| Peulgroenten incl. edamame (onbedekte teelt)                              | Bladrandkever <sup>9</sup> , Trips <sup>5,10,19</sup> , rupsen <sup>11</sup>                            | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 1 per 12 maanden                                                        | 0,5 L/ha per 12 maanden                                                       | -                                                        | 7                           |
| Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt) | Rupsen <sup>6,33,35</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , trips <sup>19</sup>                              | 0,083% (83ml/100L<br>water)        | 1,17 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                                        | 3,5 L/ha per 12 maanden                                                       | 7                                                        | 3                           |
| Meloen (bedekte teelt)                                                    | Rupsen <sup>6,33,35</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , trips <sup>19</sup>                              | 0,083% (83ml/100L<br>water)        | 1,17 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                                        | 3,5 L/ha per 12 maanden                                                       | 7                                                        | 3                           |

| Toepassingsgebied                                   | Werkzaamheid getoetst op                                                                                                                                                                                    | Dosering*<br>middel per toepassing | Maximale dosering<br>middel per toepassing | Maximaal aantal<br>toepassingen<br>per teeltcyclus<br>of per 12 maanden | Maximaal aantal liter mid-<br>del per ha per teeltcyclus<br>of per 12 maanden | Minimum interval<br>tussen toepas-<br>singen<br>in dagen                     | Veiligheidstermijn in dagen |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Aubergine (bedekte teelt)                           | Rupsen <sup>6,33,35</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , trips <sup>19</sup>                                                                                                                                  | 0,083% (83ml/100L<br>water)        | 1,17 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                                        | 3,5 L/ha per 12 maanden                                                       | 7                                                                            | 3                           |
| Tomaat (bedekte teelt)                              | Rupsen <sup>6,33,35</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , trips <sup>19</sup>                                                                                                                                  | 0,083% (83ml/100L<br>water)        | 0,83 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                                        | 2,5 L/ha per 12 maanden                                                       | 7                                                                            | 3                           |
| Paprika (bedekte teelt)                             | Rupsen <sup>6,33,35</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> , trips <sup>19</sup>                                                                                                                                  | 0,083% (83ml/100L<br>water)        | 1,17 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                                        | 3,5 L/ha per 12 maanden                                                       | 7                                                                            | 3                           |
| Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)                 | Rupsen <sup>6,32,35,37,38</sup>                                                                                                                                                                             | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 1 L/ha per 12 maanden                                                         | 7                                                                            | 7                           |
| Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)                 | Rupsen <sup>6,32,35,37,38</sup>                                                                                                                                                                             | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 1 L/ha per 12 maanden                                                         | 14                                                                           | 7                           |
| Koolrabi (onbedekte teelt)                          | Rupsen <sup>6,32,35,37,38</sup>                                                                                                                                                                             | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 1 L/ha per 12 maanden                                                         | 14                                                                           | 7                           |
| Radijs-achtigen (onbedekte teelt)                   | Rupsen <sup>6</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>                                                                                                                                                           | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 1 L/ha per 12 maanden                                                         | 14                                                                           | 7                           |
| Knolraap (onbedekte teelt)                          | Rupsen <sup>6</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>                                                                                                                                                           | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 1 L/ha per 12 maanden                                                         | 14                                                                           | 7                           |
| Koolraap (onbedekte teelt)                          | Rupsen <sup>6</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>                                                                                                                                                           | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 1 L/ha per 12 maanden                                                         | 14                                                                           | 7                           |
| Ui-achtigen m.u.v. bosuien (onbedekte teelt)        | Preimot <sup>39</sup> , mineervlieg <sup>40</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>                                                                                                                             | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 1 L/ha per 12 maanden                                                         | 14                                                                           | 7                           |
| Asperge (onbedekte teelt)                           | Kevers <sup>41</sup> , vliegen en muggen <sup>42</sup>                                                                                                                                                      | 0,5 L/ha na de oogst               | 0,5 L/ha                                   | 1 per 12 maanden                                                        | 0,5 L/ha per 12 maanden                                                       | -                                                                            | -                           |
| Prei (onbedekte teelt)                              | Preimot <sup>39</sup> , mineervlieg <sup>40</sup> , trips <sup>5,10,14,19</sup>                                                                                                                             | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 1 L/ha per 12 maanden                                                         | 14                                                                           | 7                           |
| Eetbare paddenstoelen                               | Vliegen en muggen <sup>43,44</sup>                                                                                                                                                                          | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                        | 1 L/ha                                                                        | 14 (3 dagen voor<br>de eerste vlucht<br>en 3 dagen voor<br>de tweede vlucht) | 3                           |
| Bloembol- en bloemknolgewassen<br>(onbedekte teelt) | Dopluis <sup>45</sup> , schildluis <sup>46</sup>                                                                                                                                                            | 0,083% (83ml/100L<br>water)        | 0,33 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                        | 0,66 L/ha                                                                     | 7                                                                            | -                           |
| Gladiol (onbedekte teelt)                           | Thrips <sup>47</sup>                                                                                                                                                                                        | 0,5 L/ha                           | 0,5 L/ha                                   | 1 per 12 maanden                                                        | 0,5 L/ha                                                                      | -                                                                            | -                           |
| Tulp, hyacint en lillie (onbedekte teelt)           | Bladluis (virus) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                               | 0,67                               | 0,67 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                        | 1,34 L/ha                                                                     | 7                                                                            | -                           |
| Bloembol- en bloemknolgewassen<br>(bedekte teelt)   | Rupsen <sup>6,32,33,34,35,49,50,51,52,53,54,55,56</sup> ,<br>mineervlieg <sup>37,40</sup> , trips <sup>5,10,14,19,47</sup> , wittevlieg <sup>36</sup> ,<br>dopluis <sup>45</sup> , schildluis <sup>46</sup> | 0,083% (83ml/100L<br>water)        | 0,83 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                                        | 2,5 L/ha per 12 maanden                                                       | 7                                                                            | -                           |
| Bloemsterrijgewassen<br>(bedekte teelt)             | Rupsen <sup>6,32,33,35</sup> , mineervlieg <sup>37,40</sup> , trips <sup>5,10,14,19,47</sup> ,<br>wittevlieg <sup>36</sup> , dopluis <sup>45</sup> , schildluis <sup>46</sup>                               | 0,083% (83ml/100L<br>water)        | 0,83 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                                        | 2,5 L/ha per 12 maanden                                                       | 7                                                                            | -                           |
| Boomkwekerijgewassen<br>(bedekte teelt)             | Rupsen <sup>6,32,33,34,35,49,50,51,52,53,54,55,56</sup> ,<br>trips <sup>5,10,14,19</sup>                                                                                                                    | 0,033% (33ml/100L<br>water)        | 0,25 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                                        | 0,75 L/ha per 12 maanden                                                      | 7                                                                            | -                           |
| Vaste plantenteelt<br>(bedekte teelt)               | Rupsen <sup>6,32,33,35</sup> , mineervlieg <sup>37,40</sup> , trips <sup>5,10,14,19,47</sup> ,<br>wittevlieg <sup>36</sup> , dopluis <sup>45</sup> , schildluis <sup>46</sup>                               | 0,083% (83ml/100L<br>water)        | 0,83 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                                        | 2,5 L/ha per 12 maanden                                                       | 7                                                                            | -                           |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.  
Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

- 2) Colorado kever (*Leptinotarsa decemlineata*)
- 3) Bladluus ter voorkoming van persistent virus
- 4) Bladluus ter voorkoming van non persistent virus
- 5) Aardappeltopluus (*Macrosiphum euphorbia*)
- 6) Vroege akkertrips (*Thrips angusticeps*)
- 7) Gamma uil (*Autographa gamma*)
- 8) Grote graanluus (*Sitobion avenae*), Vogelkersluus (*Rhopalosiphum padi*), Roos-grasluus (*Metopolophium dirhodum*)
- 9) Bladrandkever (*Sitona lineatus*)
- 10) Erwtentrips (*Katathrips robustus*)
- 11) Erwtentopluus (*Laspeyresia nigricana*)
- 12) Rouwvlies (*Bibio marci*, *Bibio hortulanus*, *Dilophos febrilis*)
- 13) Vlas trips (*Thrips linarius*)
- 14) Karwijmot (*Depressaria daucella*)
- 15) Koolzaadglanskever (*Meligethes aeneus*)
- 16) Koolzaadsnuitkever (*Ceuthorrhynchus assimilis*)
- 17) Tabakstrips (*Thrips tabaci*)

- 20) Anjerbladroller (*Cacoecimorpha pronubana*)
- 21) Azalea bladroller (*Acleris laterana*)
- 22) Brandnetelbladroller (*Olethreutes lacunana*)
- 23) Koolbladroller (*Clepsis spectrana*)
- 24) Agatvlinder (*Phlogophora meticulosa*)
- 25) Aardbeibloesemkever (*Anthonomus rubi*)
- 26) Vruuchtbladroller (*Adoxophyes orana*)
- 27) Wintervlinder (*Operopthera brumata*)
- 28) Groene appelwants (*Lygus pabulinus*)
- 29) Koolwitje (*Pieris spp.*)
- 30) Groente-uil (*Polia oleacea*)
- 31) Koolmotje (*Plutella xylostella*)
- 32) Turkse mot (*Chrysodeixis chalcites*)
- 33) Koolwittevlies (*Aleyrodes proletella*)
- 34) Bladminderders (*Liriomyza trifolii*, *L. huijbrensis*, *L. bryoniae*)
- 35) Late koolmot (*Evergestis forvi-calis*)
- 36) Preimot (*Acrolepiops assectella*)
- 37) Uienmineervlieg (*Liriomyza cepae*)
- 38) Aspergekever (*Crioceris asparagi*)
- 39) Aspergevlies (*Platyparea poeciloptera*)
- 40) Champignonvlies (*Megaselia halterata*)
- 41) Varenrouwmug (*Sciaridae*)
- 42) Dopluizen (*Coccidae*)
- 43) Schildluizen (*Coccidae*)
- 44) Gladiolentrips (*Thaeniothrips simplex*)
- 45) Wintervlinder (*Operopthera brumata*)
- 46) Bastaardsatijnvlinder (*Euproctis chrysorrhoea*)
- 47) Ringelrupsvlinder (*Malacosoma Neustria*)
- 48) Satijnvlinder (*Leucoma salicis*)
- 49) Stoppel en spinel motten (*Yponomeura spp.*)
- 50) Plakker (*Lymantria dispar*)
- 51) Jeneverbesmineermot (*Argyresthia trifasciata*)
- 52) Kastanjemineermot (*Cameraria ohridella*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxici-teitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassingsgebied                                   | Type toepassing  | Werkzaamheid aannemelijk tegen                                             | Dosering* middel per toepassing | Maximale dosering middel per toepassing | Maximaal aantal toepas-singen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidstermijn in dagen |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Mais                                                | Gewasbehandeling | Rupsen <sup>57</sup>                                                       | 0,5 L/ha                        | 0,5 L/ha                                | 1 per 12 maanden                                                |                                               | 30                          |
| Lupine, veldboon (peulvrucht en voedergras)         | Gewasbehandeling | Trips <sup>19</sup> , Kevers <sup>8</sup> , Rupsen <sup>11</sup>           | 0,5 L/ha                        | 0,5 L/ha                                | 1 per 12 maanden                                                |                                               | 7                           |
| Graszaadteelt m.u.v. Engels raigras                 | Gewasbehandeling | Vliegen en muggen <sup>59</sup>                                            | 0,42 L/ha                       | 0,42 L/ha                               | 2 per 12 maanden                                                | 14                                            | 14                          |
| Blauwmaanzaad, Mosterd, Teunisbloem, Huttentut      | Gewasbehandeling | Sikkelmotten <sup>60</sup>                                                 | 0,33 L/ha                       | 0,33 L/ha                               | 1 per 12 maanden                                                |                                               | 60                          |
| Vezelgewassen                                       | Gewasbehandeling | Trips <sup>61</sup>                                                        | 0,5 L/ha                        | 0,5 L/ha                                | 1 per 12 maanden                                                |                                               | 60                          |
| Witlof (pennenteelt)                                | Gewasbehandeling | Vliegen en muggen <sup>62</sup>                                            | 0,5 L/ha                        | 0,5 L/ha                                | 2 per 12 maanden                                                | 14                                            | 14                          |
| Chicorei                                            | Gewasbehandeling | Vliegen en muggen <sup>62</sup>                                            | 0,5 L/ha                        | 0,5 L/ha                                | 2 per 12 maanden                                                | 14                                            | 7                           |
| Boekweit                                            | Gewasbehandeling | Luizen <sup>63</sup>                                                       | 0,33 L/ha                       | 0,33 L/ha                               | 2 per 12 maanden                                                | 14                                            | 30                          |
| Sorghum, gierst                                     | Gewasbehandeling | Luizen <sup>63</sup> , Rupsen <sup>64</sup>                                | 0,5 L/ha                        | 0,5 L/ha                                | 1 per 12 maanden                                                |                                               | 30                          |
| Quinoa                                              | Gewasbehandeling | Bladluus <sup>7</sup>                                                      | 0,42 L/ha                       | 0,42 L/ha                               | 2 per 12 maanden                                                | 14                                            | 30                          |
| Bessen, m.u.v. aalbes en kruisbes (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling | Rupsen <sup>64</sup> , Wants <sup>65</sup>                                 | 0,033% (33 ml/100L water)       | 0,4 L/ha                                | 2 per 12 maanden                                                | 14                                            | 7                           |
| Druiven (onbedekte teelt)                           | Gewasbehandeling | Cicaden <sup>66</sup> , kevers <sup>68,69</sup> , rupsen <sup>70</sup>     | 0,033% (33 ml/100L water)       | 0,4 L/ha                                | 2 per 12 maanden                                                | 14                                            | 7                           |
| Dauw-bramen (onbedekte teelt)                       | Gewasbehandeling | Kevers <sup>25</sup> , Rupsen <sup>64</sup>                                | 0,033% (33 ml/100L water)       | 0,4 L/ha                                | 2 per 12 maanden                                                | 14                                            | 7                           |
| Veldsla, rucola (bedekte teelt)                     | Gewasbehandeling | Rupsen <sup>6,32,33,34</sup>                                               | 0,083% (83 ml/100L water)       | 0,83 L/ha                               | 2 per 12 maanden                                                | 7                                             | 14                          |
| Kiemgroenten, babyleaves (bedekte teelt)            | Gewasbehandeling | Rupsen <sup>6,32,33,34</sup>                                               | 0,083% (83 ml/100L water)       | 0,83 L/ha                               | 2 per 12 maanden                                                | 7                                             | 14                          |
| Pompoen-achtigen en watermeloen (bedekte teelt)     | Gewasbehandeling | Rupsen <sup>6,33,35</sup> , Wittevlies <sup>36</sup> , Trips <sup>19</sup> | 0,083% (83 ml/100L water)       | 1,17 L/ha                               | 3 per 12 maanden                                                | 7                                             | 3                           |
| Courgette (onbedekte teelt)                         | Gewasbehandeling | Rupsen <sup>64</sup>                                                       | 0,5 L/ha                        | 0,5 L/ha                                | 1 per 12 maanden                                                |                                               | 3                           |
| Tomatilo (bedekte teelt)                            | Gewasbehandeling | Rupsen <sup>6,33,35</sup> , Wittevlies <sup>36</sup> , Trips <sup>19</sup> | 0,083% (83 ml/100L water)       | 0,83 L/ha                               | 3 per 12 maanden                                                | 7                                             | 3                           |

| Toepassingsgebied                                                                                                                                                                                                                                                            | Type toepassing                         | Werkzaamheid<br>aannemelijk tegen                                                                                                       | Dosering*<br>middel per<br>toepassing | Maximale dosering<br>middel per toepassing | Maximaal aantal toepas-<br>singen per teeltcyclus<br>of per 12 maanden | Minimum interval<br>tussen<br>toepassingen<br>in dagen | Veiligheidstermijn in dagen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Radijs (bedekte teelt)                                                                                                                                                                                                                                                       | Gewasbehandeling                        | Rupsen <sup>6</sup> , Trips <sup>10</sup>                                                                                               | 0,083% (83 ml/100L<br>water)          | 0,83 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                       | 7                                                      | 7                           |
| Wortelgewassen m.u.v. wortel (onbedekte teelt)                                                                                                                                                                                                                               | Gewasbehandeling                        | Vliegen en muggen <sup>62</sup>                                                                                                         | 0,5 L/ha                              | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                       | 14                                                     | 7                           |
| Aardpeer (onbedekte teelt)                                                                                                                                                                                                                                                   | Gewasbehandeling                        | Vliegen en muggen <sup>62</sup>                                                                                                         | 0,42 L/ha                             | 0,42 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                       | 14                                                     | 7                           |
| Japanse aardappel, rode biet, knolselderij,<br>schorseneer, mierikswortel (onbedekte teelt)                                                                                                                                                                                  | Gewasbehandeling                        | Vliegen en muggen <sup>62</sup>                                                                                                         | 0,5 L/ha                              | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                       | 14                                                     | 7                           |
| Bosuien (onbedekte teelt)                                                                                                                                                                                                                                                    | Gewasbehandeling                        | Rupsen <sup>39</sup> , Trips <sup>81</sup> , Mineervlieg <sup>71</sup>                                                                  | 0,5 L/ha                              | 0,5 L/ha                                   | 2 per 12 maanden                                                       | 14                                                     | 7                           |
| Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)                                                                                                                                                                                                                                   | Gewasbehandeling                        | Rupsen <sup>6,32,33,34</sup>                                                                                                            | 0,42 L/ha                             | 0,42 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                       | 7                                                      | 7                           |
| Aromatische kruidgewassen, medicinale<br>kruidgewassen (bedekte teelt)                                                                                                                                                                                                       | Gewasbehandeling                        | Rupsen <sup>6,32,33,34</sup>                                                                                                            | 0,083% (83 ml/100L<br>water)          | 0,83 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                       | 7                                                      | 14                          |
| Medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt)                                                                                                                                                                                                                                  | Gewasbehandeling                        | Wortelvlieg <sup>62</sup>                                                                                                               | 0,42 L/ha                             | 0,42 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                       | 14                                                     | 7                           |
| Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)                                                                                                                                                                                                                                       | Gewasbehandeling                        | Rupsen <sup>64</sup>                                                                                                                    | 0,33 L/ha                             | 0,33 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                       | 7                                                      | 7                           |
| Laanbomen (onbedekte teelt)                                                                                                                                                                                                                                                  | Gewasbehandeling                        | Trips <sup>61</sup> , Rupsen <sup>64</sup> , Mineervlieg <sup>71</sup>                                                                  | 0,33 L/ha                             | 0,33 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                       | 7                                                      | 7                           |
| Klimplanten, coniferen en kerstbomen, sierheesters<br>(incl. rozen), heide soorten, bos- en haagplantsoen,<br>vruchtbomen en – struiken (onbedekte teelt)                                                                                                                    | Gewasbehandeling,<br>neerwaarts spuiten | Trips <sup>61</sup> , Rupsen <sup>64</sup> , Mineervlieg <sup>71</sup>                                                                  | 0,33 L/ha                             | 0,33 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                       | 7                                                      | 7                           |
| Vaste planten teelt (onbedekte teelt)                                                                                                                                                                                                                                        | Gewasbehandeling                        | Trips <sup>61</sup> , Rupsen <sup>64</sup> , Mineervlieg <sup>71</sup>                                                                  | 0,33 L/ha                             | 0,33 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                       | 7                                                      | 7                           |
| Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)                                                                                                                                                                                                                                             | Gewasbehandeling                        | Mineervlieg <sup>37,40</sup> , Rupsen <sup>6,32,33,35</sup> ,<br>Wittevlieg <sup>36</sup> , Trips <sup>19</sup>                         | 0,083% (83 ml/100L<br>water)          | 0,83 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                                       | 7                                                      | 7                           |
| Bloemenzaadteelt (onbedekt)                                                                                                                                                                                                                                                  | Gewasbehandeling                        | Rupsen <sup>64</sup>                                                                                                                    | 0,33 L/ha                             | 0,33 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                       | 7                                                      | 7                           |
| Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)                                                                                                                                                                                                                                      | Gewasbehandeling                        | Mineervlieg <sup>37,40</sup> , Schildluis <sup>46</sup> , Rupsen <sup>6,32,33,35</sup> , Wittevlieg <sup>36</sup> , Trips <sup>19</sup> | 0,083% (83 ml/100L<br>water)          | 0,83 L/ha                                  | 3 per 12 maanden                                                       | 7                                                      | 7                           |
| Onbedekte teelt van:<br>Veredeling en groentenzaadteelt en zaadteelt van<br>kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden,<br>vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voederge-<br>wassen en witlof, chicorei, boekweit, meekrap,<br>quinoa, wede, wouw, sorghum en teff. | Gewasbehandeling                        | Mineervlieg <sup>71</sup> , Rupsen <sup>64</sup> , Trips <sup>81</sup>                                                                  | 0,33 L/ha                             | 0,33 L/ha                                  | 2 per 12 maanden                                                       | 7                                                      |                             |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

|                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 6) Gamma uil ( <i>Autographa gamma</i> )                                                                                                       | 35) Turkse mot ( <i>Chrysodeixis chalcites</i> )                                             | 62) Wortelvlieg ( <i>Psila rosae</i> )                                 |
| 7) Grote graanluis ( <i>Sitobion avenae</i> ), Vogelkersluis ( <i>Rhopalosiphum padi</i> ),<br>Roos-grasluis ( <i>Metopolophium dirhodum</i> ) | 36) Koolwittevlieg ( <i>Aleyrodes proletella</i> )                                           | 63) Luizen ( <i>Aphis</i> spp.)                                        |
| 9) Bladrandkever ( <i>Sitona lineatus</i> )                                                                                                    | 37) Bladmeeerders ( <i>Liriomyza trifolii</i> , <i>L. huijbrensis</i> , <i>L. bryoniae</i> ) | 64) Rupsen ( <i>Lepidoptera</i> )                                      |
| 11) Ervtenpeulboorder ( <i>Laspeyresia nigricana</i> )                                                                                         | 39) Preimot ( <i>Acrolepiopsis assectella</i> )                                              | 65) Blindwants ( <i>Miridae</i> )                                      |
| 19) Tabakstrips ( <i>Thrips tabaci</i> )                                                                                                       | 40) Uienmineervlieg ( <i>Liriomyza cepae</i> )                                               | 66) Cicaden ( <i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Erythroneura comes</i> ) |
| 25) Aardbeiloesemkever ( <i>Anthonomus rubi</i> )                                                                                              | 46) Schildluizen ( <i>Coccidae</i> )                                                         | 68) Twijgafsteker ( <i>Rhynchites caeruleus</i> )                      |
| 32) Koolwitje ( <i>Pieris</i> spp.)                                                                                                            | 57) Maïsstengelboorder ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )                                         | 69) Grote sigarenmaker ( <i>Byctiscus betulae</i> )                    |
| 33) Groente-uil ( <i>Polia oleracea</i> )                                                                                                      | 59) Larven van de zwarte vlieg ( <i>Bibionidae</i> )                                         | 70) Aardbeibladroller ( <i>Sparganothis pilleriana</i> )               |
| 34) Koolmotje ( <i>Plutella xylostella</i> )                                                                                                   | 60) Sikkelmotten ( <i>Depressaria</i> spp.)                                                  | 71) Mineervlieg ( <i>Liriomyza</i> spp.)                               |
|                                                                                                                                                | 61) Trips ( <i>Thysanoptera</i> )                                                            |                                                                        |

## Overige toepassingsvoorwaarden

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van deltamethrin geldt in onbedekte teelten een totale dosering van maximaal 0,0375 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.

Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van deltamethrin geldt in bedekte teelten een totale dosering van maximaal 0,0525 kg actieve stof per hectare per 12 maanden.

In de onbedekte teelt van suikermis, lupine, veldboon, graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras, blauwmaanzaad, mosterd, teunisbloem, huttentut, vezelgewassen, witlof (pennenteelt), chicorei, boekweit, sorghum, gierst en quinoa het middel toepassen in 200 tot 400 liter water per ha.

de onbedekte teelt van bessen m.u.v. aalbes en kruisbes, druiven en dauw-bramen het middel toepassen in 1000 tot 1200 liter water per ha.  
In de bedekte teelt van pompoen-achtigen en watermeloen het middel toepassen in 600 tot 1400 liter water per ha. In de bedekte teelt van tomatillo het middel toepassen in 600 tot 1000 liter water per ha.

Behandelde vezelgewassen (en bijproducten zoals lijnzaad) niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen.

Behandelde medicinale kruid- en wortelgewassen alleen gebruiken voor homeopathische of medicinale doeleinden.

In de teelt van **aardbei, braam en framboos** mag het middel uitsluitend toegepast worden vanaf het begin van de ontwikkeling van de bloemknoppen (BBCH 50) tot het verschijnen van de eerste bloemknoppen (BBCH 57).

In de teelt van **bessen, druiven en dauw-bramen** mag het middel uitsluitend toegepast worden vanaf het begin van de ontwikkeling van de bloemknoppen (BBCH 50) tot het verschijnen van de eerste bloemknoppen (BBCH 57) en vanaf het einde van de bloei (BBCH 69) tot het begin van de rijping (BBCH 81).

Om in het water levende organismen, niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen, en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van **bessen, druiven, braam, framboos en dauw-braam**, uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95, of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste struikrij of de laatste struik in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens.

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de onbedekte teelt van **aardappel** (3x0,33 L/ha), **granen, teff, graszaad, quinoa** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5; of
- Een veldspuit met spuitdoppen van tenminste DRD75% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 175 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens), of
- Een veldspuit met luchtondersteuning en spuitdoppen van tenminste DRD75% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de **onbedekte teelt van aardbei** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5; of
- Een veldspuit met spuitdoppen van tenminste DRD90% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / de perceelgrens), of
- Een veldspuit met luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD75% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de **onbedekte teelt van vaste planten, bloembol en bloemknol-gewassen, boekweit, bloemsterrijgewassen, boomkwekerijgewassen (excl. laanbomen, neerwaarts gespoten), bloemenzaad, veredeling en zaadteelt** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5; of
- Een veldspuit met spuitdoppen van tenminste DRD75% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 175 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens), of
- Een veldspuit met luchtondersteuning en spuitdoppen van tenminste DRD50% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Om in het water levende organismen, niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing in de **onbedekte teelt van laanbomen** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Om in het water levende organismen, niet tot de doelsoorten behorende geleedpotige / insecten en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing in de **onbedekte teelt van opzetters** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 500 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing in de **onbedekte teelt van spillen** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 500 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

in het water levende organismen, niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de **onbedekte teelt van**

**sla, tulp, hyacint, lelie en medicinale kruidgewassen** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van:

- Een veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD 50% met een tophoek van maximaal 90° met bijbehorende driftarme kantdop en een spuitdopafstand van 25 cm in combinatie met een spuitdophoogte van maximaal 30 cm; of
- Een veldspuit met Hardi Twin Force luchtondersteuning in combinatie met spuitdoppen van tenminste DRD 50% en bijbehorende driftarme kantdop bij een rijsnelheid van maximaal 8 km/u

Om niet tot de doelsoorten behorende insecten/geleedpotigen en bijen en overige bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van **bloemkoolachtigen, koolrabi, radijsachtigen, knolraap, koolraap, ui-achtigen, prei, sluitkoolachtigen, witlof, chicorei, wortelgewassen m.u.v. wortel, aardpeer, Japanse aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel, bosuien, medicinale wortelgewassen** uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van:

- Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5; of
- Een veldspuit met spuitdoppen van tenminste DRD 75% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 175 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).
- Een veldspuit met luchtondersteuning en spuitdoppen van tenminste DRD 75% en een bijbehorende driftarme kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 175 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Voor onbedekte teelten: gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Voor bedekte teelten: gevaarlijk voor bijen. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

#### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof deltamethrin. Deltamethrin behoort tot de pyrethroiden. De IRAC code is 3A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.



**Attentie**

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden in zowel de bedekte- als onbedekte teelt van groenten-, fruit-, sierteelt-, boomkwekerijgewassen en vaste planten is het onmogelijk om de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald gewas of ras, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.

**Definitielijst toepassingsgebieden (DTG)**

De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.2 (Ctgb, juni 2019). Wilt u weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (<http://agro.bayer.nl/Producten/DTG>).

**Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding**

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is); werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

**Voorkomen emissie**

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, verwerking restanten en reiniging machines.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science SA-NV, zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science SA-NV in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.